

АКАДЕМИЯ НАУК БЕЛОРУССКОЙ ССР

Институт зоологии

ДИНАМИКА  
ЗООЦЕНОЗОВ,  
ПРОБЛЕМЫ ОХРАНЫ  
И РАЦИОНАЛЬНОГО  
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
ЖИВОТНОГО МИРА  
БЕЛОРУССИИ

ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ VI ЗООЛОГИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

*(19 — 21 сентября 1989 г.)* Витебск

МИНСК  
«НАУКА И ТЕХНИКА»  
1989

## ПОЧВЕННЫЕ БЕСПОЗВОНОЧНЫЕ

ДОПОЛНЕНИЕ К ФАУНЕ ЖУЖЕЛИЦ (Coleoptera.  
Carabidae) БЕЛОРУССИИ

О. Р. АЛЕКСАНДРОВИЧ

(Минский педагогический институт)

К настоящему времени жужелицы являются одним из наиболее полно изученных семейств жесткокрылых на территории республики. В результате многолетнего изучения видового состава (Н.М. Арнольд, 1902; А.И. Радкевич, 1936, 1970; Э.И. Хотько, 1978—1988; Л.П. Молодова, 1980 и др.) выявлено 272 вида.

В наших исследованиях 1975—1988 гг. обнаружены еще 29 видов, ранее не указывавшихся для региона: *Cicindela maritima* Dej., *C. arenaria viennensis* Schrank, *Dyschirius intermedius* Putz., *D. laeviusculus* Putz., *D. tristis* Steph., *Perileptus areolatus* (Creutz.), *Bembidion gilvipes* (Sturm), *B. schuppelii* (Dej.), *B. octomaculatum* (Gyll.), *B. tetragrammum illigieri* Net., *B. monticola* (Sturm), *B. fluviatile* (Dej.), *B. lunatum* (Duft.), *Pterostichus rhaeticus* Heer, *Amara concinna* Zimm., *A. cursitans* (Zimm.), *Stenolophus discophorus* (F.-W.), *Acupalpus brunripes* (Sturm), *Harpalus progrediens* Schaub., *H. servus* (Duft.), *Chalaenius tibialis* (Dej.), *Badister meridionalis* Puel, *B. dorsiger* (Duft.), *B. anomalus* Perris, *B. dilatatus* Chd., *B. collaris* Motsch., *Dromius quadrinotatus* (Pz.), *Cymindis humeralis* (Fourcr.), *C macularis* Fish.

Таким образом, на территории республики достоверно известен 301 вид. На основании анализа фаун сопредельных регионов предполагаемый объем фауны может составить 347—350 видов.