

Katalog fauny Puszczy Białowieskiej

pod redakcją JERZEGO M. GUTOWSKIEGO i BOGDANA JAROSZEWICZA

Catalogue of the fauna of Białowieża a Primeval Forest

edited by JERZY M. GUTOWSKI and BOGDAN JAROSZEWICZ



**Instytut Badawczy Leśnictwa
Warszawa 2001**

Familia (rodzina) Carabidae - biegaczowate

Subfamilia (podrodzina): Carabinae

- Omophron limbatum* (FABRICIUS, 1776) -
P(446,801) B(12*)
Calosoma inquisitor (LINNAEUS, 1758) - P(367,801)
B(12,382)
-sycophanta (LINNAEUS, 1758) - P(367,801)
B(383,572)
Carabus arcensis HERBST, 1784 - P(367,801)
B(10,19)
- *cancellatus* ILLIGER, 1798 - P(367,801)
B(19,384)
- *clatratus* LINNAEUS, 1761 - P(367,801) B(19)
- *convexus* FABRICIUS, 1775 - P(367,801) B(19)
- *coriaceus* LINNAEUS, 1758 - P(367,801)
B(10,19)
- *glabratus* PAYKULL, 1790 - P(367,801) B(19)
- *granulatus* LINNAEUS, 1758 - P(367,801) B(19)
- *hortensis* LINNAEUS, 1758 - P(367,801) B(19)
- *intricatus* LINNAEUS, 1761 - P(391,801)
- *menetriesi* HUMMEL, 1827 - 310" P(355,801)
B(10,19)
- *nemoralis* O. F. MÜLLER, 1764 - P(367,801)
B(19)
- *nitens* LINNAEUS, 1758 - P(367,801)
- *violaceus* LINNAEUS, 1758 - P(367,801)
B(10,385)
Cychrus caraboides (LINNAEUS, 1758) - P(367,801)
B(10,255)
Leistus ferrugineus (LINNAEUS, 1758) - P(367,801)
B(188)
- *piceus* FROLICH, 1799 - P(367,801) B(8)

- *terminatus* (HELLWIG in PANZER, 1793) -
P(367,801)B(188)
= *rufescens* FABRICIUS 1775
Nebria brevicollis (FABRICIUS, 1792) - P(367,801)
B(8,255)
- *livida* (LINNAEUS, 1758) - P(130,801) B(12*)
Notiophilus aquaticus (LINNAEUS, 1758) -
P(367,801) B(10)
- *biguttatus* (FABRICIUS, 1779) - P(367,801)
B(255)
- *germinyi* FAUVEL, 1863 - B(188)
= *hypocrita* auct.
- *palustris* (DUFTSCHMID, 1812) - P(367,575,801)
B(10,255)
Cicindela campestris LINNAEUS, 1758 - P(357,801)
B(199,12*)
- *hybrida* LINNAEUS, 1758 - P(357,801)
B(199,12*)
- *sylvatica* LINNAEUS, 1758 - P(357,801)
B(199,12*)
Loricera pilicornis (FABRICIUS, 1775) -
P(367,801) B(12*)

Subfamilia (podrodzina): Elaphrinae

- Blethisa multipunctata* (LINNAEUS, 1758) -
P(367,801) B(11)
Elaphrus cupreus DUFTSCHMID, 1812 - P(367,801)
B(10)
- *riparius* (LINNAEUS, 1758) - P(130,801) B(12*)
- *uliginosus* FABRICIUS, 1792 - P(367,801)
Clivina collaris (HERBST, 1784) - P(496) B(12)
- *fossor* (LINNAEUS, 1758) - P(631,801) B(12*)
Dyschirius aeneus (DEJEAN, 1825) - P(601,801)
B(12*)

* Instytut Badawczy Leśnictwa, Zakład Lasów Naturalnych, 17-230 Białowieża, Polska,
e-mail jgutowski@las.ibl.bialowieza.pl ** Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Katedra Ekologii i
Ochrony środowiska, ul. Olsztyńska 14,
10-561 Olsztyn, Polska, e-mail olega@matman.uwm.edu.pl ***
ul. Siemiradzkiego 7/4, 31-137 Kraków, Polska

- *digitatus* (DEJEAN, 1825) - P(446,801)
- *globosus* (HERBST, 1784) - 631" P(367,801) B(10)
- ! - *intermedius* PUTZEYS, 1846 - B(13*)
- *neresheimeri* WAGNER, 1915 - B(12)
- *nitidus* (DEJEAN, 1825) - P(130,801) B(12*)
- *obscurus* (GYLLENHAL, 1827) - B(12)
- *politus* (DEJEAN, 1825) - B(12)
- *thoracicus* (ROSSI, 1790) - P(446,801) B(12*)
- =*arenosus* STEPHENS, 1827
- *tristis* STEPHENS, 1827 - P(631,801) B(12*)

Subfamilia (podrodzina): Broscinae

- Brosicus cephalotes* (LINNAEUS, 1758) - P(367,801) B(188)
- Miscodera arctica* (PAYKULL, 1798) - B(8)

Subfamilia (podrodzina): Trechinae

- Asaphidion flavipes* (LINNAEUS, 1761) - P(130,801) B(12*)
- *pallipes* (DUFTSCHMID 1812) - B(12)
- Bembidion andreae* (FABRICIUS, 1787) - B(12)
- *articulatum* (PANZER, 1796) - P(367,801) B(12*)
- *assimile* (GYLLENHAL, 1810) - P(367,801) B(12*)
- *biguttatum* (FABRICIUS, 1779) - P(367,801) B(12*)
- *bruxellense* WESMAEL, 1835 - P(496) B(12)
- =*rupestre* LINNAEUS, 1767
- *dentellum* (THUNBERG, 1787) - P(496) B(12)
- *dorisi* (PANZER, 1797) - P(367,801) B(12*)
- *femoratum* (STURM, 1825) - P(1*) B(12)
- ! - *gilvipes* (STURM, 1825) - P(2*)
- *guttula* (FABRICIUS, 1792) - P(496) B(12)
- *lampros* (HERBST, 1784) - P(801) B(12*)
- *litorale* (OLIVIER, 1790) - P(446,801) B(12*)
- *mannerheimii* (C SAHLBERG, 1827) - P(631,801) B(12*)
- *neresheimeri* G. MÜLLER, 1929 - B(8)
- *obliquum* (STURM, 1825) - 756" P(367,801) B(12*)
- *properans* (STEPHENS, 1828) - P(367,801) B(12*)
- *quadrimaculatum* (LINNAEUS, 1761) - P(367,801) B(188)
- *ruficolle* (PANZER, 1797) - P(367,801) B(12*)
- *semipunctatum* (DONOVAN, 1806) - P(801) B(12*)
- *striatum* (FABRICIUS, 1792) - B(12)
- *tetracolum* SAY, 1823 - P(496,801) B(12*)
- =*ustulatum* LINNAEUS, 1758
- *tetragrammum illigeri* NETOLIZTKY, 1914 - P(3*) B(8)
- *varium* (OLIVIER, 1795) - P(446,801) B(12*)
- *velox* (LINNAEUS, 1761) - B(12)
- Tachyta nana* (GYLLENHAL, 1810) - P(379,801) B(12*)
- Epaphius rivularis* (GYLLENHAL, 1810) - P(4*) B(12)
- *secalis* (PAYKULL, 1790) - P(367,801) B(10,255)

- Trechus quadristriatus* (SCHRANK, 1781) — P(446,801) B(12*)
- *rubens* (FABRICIUS, 1792) - B(12)
- Lasiotrechus discus* (FABRICIUS, 1792) - B(14*)
- Trechoblemus micros* (HERBST, 1784) - B(12)
- Patrobus assimilis* CHAUDOIR, 1844 - B(11,12)
- *atrorufus* (STROM, 1768) - P(367,801) B(10)

Subfamilia (podrodzina): Harpalinae

- Panagaeus cruxmajor* (LINNAEUS, 1758) - P(367,801) B(12*)
- Amara aenea* (DE GEER, 1774) - P(367,801) B(12*)
- *apricaria* (PAYKULL, 1790) - P(462) B(12)
- *aulica* (PANZER, 1797) - P(367,801) B(12*)
- *bifrons* (GYLLENHAL, 1810) - P(367,801) B(12*)
- *brunnea* (GYLLENHAL, 1810) - P(756,801) B(255)
- *communis* (PANZER, 1797) - P(367,801) B(12*)
- =*makolskii* ROUBAL, 1923 =*pseudocommunis* BURAKOWSKI, 1957
- *consularis* (DUFTSCHMID, 1812) - P(5*) B(12,188)
- *curta* DEJEAN, 1828 - P(367,801) B(12*)
- *equestris* (DUFTSCHMID, 1812) - P(801) B(12*)
- *erratica* (DUFTSCHMID, 1812) - P(465)
- *eyrinota* (PANZER, 1797) - B(12)
- *famelica* ZIMMERMANN, 1831 - P(367,801) B(12*)
- *familiaris* (DUFTSCHMID, 1812) - P(367,801) B(12*)
- *fulva* (O.F. MÜLLER, 1776) - P(367,801) B(12*)
- *gebleri* (DEJEAN, 1831) - P(367,801)
- =*helleri* GREDLER, 1868
- *infima* (DUFTSCHMID, 1812) - B(12)
- *ingenua* (DUFTSCHMID, 1812) - B(12)
- *lunicollis* SCHIODTE, 1837 - P(367,801) B(12*)
- *majuscula* (CHAUDOIR, 1850) - P(801) B(12*)
- *municipalis* (DUFTSCHMID, 1812) - P(367,801) B(12*)
- *nitida* STURM, 1825 - P(131,801) B(12*)
- *ovata* (FABRICIUS, 1792) - P(367,801) B(12*)
- *plebeja* (GYLLENHAL, 1810) - P(367,801) B(12*)
- *similata* (GYLLENHAL, 1810) - P(367,801) B(12*)
- *spretta* DEJEAN, 1831 - P(367,801) B(12*)
- *tibialis* (PAYKULL, 1798) - P(367,801) B(12*)
- *tricuspidata* DEJEAN, 1831 - P(357,367,801) B(12*)
- Stomis pumicatus* (PANZER, 1796) - P(367,801) B(12*)
- Poecilus* [= *Pterostichus*] *cupreus* (LINNAEUS, 1758) - P(367,801) B(10)
- *punctulatus* (SCHALLER, 1783) - P(367,801) B(12*)
- *versicolor* (STURM, 1824) - P(367,631,801) B(10)
- *virens* (O.F. MÜLLER, 1776) - P(367,801) B(188)
- =*lepidus* LESKE 1785
- Pterostichus aethiops* (PANZER, 1797) - P(367,801) B(8,255)
- *anthracinus* (ILLIGER, 1798) - P(357,367,801) B(12*)

- *aterimus* (HERBST, 1784) - P(357,367,801)
- *brunneus* (STURM, 1824) - P(367,801) B(10)
 - =*minor* GYLLENHAL, 1827
- *diligens* (STURM, 1824) - P(357,367,801) B(10)
- *guentheri* (STURM, 1824) - P(367,801) B(12*)
 - =*gracilis* DEJEAN, 1828
- *melanarius* (ILLIGER, 1798) - P(367,801) B(188)
 - =*vulgaris* LINNAEUS, 1758
- *niger* (SCHALLER, 1783) - P(367,801) B(10)
- *nigrita* (FABRICIUS, 1792) - P(367,801) B(10)
- *oblongopunctatus* (FABRICIUS, 1787) - P(367,801) B(10)
- *quadrioveolatus* LETZNER, 1852 - P(367,801) B(8,188)
 - =*angustatus* DUFTSCHMID, 1812
- *rhaeticus* HEER, 1837 - B(10)
- *strenuus* (PANZER, 1797) - P(367,631,801) B(188)
- *vernalis* (PANZER, 1796) - P(367,801) B(10)
- Abax ?ovalis* (DUFTSCHMID, 1811) - B(255)
- Calathus ambiguus* (PAYKULL, 1790) - P(801) B(12*)
 - *erratus* (C.R. SAHLBERG, 1827) - P(367,801) B(188)
 - *fuscipes* (GOEZE, 1777) - P(367,379,801) B(188)
 - *melanocephalus* (LINNAEUS, 1758) - P(367,801) B(188)
 - *micropterus* (DUFTSCHMID, 1812) - P(367,801) B(188)
- ! - *ochropterus* (DUFTSCHMID, 1812) - P(6*)
- Dolichus halensis* (SCHALLER, 1783) - B(12)
- Synuchus vivalis* (ILLIGER, 1798) - P(367,801) B(188)
- ! *Agonum afrum* (DUFTSCHMID, 1812) - !!B(16*)
 - =*moestum* DUFTSCHMID, 1812 (auct)
 - *dolens* (C.R. SAHLBERG, 1827) - B(12)
 - *gracilipes* (DUFTSCHMID, 1812) - B(12)
 - *hypocrita* (APFELBECK, 1804) - P(367,652,801)
 - *impressum* (PANZER, 1797) - B(12)
 - *lugens* (DUFTSCHMID, 1812) - P(131,801) B(12*)
 - *marginatum* (LINNAEUS, 1758) - B(12)
 - *duftschmidi* SCHMIDT, 1994 - P(357,367,801)
 - *muelleri* (HERBST, 1784) - P(367,801) B(255)
 - *quadripunctatum* (DE GEER, 1774) - P(367,801) B(12*)
- Sericoda [=Agonum] sexpunctata* (LINNAEUS, 1758) - P(367,801)B(12*)
 - *versutum* STURM, 1824 - P(367,801) B(12*)
 - *viduum* (PANZER, 1797) - P(367,801) B(12*)
- Anchomenus [=Agonum] dorsalis* (PONTOPPIDAN, 1763) - P(367,801) B(12*)
- Platynus [=Agonum] assimilis* (PAYKULL, 1790) - P(367,801) B(12*)
 - *krynickyi* (SPERK, 1835) - P(367,801) B(12*)
 - *livens* (GYLLENHAL, 1810) - P(367,801) B(11)
 - *mannerheimii* (DEJEAN, 1828) - P(367,801) B(11)
- Oxypselaphus [=Agonum] obscurus* (HERBST, 1784) - P(367,801) B(10)
- Europhilus [=Agonum] fuliginosus* (PANZER, 1809) - P(367,801) B(10)
 - *gracilis* STURM, 1824 - P(367,801) B(8)
 - *micans* (NICOLAI, 1822) - P(131,801) B(12*)
 - *piceus* (LINNAEUS, 1758) - B(12)
 - *scitulus* DEJEAN, 1828 - P(367,801)
 - *thoreyi* (DEJEAN, 1828) - P(496) B(8)
 - =*pelidnum* PAYKULL 1798
- Badister bullatus* (SCHRANK, 1798) - P(367,801) B(12*)
 - =*bipustulatus* FABRICIUS, 1792
 - *dilatatus* CHAUDOIR, 1837 - P(367,801) B(8)
- ! - *dorsiger* (DUFTSCHMID, 1812) - P(7*)
 - *meridionalis* PUEL, 1925 - B(12)
 - =*kineli* MAKOLSKI, 1952
 - *peltatus* (PANZER, 1797) - P(131,801) B(12*)
 - *sodalis* (DUFTSCHMID, 1812) - P(496) B(12*)
 - *unipustulatus* BONELLI, 1813 - P(367,801) B(12*)
- Chlaenius costulatus* MOTSCHULSKY, 1850 - P(357,367,801)
 - *nigricornis* (FABRICIUS, 1787) - P(367,801) B(12*)
 - *nitidulus* (SCHRANK, 1781) - B(12)
 - *sulcicollis* (PAYKULL, 1798) - P(367,801) B(12*)
 - *tristis* (SCHALLER, 1783) - P(367,801)
 - *vestitus* (PAYKULL, 1790) - B(12)
- Oodes heloploides* (FABRICIUS, 1792) - P(367,801) B(12*)
- Anisodactylus binotatus* (FABRICIUS, 1792) - P(367,499) B(12*)
 - *nemorivagus* (DUFTSCHMID, 1812) - P(367,801)
 - *signatus* (PANZER, 1797) - B(12)
- Ophonus rufibarbis* (FABRICIUS, 1792) - P(367,801) B(12*)
 - =*seladon* SCHAUBERGER, 1926
 - *signaticornis* (DUFTSCHMID, 1812) - B(12)
- Pseudoophonus [=Harpalus] calceatus* (DUFTSCHMID, 1812) - P(275,801) B(12*)
 - *griseus* (PANZER, 1797) - B(12,188)
 - *rufipes* (DE GEER, 1774) - P(275,801) B(12,188)
- Harpalus affinis* (SCHRANK, 1781) - P(496,801) B(12)
 - *anxius* (DUFTSCHMID, 1812) - B(12)
- ! - *atratus* LATREILLE, 1804 - P(15*)
 - *autumnalis* (DUFTSCHMID, 1812) - P(801) B(8)
 - *flavescens* (PILLER et MITTERPACHER, 1783) - B(12)
 - *froelichii* STRUM, 1818 - P(131,801) B(12*)
 - *hirtipes* (PANZER, 1797) - B(12,188)
 - *latus* (LINNAEUS, 1758) - P(367,801) B(188)
 - *luteicornis* (DUFTSCHMID, 1812) - B(12)
 - *picipennis* (DUFTSCHMID, 1812) - P(801) B(12*)
 - *progrediens* SCHAUBERGER, 1922 - P(496)
 - *distinguentus* (DUFTSCHMID, 1812) - P(801) B(12*)

- *pumilus* STURM, 1818 - B(12)
- = *vernalis* FABRICIUS, 1801
- *quadripunctatus* DEJEAN, 1829 - P(357,367,801) B(188)
- *rubripes* (DUFTSCHMID, 1812) - P(131,801) B(12*)
- *rufipalpis* STURM, 1818 - P(801) B(12*)
- = *rufitarsis* DUFTSCHMID 1812 !
- *serripes* (QUENSEL, 1806) - P(11*)
- *servus* (DUFTSCHMID, 1812) - B(12)
- *smaragdinus* (DUFTSCHMID, 1812) - P(367,801) B(12*)
- *tardus* (PANZER, 1797) - P(367,801) B(12*)
- Trichocellus placidus* (GYLLENHAL, 1827) - P(496,801) B(12*)
- Bradycellus caucasicus* (CHAUDOIR, 1846) - P(8*) B(12)
- = *collaris* PAYKULL, 1798
- *csikii* LACZO, 1912 - P(801) B(9)
- *harpalinus* (AUDIENT-SERVILLE, 1821) - P(801)
- Acupalpus brunnipes* (STURM, 1825) - P(494) B(8,12)
- *consputus* (DUFTSCHMID, 1812) - P(496) B(8,12)
- ! - *exiguus* DEJEAN 1829 - P(9*)
- *flavicollis* (STURM, 1825) - P(367,801) B(12*)
- *meridianus* (LINNAEUS, 1767) - P(631,801) B(12*)
- *parvulus* STURM, 1825 - P(367,801) B(12*)
- = *dorsalis* (FABRICIUS 1787)
- Stenolophus mixtus* (HERBST, 1784) - B(12)
- ! - *skrimshiranus* (STEPHENS, 1828) - P(10*)
- *teutonius* (SCHRANK, 1781) - P(801) B(12*)
- Masoreus wetterhallii* (GYLLENHAL, 1813) - B(12)
- Lebia chlorocephala* (HOFFMANNSEGG, 1803) - P(367,801) B(12*)
- *cruxminor* (LINNAEUS, 1758) - B(12)
- Demetrius monostigma* SAMOUELLE, 1819 - P(367,801) B(12*)
- *imperialis* (GERMAR, 1824) - B(12)
- Dromius agilis* (FABRICIUS, 1787) - P(367,801) B(12*)
- *fenestratus* (FABRICIUS, 1794) - P(367,801) B(12*)
- *linearis* (OLIVIER, 1795) - P(367,801) B(12*)
- *notatus* (STEPHENS, 1828) - P(801)
- = *nigriventris* THOMSON, 1857
- *quadraticollis* A. MORAWITZ, 1862 - P(367,801) B(12*)
- *quadrifasciatus* (LINNAEUS, 1758) - P(367,756,801) B(8)
- *quadrisignatus* DEJEAN, 1825 - B(12)
- *schneideri* CROUCH, 1871 - P(367,801) B(12*)
- *sigma* (ROSSI, 1790) - P(367,801) B(12*)
- *spilotus* (ILLIGER 1798) - P(367,801) B(8)
- Syntomus [=Metabletus] foveatus* (FOURCROY, 1785) - P(801) B(8)
- *truncatellus* (LINNAEUS, 1761) - P(367,801) B(12*)
- Microlestes maurus* (STURM 1827) - P(131,801)
- *minutulus* (GOEZE, 1777) - P(367,801) B(12*)
- Odocantha melanura* (LINNAEUS, 1761) - P(367,801) B(12*)

- 1* — 10* - informacje od T. MAJEWSKIEGO (wszystkie ex. leg. T. MAJEWSKI, det. T. PLEWKA)
- 1* - Krzywiec, pole ze zbozem, na ziemi, 31 V 1996, - PB, oddz. 37B, piaskownia otoczona borem wierkowo-sosnowym, piasek przy wodzie, 30 VII 1997
- 2* - Babia Góra, pastwisko, pod stogiem siana, 30 VIII 1995, - PB, oddz. 58B, ł g (?), ciółka, 7 VIII 1996, - Stare Lewkowo, pod gnij c traw na prawym brzegu Narewki, 26 VIII 1996
- 3* - PB, oddz. 389C, wirownia otoczona borem sosnowo-wierkowym, na brzegu przy wodzie, 6 VI 1998
- 4* - PB, oddz. 389D, oles, wyschni te dno strumienia, 22 VIII 1996, - PB, oddz. 25B, ł g, ciółka, 30 VII 1997
- 5* - Kruhlik (brzeg zalewu), gnij ce ro liny na ł ce, 3 VIII 1996
- 6* - Białowie a, pole lez ce odłogiem we wsch. cz ci wsi, 18 X 1997 i 27 IX 1998
- 7* - PB, oddz. 733, ł g (?), ciółka, 5 VII 1997, - PB, oddz. 664A, ł g, ciółka, 22 VII 1997, - PB, oddz. 570B, podmokły gr d (?), ciółka, 23 VII 1997, - PB, oddz. 123C, wyschni te koryto strumienia w ł gu, szcz tki ro linne, 29 VII 1997, - PB, oddz. 463C, oles, ciółka, 8 VI 1998, - PB, oddz. 411D, płat ł gu, ciółka, 25 VI 1998
- 8* - PB, oddz. 474D, torfowisko, w mchach, 15 VII 1998, - Białowie a, pole lez ce odłogiem we wsch. cz ci wsi, 27 IX 1998
- 9* - PB, oddz. 136B, oles, ciółka, 22 VI 1995, - Grodek, płytki wysychaj cy staw we wsi, 15 VII 1995, - D browa ad Teremiski, stos gnij cych ro lin na brzegu Łutowni przy mo - cie, 8 VI 1996, - Osowe ad Siemianówka, brzeg rowu odwadniaj cego, 9 VII 1997, - Suszczy Borek, brzeg starorzecza Narewki powy ej mostu, ciółka pod olchami, 13 VII 1997, - PB, oddz. 693B, ł ka nad strug, 22 VII 1997, - Wojnówka, ł ka nad Policzn, 22 VII 1997
- 10* - Tarnopol (nad zalewem), olszyna na pld. od wsi, ciółka, 24 VIII 1996
- 11* - Białowie a, 20 VI 1993, 1 ex. leg. J. M. GUTOWSKI, det. et coll. T. WOJAS
- 12* - det. O.R. ALEKSANDROVICH
- 13* - rzeka Lesnaja ad Kamieniuki, na gliniastym brzegu, 28 IV 1994, 1 ex., det. O.R. ALEKSANDROVICH

- 14*- zdrenowane bagniste łki nad rzek Lesnaja ad Kamieniuki, 16 VIII 1992, 2 ex., - bagniste łki nad rzek Narew ad Browsk, 10 VIII 1990, 1 ex., det. O.R. ALEKSANDROVICH
- 15* - BPN, oddz. 229B, bór wie y, pułapka ekranowa, 27 V-2 VII 1999, 1 ex. leg. J.M. GUTOWSKI, det. et coll. D. KUBISZ.
- 16*- Kamieniuki, mokra łka przy brzegu rzeki Lesnaja, 28 IV 1985, 1 ex. leg. et det. O.R. ALEKSANDROVICH

Obecnie w Polsce znanych jest 497 gatunków *Carabidae*, a w niniejszym katalogu wykazano z polskiej części Puszczy 195 gatunków (39% fauny), w tym po raz pierwszy - 12 gatunków. W białoruskiej części PB znanych jest 215 gatunków, co stanowi 69% fauny Białorusi. W całej Puszczy wykazano dotychczas 239 gatunków, w tym 9 nowych dla fauny PB. Stopień poznania *Carabidae* PB jest dobry. Niemniej jednak można się spodziewać znalezienia tutaj jeszcze około 20 gatunków

- 1*-10*- information from T MAJEWSKI (all specimens leg. T MAJEWSKI, det. T PLEWKA)
- 1* - Krzywiec, a grain field, on the ground, 31 V 1996, - PB, oddz. 37B, with a sand-pit enclosed spruce-pine forest, on sand near water, 30 VII 1997
- 2* - Babia Góra, pasture, under a hay-stack, 30 VIII 1995, - PB, oddz. 58B, along stream forest (?), litter, 7 VII 1996, - Stare Lewkowo, under decaying grass on the right bank of the Narewka, 26 VIII 1996
- 3* - PB, oddz. 389C, a gravel-pit enclosed with a pine-spruce forest, on a bank, near water
- 4* - PB, oddz. 389D, an alder wood, on the bottom of a dried up stream, - PB, oddz. 25D, jellied meadow, litter, 30 VII 1997
- 5* - Kruhlik (bank of the inundation), decaying plants on a meadow, 3 VIII 1996
- 6* - Białowieża, a laying fallow field to the east of the village, 18 X 1997 and 27 IX 1998
- 7* - PB, oddz. 733, along stream forest (?), litter, 5 VII 1997, - PB, oddz. 664A, along stream forest, litter, 22 VII 1997, - PB, oddz. 570B, wet oak-hornbeam forest (?), litter, 23 VII 1997, - PB, oddz. 123C, dried up bottom of the stream in along stream forest, plant's residuals, 29 VII 1997, - PB, oddz. 463C, alder wood, litter, 8 VI 1998, - PB, oddz. 411D, a patch of along stream forest, litter, 25 VI 1998
- 8* - PB, oddz. 474D, peat bog, in mosses, 15 VII 1998, - Białowieża, abandoned field to the East of the village, 27 IX 1998
- 9* - PB, oddz. 136B, an alder wood, litter, 22 VI 1995, - Grodek, a shallow seasonal pond in the village, 15 VII 1995, - Dębowa near Teremiski, heap of decaying plants on the bank of Łutownia by the bridge, 8 VI 1996, - Osowe near Siemianówka, a bank of a drainage channel, 9 VII 1997, - Suszczy Borek, a bank of the Narewka's old river-bed, down the bridge, litter under alders, 13 VI 1997, - PB, oddz. 693B, the meadow by the stream, 22 VII 1997, - Wojnówka, the meadow near Policzna, 22 VII 1997
- 10* - Tarnopol (by the water reservuar), an alder wood to the south of the village, 24 VII 1996
- 11*- Białowieża, 20 VI 1993, 1 ex. leg. J.M. GUTOWSKI, det. et coll. T. WOJAS
- 12* - det. O.R. ALEKSANDROVICH
- 13* - the River Lesnaja near Kamieniuki, on a clay bank, 28 IV 1994, 1 ex., det. O.R. ALEKSANDROVICH
- 14* - drained boggy meadow on the River Lesnaja near Kamieniuki, 16 VIII 1992, 2 ex., - boggy meadow on the River Narew near Browsk, 10 VIII 1990, 1 ex., det. O.R. ALEKSANDROVICH
- 15* - BPN, oddz. 229B, a pine forest, window trap, 27 V-2 VII 1999, 1 ex. leg. J.M. GUTOWSKI, det. et coll. D. KUBISZ
- 16*- Kamieniuki, boggy meadow on the River Lesnaja, 28 IV 1985, 1 ex. leg. et det. O.R. ALEKSANDROVICH

Up to present there are 497 species of ground beetles known from Poland. The attached list specifies 195 species from Polish part of PB (39% of Polish ground beetle fauna), including 12 species recorded for the first time. From Belarussian part 215 species are known (69% of Belarussian *Carabidae* fauna) including 9 species new to PB. All together there are 239 species listed from whole PB. *Carabidae* are very well studied in PB and probably no more than 20 species new may one expect to find.