

Poecilium Fairmaire, 1864

- alni* (Linnaeus, 1767) Fig. 182 (δ 5 mm)
fasciatum (Villers, 1789) Fig. 183 (δ 6.5 mm)
glabratum (Charpentier, 1825) Fig. 184 (δ 7 mm)
lividum (Rossi, 1794) Fig. 185 (φ 9 mm)
puncticolle (Mulsant, 1862) Fig. 186 (δ 9 mm)
pusillum (Fabricius, 1787) Figs 187-188 (δ 6 mm, φ 7.5 mm)
rufipes (Fabricius, 1776) Fig. 189 (φ 7 mm)

Lioderina Ganglbauer, 1885

- linearis* (Hampe, 1870) Fig. 190 (δ 7 mm)

Xylotrechus Chevrolat, 1860

- antilope* (Schönherr, 1817) Fig. 191 (δ 11 mm)
arvicola (Olivier, 1795) Fig. 192 (φ 14 mm)
capricornus Gebler, 1830 Fig. 193 (δ 11 mm)
ibex Gebler, 1825 Fig. 194 (δ 11 mm)
pantherinus (Savenius, 1825) Fig. 195 (δ 15 mm)
rusticus (Linnaeus, 1758) Figs 196-197 (δ 12 mm, φ 13 mm)
stebbingi Gahan, 1906 Fig. 198 (δ 13 mm)

Clytus Laicharting, 1784

- arietis* (Linnaeus, 1758) Fig. 199 (φ 10 mm)
lama Mulsant, 1847 Fig. 200 (δ 11 mm)
rhamni Germar, 1817 Figs 201-202 (δ 9 mm, φ 9 mm)
tropicus (Panzer, 1795) Fig. 203 (δ 13 mm)

Cyrtoclytus Ganglbauer, 1882

- capra* (Germar, 1824) Fig. 204 (δ 12 mm)

AU CZ GE HU PL SK SZ

•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	?○	•	-	•	○	
•	○	•	•	•	•	•	○
○	•	○	-	-	?	○	•
-	-	-	•	-	-	-	-
•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•
?	○	-	-	•	-	•	-

