

Description d'une nouvelle espèce du genre *Aegus* Mac Leay
(Coleoptera, Lucanidae), de Bornéo.

Par **B. E. Jakowleff**

(Eupatoria).

***Aegus pygmaeus*. sp. n.**

♂. Corps noir luisant, presque parallèle.

Tête plus du double plus large que longue, à peine moins large que le pronotum; bord antérieur très largement et régulièrement découpé, la découpe à peine sensiblement reborcée et munie, <ie chaque côté, de (lenticules saillants; surface assez convexe, luisante vers le vertex et opaque en avant; orbites assez densément ponctuées; disque couvert de petits points très clair-semés; vertex et bord antérieur lisses; côtés parallèles, faiblement échancrés devant les yeux; mandibules presque aussi longues que la tête, très largement écartées, étroites, régulièrement arquées et munies, intérieurement et tout à la base, d'une forte dent triangulaire, à sommet dirigé un peu en arrière; le côté interne de chaque mandibule présente un sillon longitudinal formant gouttière, dont le bord supérieur se dilate quelque peu, derrière le milieu, en forme de saillie obtuse.

Pronotum plus du double plus large que long, à côtés paraissant presque parallèles et presque droits (vue de dessus); mais en réalité quelque peu arqués et légèrement défléchis; angles ante-

rieurs faisant saillie en-lobé arrondi; angles postérieurs largement et obliquement tronqués; bord postérieur droit, rebordé d'un bourrelet fin mais très accusé; surface unie, couverte d'une ponctuation extrêmement fine et très clair-semée; quelques points plus gros se laissent distinguer le long de la ligne médiane; côtés avec une étroite bordure de poils roussâtres, courts et formant brosse.

Elytres assez convexes, presque parallèles, 3,5 fois aussi longs que le pronotum, avec 6 à 7 profonds sillons, dont l'externe est parfois remplacé par une ligne de points isolés; épaules munies d'un (lenticule obtus mais distinct: disque glabre, lisse et luisant; bords latéraux densément couverts (à partir de la 7^e strie) de fine ponctuation, qui forme parfois une ou deux séries de points longitudinales; bourrelet avec une étroite bordure de courts poils roussâtres. Ecusson grand, largement arrondi.

Menton séparé du sous-menton par un bourrelet fin et saillant, immédiatement précédé d'un fin sillon, qui lui est contigu; le menton est largement concave au milieu et couvert, ainsi que le sousmenton de très fine ponctuation clair-semée et assez vaguement accusée. Saillie prosternale large, convexe au milieu, ponctuée comme le menton. Ventre faiblement luisant, finement ponctué et garni, sur les bords des segments, d'assez longs poils roux.

Tibias antérieurs dilatés vers l'extrémité, avec 5 à 6 denticules aigus; les intermédiaires munis d'une seule et forte épine; les postérieurs simples: les intermédiaires et les postérieurs sont revêtus, assez densément, de longs poils roussâtre clair; une pilosité pareille garnit également le flessus des tarsi.

♂. Long. 7,5—9,5, larg. 3,5 mm.

Bornéo (Rolle): Kina-balou (Staudinger & Uang-Haas).

Chez les spécimens de grande taille (9,5 mm.) la ponctuation de la tête et du pronotum est parfois un peu plus accusée.