

Цена 25 коп.

Выходит один раз
в квартал.

Год издания
первый.

БЮЛЛЕТЕНЬ

ОБЩЕСТВА ИЗУЧЕНИЯ КРАЯ
при Музее Тобольского Севера.

Адрес редакции:
г. Тобольск. Об-
щество Изучен.
Края при Муз.е
Тоб. Севера.

№ 1 (2) 1928 — Январь - Март — 1928 № 1 (2)

СОДЕРЖАНИЕ: Новицкий В. М.—, «Отчет исследовательского Казымского отряда О-ва»—М. Конотилов—, «Историко-Революционный отдел Музея Тоб. Севера».—, «Из текущей работы О-ва Изучения Края».—Б. Г. Чаликов—, «Заметка о питании стерляди под Тобольском»—К. П. Самко—, «К познанию энтомофауны Тоб. Округа».

В. М. Новицкий.

Отчет исследовательского и лечебного отряда общества изучения края при Госмузее Тобсевера, обследовавшего летом 1926 г. Казымский Тузсовет¹⁾ Березовского р-на. Тобокруга Уралобласти.

Зимой 24/25 г. перед Правлением О-ва изучения края при Госмузее Тобсевера мною был выдвинут проект по обследованию р. Казыма и Надыма с целью:

1) выявления лесных ресурсов и колонизационных возможностей р. Надыма;

2) выявления перспектив оседания по р. Надыму безоленных и малооленных самоедов и в верховьях его—казымцев (на почве—лесо-заготовок для снабжения строевым и дровянным лесом Обской губы с ее дельтой, рыболовно-охотничьего промысла, избянного оленеводства и другое);

3) в случае подтверждения не достаточно проверенных данных о благоприятных условиях р. Надыма для колонизации—ориентировочное подыскание района для самоедского оседлого культурного пункта, как основания для будущего очага самоедской культуры;

4) обследования р. Казыма и прилегающей к нему Оби для выявления перспектив организации здесь основного очага советской культуры на туземном Тобсевере.

Первые три вопроса тесно увязывались с последним и из него вытекали (см. подготовленную к печати мою работу: «Казымский-тузрайон, как основной очаг советской культуры на туземном Тобсевере»).

План Правлением был одобрен, средства же удалось изыскать только к 1926 г. в размере 50% сметы, что побудило Правление Общества сократить район намеченного обследования до территории Казымского тузсовета, только что тогда сформировавшегося.

¹⁾ Сохраняю терминологию 1926 г.

Zemulium. Тем не менее журналы вскрытий элжской стерляди, равно как и Енисейской, подчеркивают преимущественно дощный характер питания стерляди в реке, который подтвердился и на стерляди окрестностей Тобольска в Иртыше.

(см. приложенные таблицы).

Литература:

1. А. Л. Бенинг—о питании стерляди. Работы ВВС том IV вып. I, 1912. Саратов.

2. С. Лавров и В. Исаченко—о пище рыб низовьев реки Енисей. Материалы по последованию р. Енисей в рыбопромышл. отношении вып. 3. 1911.

3. В. Л. Исаченко—о питании рыб р. Енисей. Материалы по исследованию р. Енисей в рыбопром. отношении, вып. X.

◆ ● ◆
К. П. Самко.

К познанию энтомофауны Тобольского округа.

I.

Наиболее интересные насекомые, добытые под Тобольском во время экскурсий 1924—1927 г. г. II.*)

9. *Prophraganea picta* Kol.

Панин Бугор, на листе березы, 16. VI. 1925 (ipse!) ♂ coll. Mus. Tob. и на лету, 26. VI. 1925 (ipse!) ♀ coll. Mus. Tob.; сад Ермака, на крошве, 17. VI. 1927 г. (ipse!) 1 экз. coll. m. (Determin. A. V. Martynov).

В сводке А. В. Мартынова (1924)²⁾ ареал этого вида очерчен следующими границами: «Германия, Дания, Англия, Исландия, Скандинавия; Северозападная и Средняя Россия, Южная Сибирь, Амурский край, Уссурийский край, Манчжурия, В.-Тибет». В статье того же автора о мидусинских ручейниках (1924)³⁾ он указан для оз. Буйбы и Алтая. В фауне Тобольского округа *Pr. picta* Kol. отмечается впервые.

10. *Glyphotaelius punctatolineatus* Retz.

Правый берег р. Жуковки, на зарослях прибрежных трав, 18. VI. 1925 (ipse!) 1 экз. coll. Mus. Tob.; оз. Лебяжье, на тальнике, 2. VI 1927 (ipse!) 1 экз. coll. m.; берег Савинского ерика, на осоке, 4. VI. 1927 (ipse!) 1 экз. coll. m.

По А. В. Мартынову (1924)⁴⁾ этот вид свойственен: «Средней и Северной Европе; Западной, Северо-Западной, Северной и,

*) См. Бюллетень О-ва Изуч. Края при Музее Тобольского Севера, 1927, № 1. стр. 10—14.

¹⁾ Все указываемые виды ручейников определены А. В. Мартыновым.

²⁾ А. В. Мартынов. Ручейники. Практическая энтомология, вып. V, ГИЗ, М.-Л. 1924, стр. 198.

³⁾ А. В. Мартынов. К познанию Trichoptera Мидусинского края. 2. Сбор в районе озера Буйбы. Ежегодник Мидусинского Музея, 1924, т. II, стр. 103.

⁴⁾ А. В. Мартынов. Ручейники. Практик. энтомологии, стр. 232.

частью, Средней Европ. России; окр. Барнаула». Поимка его под Тобольском значительно расширяет ареал его обитания в Зап. Сибири к северу.

11. *Limnophilus fuscinervis* Zett.

Кладбище, на листьях шиповника, 17. VII. 1926 (ipse!) 2 экз. coll. m.; р. Бекеревка, на сухих ветвях тальника, 19. VII. 1926 (ipse!) 2 экз. coll. m. и 1 экз. coll. Mus. Tob.; р. Старый Тобол, на осоке, 19. VII. 1926 (ipse!) 1 экз. coll. Mus. Tob.; сад Ермака, на кропиве, 15 и 21. VIII. 1926 (ipse!) 2 экз. coll. m.; Тобольск, на свет, 19. VIII. 1926 (ipse!) 1 экз. coll. Mus. Tob.; правый берег р. Иртыша против кладбища, в углублении берега, 12. IX. 1926 (ipse!) 3 экз. coll. m. и 1 экз. coll. Mus. Tob.

Этот вид указан А. В. Мартыновым (1924)⁵⁾ для: «Германии, Дании, Скандинавии, Финляндии; Северо-Западной и Северной России; окр. Барнаула». Для Тобольского округа он отмечается впервые. В материалах Гос. Музея Тобольского Севера имеются экземпляры *L. fuscinervis* Zett. из Березовского района: с. Вонзеват 2. VIII. 1926. (Б. Г. Чаликов!) 3 экз. Нахождение его с одной стороны под Тобольском (58° 15' сев. шир.), с другой у с. Вонзеват (64° 9' сев. шир.) дает возможность предполагать, что он вместе с *var nigrosignatus* Mart.⁶⁾ распространен по всему Тобольскому округу.

12. *Limnophilus elegans* Curt.

Сад Ермака, на листьях кропивы, 11. VI. 1925 (ipse!) 1 экз. coll. Mus. Tob., 1. VIII. 1926 (ipse!) 1 экз. coll. m.; кладбище, на листьях березы, 29. VI. 1926 (ipse!) 2 экз. coll. m., 17. VI. 1927 (ipse!) 2 экз. coll. m. и 18 VII. 1927 (ipse!) 1 экз. coll. m.

По А. В. Мартынову (1924)⁷⁾ этот вид является чисто европейским населяя: «Северную Европу, Германию, Северо-Западную и часть, Северную Европейскую Россию». Таким образом поимка его в Тобольске является не безынтересным фактом, констатирующим нахождение его в Сибири впервые.

13. *Limnophilus despectus* Walk.

Панин Бугор, при кошени трав, 15. VII. 1925 (ipse!) 1 экз. coll. Mus. Tob.; Сад Ермака, на кропиве, 6. VII. 1926 (ipse!) 3 экз. coll. m., 21. VIII. 1926 (ipse!) 1 экз. coll. m. и 17. VI. 1926 (ipse!) 1 экз. coll. m.; правый берег реки Иртыша у кладбища, под щепокой, 18. VII. 1926 (ipse!) 1 экз. coll. m.; Тобольск, на свет 20. VIII. 1926 (ipse!) 1 экз. coll. m.

А. В. Мартынов. (1924)⁸⁾ отмечает этот вид для: «Финляндии, прибалтийского края, Дании, Восточной Пруссии, Саксонии, Альп; Олонецкой, Петроградской губ., Амурского и Ю. Уссурийского края, о. Сахалина; Новой Шотландии и территории Гудзоно-

⁵⁾ А. В. Мартынов. *Ibidem* p. 268.

⁶⁾ К. П. Самко. К познанию энтомофауны Тобольского Округа. I. Наиболее интересные насекомые, добытые под Тобольском во время экскурсий 1924—1927 г. г. I. Бюлл. О.—ва Изуч. Края при Музее Тобольского Севера, 1927, 1, стр. 11.

⁷⁾ А. В. Мартынов. *Ibidem* p. 282.

⁸⁾ А. В. Мартынов. *Ibidem*, p. 289.

ва залива в Северной Америке». Нахождение его под Тобольском является повинной для Тобольского округа и всей Зап. Сибири.

14. *Calamia virens* L ab *immaculata* Stgr

Казачий взвоз, на лету поздно вечером, 16. VIII. 1925 (ipse!) 1 экз. coll. m, 2. IX. 1926 (ipse!) 1 экз. coll. m. и 11. IX. 1926 (ipse!) 1 экз. coll. m. и 1 экз. coll. Mus. Tob.

В своей всесветной монографии чешуекрылых Seitz⁹⁾ отметил эту форму для: «Венгрии, Юж. России, Армении, Малой Азии, Алтая, Персии, Иссык-куля, и Тарбагатай». В последнее время проф. С. Д. Лавров¹⁰⁾ указал ее для окр. г. Омска. Поимка ее в гор. Тобольске отодвигает ареал ее распространения в Зап. Сибири значительно к северу.

15. *Argyromata splendida* Cr.

Тобольск, сад при музее 23. VII. 1927 (М. П. Тарунин!) 1 экз.¹¹⁾ (Deterin. N. J. Kusnezov!)¹²⁾.

Поимка этого южного полярно-степного вида в Тобольске необычайно интересна, т. к. Тобольск лежит в середине урманно-болотной подзоны Зап. Сибири¹³⁾ вдали от чистых степей. Однако станция поимки этого вида очень близка по своему характеру к степному—сад при музее расположен на плато южного склона правого берега р. Иртыша, растительность которого носит чисто степной характер, состоя из различных Gramineae, Artemisia и т. п.¹⁴⁾

Что же касается до географического распространения этого вида в ближайших и нам районах Сибири, то А. А. Мейнгард (1904)¹⁵⁾ отметил его для ст-цы Семьярской, Семипалатинской обл., и Барнаула (1905)¹⁶⁾, В. Д. Кожанчиков (1923)¹⁷⁾ и С. С. Четвериков (1925)¹⁸⁾ для степной части окр. Минусинска, а проф. С. Д.

⁹⁾ Ad. Seitz Die Grossschmetterlinge der Erde, III, p. 118.

¹⁰⁾ С. Д. Лавров. Материалы к изучению энтомофауны окрестностей Омска. Труды Сибирского Института С.-Х. и Лесоводства, 1927, М. VIII, вып. 3, стр. 66.

¹¹⁾ Экземпляр передан в Зоологический Музей Академии Наук СССР.

¹²⁾ Глубокоуважаемому Н. Я. Кузнецову спешу принести горячую благодарность за любезное содействие в обработке Lepidoptera из окрестностей Тобольска.

¹³⁾ Б. Н. Городков. Опыт деления Западно-Сибирской низменности на ботанико-географические области. Ежегодник Тобольского Губернского Музея, 1916, вып. XXVII.

¹⁴⁾ Вообще крутые склоны Тобольских оврагов являются участками, где как раз сохраняется ещё степная растительность.

¹⁵⁾ А. А. Мейнгард Обзор чешуекрылых. собранных Алтайскою Зоологическою экспедицией 1898 г. профессора Томского Университета Н. Ф. Канциско. Списки коллекций беспозвоночных Зоологического Музея Томского Университета, 1904, ст. III, стр. 43.

¹⁶⁾ А. А. Мейнгард. Обзор сборов по энтомологии в Кулундинской степи и прилегающих местностях Семипалатинской области, произведенных Г. Э. Йоганзенем в июне и июле 1902 г. Списки коллекций беспозвоночных Зоологического Музея Томского Университета, 1905, сп. V, стр. 64.

¹⁷⁾ В. Д. Кожанчиков. Материалы к фауне чешуекрылых Минусинского края (Сибирь, Восточная губ.). Ежегодник Минусинского Музея, 1923, т. I, вып. I, стр. 38.

¹⁸⁾ С. С. Четвериков. Заметки по систематике ночниц (Lepidoptera, Noctuidae) Минусинского края. Ежегодник Минусинского Музея, 1925, т. III, вып. I, стр. 68.

Лавров (1927)¹⁹) указал его для окр. Омска Поимка его в Тобольске является новинкой²⁰) и отодвигает границу его распространения в Зап. Сибири значительно к северу.

16. *Sarabus* (s. str.) *nitens* L.

Толоконные горки, под береговым намывом, 28. V. 1927 (ipse!)

♂ coll. m

Нахождение этого европейского вида в пределах Зап. Сибири констатируется впервые. В каталоге Г. Г. Якобсона (1905)²¹) ареал этой жужелицы очерчен следующими границами: «Англия?, Испания, Франция, Голландия, Бельгия, Германия, Дания, Швеция, Норвегия, (до 70°), Тироль, Нижн. Австрия, Богемия, Моравия, Галиция, Буковина; вся Европейская Россия от Лапландии (68°) до Волынской, Киевской, Харьковской и Пермской губ.» В позднейшей литературе нет указаний, на нахождение этого вида в Сибири. В декабре 1927 г., когда я был в зоологическом Музее Академии наук СССР заведывающий колеоптерологическим отделением В. В. Баровский сообщил мне, что типичный экземпляр этого вида был привезен в 1927 г. из Обдорска К. К. Флеровым, зоологом почвенно-ботанической экспедиции Академии Наук на Северный Урал.²²) Нахождение этого европейского вида с одной стороны под Тобольском (58°15' сев. шир.), с другой под Обдорском (66°31' сев. шир.) во первых указывает на переход его через Уральский хребет в долину Зап. Сибири, во вторых заставляет предполагать, что он свойственен теперь всему течению р. р. Оби и Иртыша в пределах Тобольского округа.

Чтоже касается до таксономического значения тобольского экз. *S. nitens*, то тщательное сличение его с имеющимися в моей коллекции типичными экз. этого вида из Ленинградской губ. не позволило найти между ними никакого существенного отличия. Таким образом приходится признать, что Тобольску свойственна типичная форма этого вида.

17. *Lytta vesicatoria* L.

Сад Ермака, на листе лопуха, 15. VI. 1925 (ipse!) ♂ coll. m.; д. Жуково, на лету, 18. VI. 1925 (ipse!) ♂ coll. m.; Мостовой Лог. на лету, 25. VI. 1926 (Б. Г. Чаликов!) ♂, ♂ ♀ in copula, col. m.; Кладбище, на листе березы за едой, 20. VI. 1927 (ipse!) ♀ coll. m.

Наиболее северным указанием в Зап. Сибири для этого вида являются данные проф. С. Д. Лаврова (1927)²³) для окр. Омска, где он указывается как «очень обыкновенный жук, встречающийся часто массами на осинах, на жимолости и на некоторых других ра-

¹⁹) С. Д. Лавров. *Ibidem*, стр. 87.

²⁰) Правда, в каталоге Н. Ершова и А. Фильда (Н. Ершов и А. Фильд. Каталог чешуекрылых российской империи. СПб, 1870, стр. 31.) эта бабочка отмечена для «Тобольской губ.», но это указание, повидимому, должно относиться к южным уездам (Ишимский, Курганский, Тюкалинский) бывш. Тобольской губернии, т. к. когда в декабре 1927 г. я показал отмеченный экз. *Agr. splendida* Ст. в зоологическом Музее Академии Наук проф. Н. Я. Кузнецову, то вызвал живой интерес к месту поминки, еще не отмеченному в витомологической литературе.

²¹) Г. Г. Якобсон. Жуки России и Западной Европы, 1905, стр. 234.

²²) К сожалению мне не удалось видеть этот экземпляр.

²³) С. Д. Лавров, *Ibidem*, стр. 82.

стеннях, которым значительно вредит». В тобольской энтомофауне *L. visicatoria* отмечается впервые.

18. *Necydalis major* L.

Кладбище, на стволе березы во время откладки яиц, 25.VII. 1927 (ipse!) ♀ coll. m.

Этот широкораспространенный палеарктический вид был уже указан С. М. Чугуновым (1917)²⁴ для Тобольского округа (дер. Денщикова, почти 60° сев. шир.). Отмечаю поимку этого усача для окр. Тобольска ввиду вообще большой его редкости в Сибири. Так С. М. Чугунов сообщает: «хотя личинка последнего (*N. major* L.) живет под корою ив, деревьев, широко распространенных в Европейской России и Сибири, однако этот жук встречается редко и, признаюсь, мне в Сибири попался в первый раз».²⁵)

19. *Aphodius (Acrossus) bimaculatus* Laxm.

Выгон у кладбища, в полусухом коровьем помете, 19. V. 1927 (ipse!) ♀ coll. m.

Поимка этого вида под Тобольском является новинкой для фауны, если не ошибаюсь, всей Сибири, т. е. наиболее восточным пунктом его нахождения является г. Свердловск²⁶). В известной мне литературе по энтомофауне Зап. Сибири я не нашел указаний на этот вид. В моей коллекции имеются экз. *Aph. bimaculatus* из Ирбитского округа: Слободо-Туринское 2—3. VIII. 1927 (А. Л. Попов!) 2 ♂♂. Последняя дата указывает на возможность нахождения этого вида и в других пунктах Зап. Сибири.

II.

Интересные и малоизвестные чешуекрылые (*Lepidoptera*) из пределов Тобольского округа.

Занимаясь постановкой показательной коллекции *Lepidoptera* Тобольского округа в Государственном Музее Тобольского Севера я обнаружил несколько бабочек крайне любопытных с точки зрения их местонахождения и лишней раз подчеркивающих необычайно слабую исследованность нашей интересной во многих отношениях фауны. Виды эти следующие:

1. *Pieris brassicae* L.

Тобольск, выведены из гусеницы (последние собраны в огороде на капусте) 15. VII. 1923 (Г. Я. Кобяков!) ♂ 19. VII. 1923 (Г. Я. Кобяков!) ♀

Литературные данные о распространении капустницы за Уралом в Сибири очень скудны В. А. Щуко (1916)²⁷) отметил ее для Тюмени, но это указание вызвало сомнение и в последнее время И. Филиппьев (1925)²⁸) считает Свердловск «крайним восточным

²⁴) Д—р С. М. Чугунов. От Тобольска до Обдорска летом 1915 года. Ежегодник Тобольского Губернского Музея 1917, вып. XXVIII, стр. 5.

²⁵) Д—р С. М. Чугунов. *Ibidem*, I. с.

²⁶) Эту дату я привожу со слов А. Ф. Теплоухова.

²⁷) В. А. Щуко. Сборы *Lepidoptera* 1915 года в Ялуторовском и Ишимском уездах Тобольской губернии и в окр. Тюмени. Русское Энтомологическое Обозрение, 1916, т. XVI, № 1—2, стр. 148.

²⁸) И. Филиппьев. (Рецензия), „Колосов, Ю. М. Материалы к познанию энтомофауны Урала. IX. Первое дополнение к списку чешуекрылых Пермской губернии“. Известия Энтомологического и Фитопатологического Бюро УОЛЕ, 1925, № 4, стр. 12.

пунктом ее распространения, т. к. указание Щуко из Тюмени основано на смешении с крупной *P. garrus*.²⁹⁾

Тщательное сравнение тобольских *P. brassicae* с экземплярами моей коллекции из Европейской части СССР. (Харьковская губ., Донская и Кубанская обл.) не оставляет никакого сомнения в типичности тобольских экземпляров. Я не знаю материала из Тюмени, послужившего В. А. Щуко для установления *P. brassicae*, но судя потому, что эта бабочка найдена в Тобольске (58°15' сев. шир.), нахождение ее в Тюмени (57°10' сев. шир.), пункте значительно более южном и западном, представляется вполне возможным. Во всяком случае Тобольск является сейчас крайним восточным (вообще) и северным (для Сибири) пунктом распространения *P. brassicae* L.

В Тобольске *P. brassicae* большая редкость. Мне за трехлетнее пребывание здесь не удалось поймать ни одного экземпляра, хотя я несколько раз видел ♂♂ и ♀♀ этого вида, пролетавших по улицам города.

2. *Euchloë chloridice* Hbn.

Панин Бугор, на поляне среди зарослей березняка, 1923 (Г. Я. Кобяков!). ♂

Распространение этого степного вида в Сибири изучено еще слабо. Ближайшие к Тобольску указания относятся к Барнаульскому уезду³⁰⁾, Каинску и Томску³¹⁾, Минусинскому краю: Урянхай³²⁾ и с. Усинское³³⁾, Иркутской губ.: Иркутск³⁴⁾ и ст. «Зима»³⁵⁾. В своем списке чешуекрылых Ялutorовска, Ишима и Тюмени В. А. Щуко. (1916)³⁶⁾ о нем не упоминает. В списке С. Д. Лаврова (1927)³⁷⁾ для окр. Омска его также нет. Повидимому в Тобольске этот вид подходит к северной границе своего распространения в Зап. Сибири.

3. *Pyrameis atalanta* L.

Тобольск, сквер, 8. VII. 1919 (О. Рачинский!) ♀

Бабочка эта свойственна всей Европе, кроме полярных ее окраин, и Африканскому и Азиатскому побережьям Средиземного моря.

²⁹⁾ И. Филиппеву осталась видимо неизвестной работа Ю. М. Колосова (Ю. М. Колосов. Заметка о насекомых Тобольской губернии. Записки УОЛЕ, 1914, т. XXXV, вып. 1—2, стр. 13-36), где на стр. 23 отмечена поймака *P. brassicae* L. в окр. г. Ялutorовска. Следовательно самым восточным пунктом нахождения бабочки пужно было бы считать г. Ялutorовск, а не Свердловск.

³⁰⁾ А. А. Мейнгард. *Ibidem*, p. 47.

³¹⁾ А. А. Мейнгард. Список коллекции чешуекрылых Томской губернии. Списки коллекций беспозвоночных Зоологического Музея Томского Университета, 1905, сп. VI, стр. 114.

³²⁾ П. П. Сумкин и С. С. Четвериков. *Lepidoptera* Минусинского уезда, западного Саяна и Западной части Урянхайской степи. *Horae Soc. Entomol. Ross.*, 1907, т. XXXVIII, № 1—2, стр. 11.

³³⁾ А. А. Мейнгард. К фауне чешуекрылых Сибири. Русск. Этнопол. Обзорение, 1909, т. IX, № 1—2, стр. 152.

³⁴⁾ Т. Юринский. Материалы к изучению лепидоптерологической фауны окрестностей Иркутска. Русск. энтопол. Обзорение, 1907, т. VII, № 4, стр. 272.

³⁵⁾ С. М. Чугунов. Чешуекрылые, собранные около станции Сибирской железной дороги „Зима“ (Балаганский уезд, Иркутской губернии). Русск. Этнопол. Обзорение, 1914, т. XIV, № 2—3, стр. 308.

³⁶⁾ В. А. Щуко, *Ibidem*.

³⁷⁾ С. Д. Лавров, *Ibidem*.

В Сибири она отмечена только, если не ошибаюсь, Staudinger'ом (1901)³⁸⁾ для Алтая и в последнее время Ю. И. Колосовым (1927)³⁹⁾ для окр. г. Челябинска. Нахождение ее в Тобольске значительно отодвигает границу ее распространения в Зап. Сибири к северу.

4. *Arhynnis angarensis* Ersh.

Дер. Серикова, Бронниковской вол., 23. VII. 1927⁴⁰⁾ (В. Пигнатти!) 1 экз. (Determin. № 7. N. J. Kusnezov!).

Поймка *A. angarensis* в окр. Тобольска является необычайно интересным фактом. Вид этот, характерный представитель восточной фауны, по данным Н. Я. Кузнецова (1925)⁴¹⁾ заселяет с одной стороны восточную и арктическую северо-восточную Сибирь, Монголию. Манчжурскую под'область, доходя на западе до низовьев Оленки, Нижней Тунгуски и Алтая, с другой—восточный угол Полярной Европы (бассейн р. Печоры) и север Тобольского округа (Сарая-пауль, Манья-пауль). Нахождение *A. angarensis* под 58° сев. шир. указывает на проникновение ее на юг Зап. Сибири.

5. *Aglia tau* L.

Соколовка, 1902 (Н. Вентцер!) 2 экз.; д. Почеквинна, V. 1921 (Г. Я. Кобяков!) 1 экз.; окр. Тобольска, Архиерейская роща, IV. 1924 (Г. Я. Кобяков!) 1 экз.

Ближайшие к Тобольску указания на нахождение этого вида в Сибири относятся к Томску⁴²⁾, Каинску⁴³⁾, ст. «Зима», Иркутской губ.⁴⁴⁾, Шадринску⁴⁵⁾, Тюмени⁴⁶⁾ и окр. Омска⁴⁷⁾. Поймка его под Тобольском значительно расширяет его ареал в Зап. Сибири к северу.

38) O. Staudinger и H. Rebel. *Catalog der Lepidopteren des palaearctischen Faunengebietes*. Dritte Aufl. Berlin. 1901.

39) Ю. М. Колосов. Мелкие энтомологич. заметки. 3. Несколько данных по фауне насекомых Челябинского округа. Сборник материалов по изучению Челябинского округа. Кн. I. 1927, стр. 16.

40) Дата старого стиля.

41) N. I. Kusnezov. Some new Eastern and American elements in the fauna of Lepidoptera of Polar Europe. *Comptes Rendus de l'Academie des sciences de l'URSS*, 1925, p. 120.

42) А. А. Мейнгард. Список коллекции чешуекрылых (Lepidoptera Fauna palaearticae), принесенных в дар Зоологическому Музею Томского университета пилонером А. А. Мейнгард. Списки коллекц. беспозв. Зоол. Музея Томского Университета, 1904, от. II, стр. 31.

43) А. А. Мейнгард. Список коллекции чешуекрылых Томской губ. Списки коллекции беспозвоноч. Зоол. Музея Томского Университета. 1905, ст. VI, стр. 143 № 189.

44) С. М. Чугунов. *Ibidem*, p. 309.

45) В. А. Шукко. Список бабочек, собранных летом 1914 г. в Шадринском уезде Пермской губ. Русск. Этномол. Обзорение, 1915, т. XV, № 3, стр. 469.

46) В. А. Шукко. Сборы Lepidoptera 1915 года в Ялutorовском и Ишимском уездах Тобольской губернии и в окр. Тюмени. Русск. Этномол. Обзорение, 1916, т. XVI, № 1—2, стр. 148.

47) С. Д. Лавров. *Ibidem*, p. 64.

6. *Catocala fraxini* L.

Тобольск, 27. VIII. 1923 (Г. Я. Кобяков!) 1 экз.

Вид этот констатирован в Зап. Сибири для Томска⁴⁸⁾ и окр. Омска⁴⁹⁾. Нахождение его в Тобольске значительно отодвигает границу его распространения в Зап. Сибири.

ПРИМЕЧАНИЕ. В каталоге Н. Ершова и А. Фильда.⁵⁰⁾ для IX-ой местности (по районированию авторов⁵¹⁾), охватывающий «Тобольскую и Томскую губернии с областями Акмолинскою и Семипалатинскую и Туркестан», отмечен целый ряд бабочек, нахождение которых в пределах современного Тобольского округа вызывает очень большое сомнение. Для примера укажу на *Papilio podalirius* L., многочисленные виды р. *Parnassius* Latr., *Pieris leucodice* Ev., *Colias aurora* Esp., *Vanessa polychloros* L. и т. д. Рассматривая такие данные для нашего округа (севернее 58° сев. широты) лишь как предсказанья, я в помещаемой выше заметке о чешуекрылых Тобольского округа не воспользовался ими, оставляя их до проверки фактическим материалом.

⁴⁸⁾ А. А. Мейнгард. Список II, стр. 34—35 и список VI, стр. 163.

⁴⁹⁾ С. Д. Лавров. *Ibidem*, р. 68.

⁵⁰⁾ Н. Ершов и А. Фильд. Каталог чешуекрылых российской империи СПб. 1870.

⁵¹⁾ Н. Ершов и А. Фильд. *Ibidem*, р. 6.

ВЫШЛИ ИЗ ПЕЧАТИ:

1) „От Урала до Великого океана“

Путеводитель по Уралу, Сибири и Дальнему Востоку
сост. П. Д. Бурсний и С. М. Розенбер.

312 стр. убористого текста с 20 фотогр. и 3 схематическ. картам.
Цена в коленкоровом переплете 2 р. 75 к. без переплета 2 р. 30 к.

2) „По южному Алтаю“ (Зински туристов)

И. Д. Бобынина, С. В. Бруевич и А. Д. Гагарин
стр. 56, с 10 фотографиями и 2 картами. Цена 60 коп.

Заказы направлять: Обществу Изучения Урала, Сибири и Дальнего
Востока, Мо. гва. 19, п. о. Волконка, д. 8.

При получении полностью стоимости вышеуказанных изданий, книги высылаются
за счет Общества.

Пересылка наложенного платежа за счет заказчика.

Ответственный редактор Эристов,

Окряит, № 112, Тираж 500, Ст. зак 742—28 г, Тоб. Гостипография.