

**О составе фауны чернотелок трибы Platyscelidini
(Coleoptera, Tenebrionidae) Узбекистана**

Л.В. Егоров

[Egorov L.V. On the fauna of the tenebrionid tribe Platyscelidini (Coleoptera, Tenebrionidae) of Uzbekistan]

Государственный природный заповедник «Присурский», Чебоксары, Россия.
E-mail: platyscelis@mail.ru

Чернотелки трибы Platyscelidini – одни из наиболее характерных элементов наземной фауны горных районов Азии и в целом степных сообществ Евразии (Егоров, 2002). Это палеарктический таксон, насчитывающий 188 видов в 8 родах (Егоров, 2008; Егоров, 2009).

Изучение фауны Platyscelidini Узбекистана началось в конце XIX в. Наибольший вклад в ее познание внесли известные тенебрионидологи Г. Зейдлиц (G. Seidlitz) и З. Касаб (Z. Kaszab). В рамках познания мировой фауны трибы нами подведены итоги исследования Platyscelidini разных регионов (Егоров, 1999, 2011; Егоров, 2006). Ниже приводится список таксонов Platyscelidini Узбекистана. В работе использована предложенная нами ранее система трибы (Егоров, 2004).

Platyscelidini Lacordaire, 1859.

Bioramix Bates, 1879: *B. (Ovalobioramix) molesta* (Bogatchev, 1947), *B. (Planoplatyscelis) faldermanni* (Seidlitz, 1893), *B. (Tricholeipopleura) sinuatocollis* (Reitter, 1902).

Microplatyscelis Kaszab, 1940: *M. seriepunctata* (Reitter, 1890).

Oodescelis Motschulsky, 1845: *O. (Longuloodescelis) pilosa* L.V. Egorov, 1987, *O. (Ovaloodescelis) similis blattiformis* (Kaszab, 1938), *O. (Spinoodescelis) acuta* Kaszab, 1940, *O. (S.) hirtipennis* Kaszab, 1940, *O. (S.) ovulum* (Seidlitz, 1893), *O. (S.) somocoeloides somocoeloides* (Seidlitz, 1893).

Somocoelia Heyden et Kraatz, 1882: *S. pinguis pinguis* Heyden et Kraatz, 1882.

Таким образом, к настоящему времени с территории Узбекистана отмечено 11 валидных таксонов видового ранга 4 родов Platyscelidini.