

**Материалы по фауне долгоносиков (Coleoptera, Curculionidae),
обитающих в Дагестане на эфедре**

М.Ш. Исмаилова, Г.М. Мухтарова

[Ismailova M.Sh., Mukhtarova G.M. Contribution to the knowledge of the
weevil fauna (Coleoptera, Nanophyidae, Curculionidae) of Ephedra in Dagestan]

Дагестанский государственный университет, Махачкала, Россия.

E-mail: ecodag@rambler.ru

Предлагаемая работа основана на наблюдениях и материалах полученных с участием авторов с 1992 по 2011 гг. на территории Дагестана. Мы выражаем глубокую признательность Б.А. Коротяеву и Г.М. Абдурахманову за помощь в работе.

Род *Ephedra* в Дагестане представлен двумя видами: *E. distachya* и *E. procera*. Эфедра двуколосковая *Ephedra distachya* – многолетний ветвистый вечнозеленый кустарник высотой 20–50 см. Ареал его включает юг европейской части России, Западную Сибирь и Кавказ. Произрастает этот вид в степной и пустынной зонах на равнинах, кое-где заходя в предгорья, на скалах, меловых обнажениях, галечниках, известковых, песчаных и щебнистых почвах. Эфедра рослая, или горная, – *Ephedra procera* – многолетний двудомный густоветвистый кустарник с толстым серым стволом высотой до 1.5 м. По общему характеру распространения это среднеазиатский вид с дизъюнктивным ареалом, основные местонахождения его приурочены к горным системам Казахстана и Средней Азии, а также Восточного Кавказа, где в восточной части Главного Кавказского хребта в пределах Дагестана и Азербайджана проходит юго-западная граница ареала. *Ephedra procera* в Дагестане встречается в Предгорном, Внутригорном и Высокогорном районах на открытых солнечных участках по склонам южной, западной и восточной экспозиций. У верхней границы распространения заросли эфедры выходят на гребни хребтов. Эфедра в Дагестане образует небольшие заросли, в которых является доминантом растительных сообществ.

В Дагестане на эфедре обитают следующие виды: *Barioxyonyx daghestanicus* Kor., *Theodorinus transcausicus* Kor., *Platygasteronyx solskyi* Fst., *Protoxyonyx lunatus* Rtt., *Polydrusus (Scythodrusus) obrieni* Kor., Meleshko et Ism. Все эти виды обитают на *Ephedra procera*, и лишь *Platygasteronyx solskyi* обитает во Внутригорном Дагестане на *E. procera*, а на низменности – на *Ephedra distachya*. *Polydrusus obrieni* эндемичен для Внутригорного Дагестана; *Theodorinus transcausicus* эндемичен для Восточного Кавказа и Северо-Восточной Турции.