

Cerambycidae Калужской губернии.— Списокъ составленъ по сборамъ А. П. Чернышова ¹⁾ въ окрестностяхъ Калуги. Принимая во вниманіе неизученность въ энтомологическомъ отношеніи средней полосы Россіи, я думаю, что и онъ представитъ интересъ. Составъ его мало разнится отъ состава списка усачей Московской губернии; только 2 вида изъ него оказываются еще не найденными въ послѣдней: *Menesia bipunctata* Zoubk. и *Plagionotus floralis* Pall.

Spondylis buprestoides L. Часто, въ сосновыхъ пняхъ.— *Prionus coriarius* L. Часто, на старыхъ лиственныхъ деревьяхъ.— *Rhagium* (s. str.) *mordax* Deg. Часто.— *Rh. (Hargium) inquisitor* L. Часто, на сосновыхъ пняхъ и мертвыхъ соснахъ.— *Rhamnusium bicolor* Schrank. 29. VI. 10, 1. VII. 12; очень рѣдко.— *Pachyta quadrimaculata* L. 29. VI. 09, 1. VII. 12, на цвѣтахъ зонтичныхъ.— *Acmaeops (Dinoptera) collaris* L. Изрѣдка на цвѣтахъ таволги.— *Gaurotes virginea* L. 24. VI. 12.— *Cortodera femorata* F.— *Leptura (Vadonia) livida* F. Часто.— var. *bicarinata* Arnold. 20. VI. 10.— *L.* (s. str.) *rubra* L. Часто.— *L. sanguinolenta* L. Часто.— *L. virens* L. 1. VI. 10; изрѣдка на цвѣтахъ шиповника.— *L. variicornis* Dalman. 10. VII. 09, 20. VII. 12; рѣдко на цвѣтахъ.— *L. (Iudolia) sexmaculata* L. 27. V. 10.— *Strangalia aethiops* Poda. Часто.— *S. attenuata* L. Часто.— *S. bifasciata* Müll. Часто.— *S. melanura* L. Часто.— *S. nigripes* Deg. 30. V. 10, 1. VII. 12; изрѣдка на цвѣтахъ.— *S. quadrifasciata* L. Часто.— *Grammoptera ingraca* Baeskm. 1 экз.— *Necydalis major* L. 17. V. 09, 20. VI. 10, 12. VII. 11, 1. VII. 12; изрѣдка на большихъ старыхъ березахъ.— *Coenoptera minor* L. Часто.— *Asemum striatum* L. Часто на мертвыхъ сосновыхъ деревьяхъ.— *Tetropium castaneum* L. 15 и 19. V. 11; изрѣдка.— *Criocephalus rusticus* L. Часто на мертвыхъ соснахъ.— *Callidium violaceum* L. Часто, хвойный лѣсъ.— *Phymatodes alni* L. 12. V. 11; 1 экз. на штабели березовыхъ дровъ.— *Ph. testaceus* L. 17. V. 06.— *Rhopalopus*

¹⁾ Пользуюсь случаемъ принести здѣсь уважаемому Александру Павловичу Чернышеву мою глубокую благодарность за сообщеніе интереснаго матеріала.

clavipes F. 8. VII. 11, ♂ и ♀; изрѣдка. — *Aromia moschata* L. ♂ и ♀, 6. VIII. 10, 12. VII. 12; на стволахъ больныхъ *Salix capraea*. — *Plagionotus arcuatus* L. 30. V. 12; не часто. — *P. detritus* L. 10 и 26. VI. 10; появился въ поразительномъ количествѣ на свѣжихъ дубовыхъ пняхъ, затѣмъ не встрѣчались даже одиночные экземпляры. — *P. floralis* Pall. 1 экз. за 10—15 лѣтъ коллектированія. — *Xylotrechus rusticus* L. 20. VI. 10, 25. VI. 11, 29. V. 12; на свѣжихъ березовыхъ пняхъ и цвѣтахъ. — *Clytanthus herbsti* Grahn. Изрѣдка. — *Lamia textor* L. 5. IX. 10. 1. VIII. 11, 10. VI. 12; изрѣдка, на старыхъ ивахъ, нѣсколько разъ въ опавшихъ ивовыхъ листьяхъ. — *Monochammus sutor* L. ♂ и ♀, 16. VI. 12; на еловыхъ пняхъ. — *M. rosenmuelleri* Cederh. Часто въ сосновыхъ лѣсахъ на мертвыхъ деревьяхъ. — *Acanthocinus aedilis* L. Часто на мертвыхъ соснахъ. — *A. griseus* F. 20. VI. 10. — *Pogonocherus fasciculatus* Deg. Часто на сосновомъ хворостѣ. — *Exocentrus balteatus* Fabr. 29. VI. 09. — *Anaesthetis testacea* L. 5. VI. 11, 6. VIII. 12; рѣдко. — *Tetrops praeusta* L. Часто на цвѣтахъ и листьяхъ грушъ. — *Agapanthia villosoviridescens* Deg. 12. V. 11. — *Saperda carcharias* L. Часто, на осинѣ. — *S. populnea* L. 8. VI. 11; на осинѣ. — *S. perforata* Pall. — *S. scalaris* L. 10. VIII. 11; рѣдко; на старой яблонѣ. — *Menesia bipunctata* Zoubk. 10. VI. 12; очень рѣдка. — *Phytoecia cylindrica* L. 10. V. 11; рѣдко, на цвѣтахъ. — *Ph. nigricornis* Fabr. 10. VI. 11. — *Oberia oculata* L. 20 и 25. VII. 12; изрѣдка, на ивѣ.

Н. Н. Плавильщиковъ (Москва).