

в раз  
в квартал.

Год издания  
третий.

# БЮЛЛЕТЕНЬ

ОБЩЕСТВА ИЗУЧЕНИЯ КРАЯ  
при Музее Тобольского Севера.

Адрес редакции:  
г. Тобольск. Об-  
щество Изучен.  
Края при Музее  
Тоб. Севера.

№ 1 1930 = Январь-Март = 1930 № 1

**СОДЕРЖАНИЕ:** „Из текущей работы Об-ва“. Лазарев.—„Вопрос краеведения в области коллективизации“. Г. Г. Кусенко.—„Основные показатели культурной пятилетки на Тобольском Севере“. В. Телишев.—„Туземная женщина в борьбе за раскрепощение“. Иванов.—„Придемяныо“. Г. К. Мальцов.—„Маршрут Сургут-Вайсале“. Ю. М. Коло-сов.—„К фауне караузинов“. Т.—„Сообщение об окольцованной утке“. М. Коптилов.—„Никсимвольское городище“.—Н. А. Впрюков.

## Из текущей работы Общества.

### Реорганизация Музея Тобольского Севера.

На основе постановлений IV Уральского Областного Музейного Сопещания с января месяца приступлено к коренной реорганизации Музея, в целях исчерпывающего отражения в нем советского хозяйственно-культурного социалистического строительства и придания возможной популярности музейной экспозиции. Туземный отдел, ввиду опыта, решено реорганизовать по комплексному методу с темами: осязки вогулы и самоеды. Реорганизация вызвала необходимость изготовления значительного количества новых экспонатов, как то, картин, фотоснимков, диаграммы, картограммы, плакатов, схем, моделей, чучел животных и птиц и др. Большинство экспонатов к апрелю месяцу уже готово. На время реорганизации Музей для публики закрыт. Открытие Музея намечено 1-го мая.

С января месяца назначен новый зав. Музеем—г. Гурьев, Т. А., а т. Таруши, М. П. остался зав. Естественно-Географическим Отделом.

### IV Всероссийская Краеведческая Конференция.

С 23 по 26 марта в Москве состоялась IV Всероссийская Краеведческая Конференция, на которой участвовало свыше 200 делегатов. От Тобольска на конференцию был командирован тов. Гурьев. Конференция прошла под знаком теснейшей увязки краеведения с задачами социалистического строительства. Были заслушаны следующие доклады: Роль краеведения на путях социалистического строительства, Задачи и пути краеведческой работы в области промышленности, Задачи краеведческих организаций в условиях социалистической реконструкции сельского хозяйства, Очередные задачи национального краеведения. Марксистский метод в краеве-

При впадении Тоб-Яги в Пур, ширина Тоб-Яги до 200 саж, а Нура, как Оби в Сургуте, от 1 до 1½ верст. Рыба в Тоб-Яге пыжьян. По обоим берегам Тоб-Яги вниз до Вайсале и далее в верх по течению высокий крутой, подобно берегу Иртыша у Тобольска, только много выше, а левый берег низкий, широко заливаемый весной, причем берега Тоб-Яги не заливаются.

При ветре с моря и летом в малую воду под'ем воды моря доходит до Тоб Яги и выше.

Правый берег, высокий, обильно покрыт ягедом; левый же низменный—травой, основные виды которой: пырей, осока, белоголовник, облеп.

Вайсале находится на высоком правом берегу Нура. Никакого леса у Вайсале нет. Лес фактория доставляет верст за 150 сверху Нура, с местности называемой «Юрка-Надо».

Нижне устья Тоб-Яги верст 15 и в длину верст 10, причем не доходит до Вайсале версты четыре, есть остров на Пуре под названием «Тёр-Море». Ничего останавливающего внимание остров не дает, он заливаемый, имеет лишь песок и ракитяк.

У Вайсале Пур до 1 версты в ширину. Пур кончается 5 устьями в островах, также затопляемых и покрытых тальником.

От Вайсале до Сальмерседе (тоже фактория Госторга на левом берегу р. Таз, недалеко от устья) 40 верст пути на оленях без груза 3-4 часа.

Всего пути на оленях считают от Вайсале до Сургута 25-26 дней, до Обдорска 30-31 день, до Березова 40 дней.

Можно установить летнее сообщение от Вайсале до Сургута, причем от Вайсале до Пяко-То на лодке или моторке, Пяко-То—Тром-Юган на оленях и Тром-Юган—Сургут на лодке или моторке.

Ю. М. Колосов.

## К фауне карапузиков Тобольского округа (Coleoptera Histeridae).

Под таким названием К. П. Самко опубликовал в Русском Энтомологическом Обозрении (XXIII, 1929, № 3-4, стр. 277-279) список жуков этого семейства из окрестностей гор. Тобольска по имевшемуся в его распоряжении материалу, преимущественно личных сборов 1925-1928 годов<sup>1)</sup>. Всего в списке приведено 16 видов, что должно составлять не более трети видов, могущих встретиться на территории округа. Само собой разумеется, делать какие либо обобщающие выводы мы считаем пока преждевременным, тем не менее некоторые обобщения и уточнения уже напрашиваются и я позволяю себе поделиться ими с читателями «Бюллетеня».

<sup>1)</sup> Находки более ранних лет отрывочны и случайны, т. ч. на них можно не останавливаться, вдобавок они полностью поглощены последующими изысканиями.

Прежде всего следует отметить, что полученные итоги показывают тождественность фауны окрестностей Тобольска (56° 16') с фауной окр. Свердловска (56° 50'), т. е. из 16 тобольских видов в окр. Свердловска не найден только один (*Hypocassulus conjugens* Pauc), да и это, наверное, объясняется случайностью.

Мало того, совпадает не только наличие видов, но и частота их нахождения<sup>2)</sup>; обычные в Тобольске обычны и под Свердловском (*Hister unicolor*, *impessus*, *striola*, *Sarginus aeneus*), соответственная редкость тоже тождественна тут и там (некоторое исключение может представлять разве *Hister ventralis*, в материале Самко имеющийся в количестве 38 экземпляров, собранных из разных пунктов в разное время). Далее слишком поспешным кажется нам заключение автора (стр. 277, примечание), что о карапузках б. Тобольской губернии в литературе нет никаких указаний (курсив мой. Ю. К.). Мы можем указать автору, например, на опубликование *Sarginus immundus* Gyll. из окрестностей г. Ялуторовска (1928 г.).

В заключение просмотр моей личной коллекции позволяет пополнить список следующими видами: *Platysoma oblongum* F., *Platysoma angustum* Hoffm., *Hister neglectus* Germ., *H. corvinus* Germ., *Gnathopus rotundatus* Kug., *Abraeus globulus* Kr., т. е. считать фауну окрестностей Тобольска равной 22 видам, а Тобольского округа—23 видам. Приведенный мной материал был собран в ближайших окрестностях Тобольска группой ссыльных еще в 1911—1913 г.г., к сожалению без более детальных записей о времени поимки.

В дополнительном списке этом заслуживает внимания обнаружение под Тобольском *Hister corvinus*, для Пермской губ. еще не указанного, т. е. можно было думать, что северная граница его распространения Тобольск не захватит.

Попутно, в связи с ссылкой автора на сводку Г. Г. Якобсона в «Жуках России», не лишним считаю отметить одно небольшое исправление данных этой сводки. Якобсон (стр. 649) подвергает сомнению факт обитания *Sarginus semipunctatus* F. в Московской губернии, несмотря на двукратное указание здесь этого вида—Л. Пидеманом в 1871 г. и Штапге в 1903 г. Факт обнаружения мной *S. semipunctatus* F. в окрестностях Красноуфимска (1925) делает, мне кажется, теперь сомнение излишним.

ПРИМЕЧАНИЕ. Упрек, брошенный мне выше Ю. М. Колосовым, по поводу якобы *слишком поспешного заключения* (курсив мой. К. С.) об отсутствии данных по фауне карапузиков Тобольского округа (заключительная фраза моего примечания «в позднейшей литературе также нет никаких указаний» относится, конечно, к Тобольско-

<sup>2)</sup> При этом для Свердловска я принимаю во внимание, кроме опубликованного материала записи своих филологических дневников.

му округу, а не ко всей губернии), считаю не заслуженным, т. к. данные Колосова (1928)<sup>1)</sup> относятся к Ялutorовку, лежащему вне пределов Тобольского края.

Что касается до подведенных Колосовым итогов по фауне карапузиков Тобольского округа, то необходимо добавить следующее: мною в середине февраля т. г. отослана для напечатания в Томск рукопись, в которой новыми для Тобольского округа отмечены два вида—*Hololepta plana* Sulz (Тобольск) и *Cylistosoma angustatum* Hoffm (д. Дурьинина). Таким образом фауна карапузиков Тобольского округа состоит теперь из 23 видов, а б. Тобольской губ.—из 24 видов<sup>2)</sup>.

В отношении же частоты нахождения отдельных видов следует отметить, что в сборах 1929 года последние представлены следующими количествами: *Platysoma frontale* Payk. (Тобольск)—2 экз., *Pl deplanatum* Gyll. (Тобольск)—2 экз., *Hister cadaverinus* Hoffm. (Тобольск, д. Дурьинина, на падали)—15 экз., *H. unicolor* L. (Тобольск)—18 экз., *H. bissexstriatus* L (Тобольск)—12 экз., *H. striola* Sahlb. (Тобольск, д. Дурьинина)—23 экз., *H. funestus* K. (Тобольск)—10 экз., *H. ventralis* Mars (Тобольск)—13 экз., *H. purpurascens* Herbst (Тобольск)—8 экз., *H. duodecimstriatus* Schr. var. *quattuordecimstriatus* Payk. (Тобольск)—2 экз., *Saprinus semistriatus* Scriba (Тобольск, д. Дурьинина; на трупах различных птиц и мелких млекопитающих)—81 экз., *S. aeneus* L. (Тобольск, д. Дурьинина; вместе с предыдущим и в навозе)—43 экз. и *Нуросаcсifus conjungens* Payk. (Тобольск, д. Дурьинина)—19 экз.

К. Сельго.

## Окольцованная утка.

19 мая 1930 года крестьянином юрт Миримовских Тобольского района Тушаковым доставлена в Музей Тобольского Севера утка соксун ♂ (*Spatula cyreata* L.) с кольцом на ноге. На кольце надпись «Москва Бюц. Сср. Д. 4836». Меры к выяснению места окольцования утки Музеем приняты.

М. Т.

<sup>1)</sup> Ю. М. Колосов. Несколько беглых заметок о насекомых Западной Сибири. Известия Западно-Сибирского Музея, № 1, 1928 г.

<sup>2)</sup> При подведении итогов Колосов упускает из вида, что г. Ялutorовск лежит не в Тобольском округе; следовательно считать *Saprinus immundus* Gyll свойственным нашей фауне немного преждевременно.