

РУССКОЕ ЭНТОМОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОЗРѢНІЕ

ОСНОВАННОЕ

Д. К. Глазуновымъ (С.-Петербургъ), Н. Р. Кокучевымъ (Ярославль), Н. Я. Кузнецовымъ (С.-Петербургъ), А. П. Семеновымъ (С.-Петербургъ), Т. С. Чичеринымъ † (С.-Петербургъ), Н. Н. Ширяевымъ (Ярославль) и А. И. Яковлевымъ (Ярославль)

ИЗДАВАЕМОЕ

Русскимъ Энтомологическимъ Обществомъ.

*Concordiâ parvae res crescunt, discordiâ
maximae dilabuntur.*

Sallust., Jugurtha. 10.

Revue Russe d'Entomologie

FONDÉE PAR

D. Glasunov (St-Petersbourg), A. Jakovlev (Jaroslavl), N. Kokujev (Jaroslavl),
N. Kusnezov (St-Petersbourg), A. Semenov (St-Petersbourg), N. Shiriajev
(Jaroslavl) et T. Tschitscherin † (St-Petersbourg).

éditée par la Société Entomologique de Russie.

T. VI. 1906.



С.-Петербургъ—St-Petersbourg.

Типо-Литографія „Герольдъ“ (Вознесенскій просп., 3).

1906.

РУССКОЕ ЭНТОМОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОЗРѢНІЕ

ОСНОВАННОЕ

Д. Н. Глазуновымъ (С.-Петербургъ), Н. Р. Кокучевымъ (Ярославль), Н. Я. Кузнецовымъ (С.-Петербургъ), А. П. Семеновымъ (С.-Петербургъ), Т. С. Чичеринымъ † (С.-Петербургъ), Н. Н. Ширяевымъ (Ярославль) и А. И. Яковлевымъ (Ярославль)

И ИЗДАВАЕМОЕ

Русскимъ Энтомологическимъ Обществомъ.

*Concordiâ parvae res crescunt, discordiâ
maximae dilabuntur.*

Sallust., Jugurtha, 10.

Revue Russe d'Entomologie

FONDÉE PAR

D. Glasunov (St-Petersbourg), A. Jakovlev (Jaroslavl), N. Kokujev (Jaroslavl),
N. Kusnezov (St-Petersbourg), A. Semenov (St-Petersbourg), N. Shiriajev
(Jaroslavl) et T. Tschitscherin † (St-Petersbourg),

éditée par la Société Entomologique de Russie.

1906.

T. VI. № 1—2.



С.-Петербургъ—St-Petersbourg.

Типо-Литографія „Герольдъ“ (Вознесенскій просп., 3)

1906.

Оглавление.

В. Е. Яковлевъ , Новый видъ <i>Neodordacion</i> G a n g l b. (Coleoptera, Cerambycidae)	1
Андрей Семеновъ , Новая жесткокрылая изъ Сѣмпрѣчья. I	3
Д-ръ П. Сушкинъ , Новая форма <i>Argynnis</i> изъ Тарбагатай (Lepidoptera, Nymphalidae)	5
В. Баронскій , Новый видъ <i>Scymnus</i> изъ С.-Петербургской губерніи (Coleoptera, Coccinellidae)	8
А. А. Яхонтовъ , Опыты съ гусеницами и куколками <i>Vanessa urticae</i> L. (Lepidoptera, Nymphalidae)	10
Андрей Семеновъ , Колеоптерологическія замѣтки. XII	19
А. М. Шугуровъ , Мелкія ортоптерологическія замѣтки. II	21
Андрей Семеновъ , По поводу нахожденія <i>Copris lunaris</i> L. (Coleoptera, Scarabaeidae) въ предѣлахъ Московской губерніи	24
Филиппъ Зайцевъ , Три новыхъ вида <i>Dytiscid</i> 'ъ (Coleoptera)	26
А. М. Шугуровъ , Къ географическому распространію <i>Machilinus rupestris</i> (L u e a s) Silv. (Apterygogenea, Michalidae)	29
В. Е. Яковлевъ , Обзоръ видовъ подрода <i>Compsodordacion</i> G a n g l b. (Coleoptera, Cerambycidae)	32
Г. В. Олсуфьевъ , Нахожденіе <i>Carabus menetriesi</i> H u m m. (Coleoptera, Carabidae) на югѣ Россіи	49
В. Е. Яковлевъ , Обзоръ видовъ рода <i>Byrsinus</i> Fieb (Hemiptera-Heteroptera, Pentatomidae) русско-азиатской фауны.	52
Андрей Семеновъ , Виды рода <i>Physetops</i> M a n n h. (Coleoptera, Staphylinidae) и ихъ географическое распространеніе	53
Б. Поппюсъ , Новый видъ рода <i>Hydaticus</i> L e a c h (Coleoptera, Dytiscidae) изъ сѣверной Манчжуріи	58
Л. Круликовскій , Замѣтка о сборѣ чешуекрылыхъ лѣтомъ 1905 года въ Уржумскомъ уѣздѣ, Вятской губ.	60

Sommaire *).

В. Е. Jakovlev , Nouvelle espèce du genre <i>Neodordacion</i> G a n g l b. (Coleoptera, Cerambycidae)	1
Andreas Semenov , Coleoptera nova heptapotamica. I	3
Dr. P. Sushkin , Ueber eine neue <i>Argynnis</i> -Form aus Tarbagatai (Lepidoptera, Nymphalidae)	5
V. Barovsky , Nouvelle espèce du genre <i>Scymnus</i> du gouvernement de St-Petersbourg (Coleoptera, Coccinellidae)	8
A. A. Jachontov , Quelques expériences avec les chenilles et chrysalides de <i>Vanessa urticae</i> L. (Lepidoptera, Nymphalidae)	10
Andreas Semenov , Analecta coleopterologica. XII	19
A. M. Shugurov , Notices orthoptérológicas. II	21
André Semenov , Sur la présence de <i>Copris lunaris</i> L. (Coleoptera, Scarabaeidae) dans la faune du gouvernement de Moscou	24
Philipp Zaitzev , Drei neue <i>Dytisciden</i> -Arten (Coleoptera)	26
A. M. Shugurov , Sur la distribution géographique du <i>Machilinus rupestris</i> (L u e a s) Silv. (Apterygogenea, Machilidae)	29
B. E. Jakovlev , Revision des espèces du sous-genre <i>Compsodordacion</i> G a n g l b. (Coleoptera, Cerambycidae)	32
G. B. Olsufjev , Sur l'habitat du <i>Carabus menetriesi</i> H u m m. (Coleoptera, Carabidae) dans la Russie méridionale.	49
B. E. Jakovlev , Aperçu des espèces du genre <i>Byrsinus</i> Fieb. (Hemiptera-Heteroptera, Pentatomidae) de la faune russo-asiatique	52
André Semenov , Les espèces du genre <i>Physetops</i> M a n n h. (Coleoptera, Staphylinidae) et leur distribution géographique	53
B. Poppius , Eine neue Art der Gattung <i>Hydaticus</i> L e a c h. (Coleoptera, Dytiscidae) aus der nördlichen Mandshurei	58
L. Krulikovsky , Notice sur la chasse des Lépidoptères durant l'été 1905 dans le district d'Ourjoum, gouv. de Viatka	60

*) Sur la couverture les noms d'auteurs russes sont transcrits en latin. Voir: Verhandl. d. V. Internat. Congr. zu Berlin, 1901, pp. 959—960.

Новый видъ *Scymnus* изъ С.-Петербургской губерніи (Coleoptera, Coccinellidae).

В. Баровскаго (С.-Петербургъ).

Scymnus jacobsoni, sp. n.

Oblongo-ovalis, convexiusculus, ater, albo-pubescent. aequaliter punctatus; callo humerali valde evidente. Os, palpi tarsique flavescens, elytra nigra, maculâ oblongâ postmedianâ rubrâ notata. Prosternum sat latum, lineis parallelis marginem anticum longe non attingentibus. Eritudo pronoti longitudine suâ paulo magis quam duplo major. Metasterni linea mediana impressa prae abdomine in $\frac{1}{6}$ longitudinis suae in carinulam humilem transit. Linea femoralis segmenti primi abdominis apicem segmenti non attingit, atque implena est, i. e. arcus externus tertia suâ parte basali oblitteratus. Long. 2,5 mm.

Rossia sept.: Petropolis.

Продолговато-овальный, къзади немного суженный, черный, довольно густо покрытый бѣловатыми волосками, равномерно пунктированный, съ яснымъ плечевымъ бугромъ. Ротъ, пальпы и лапки желтоватые, первый членикъ сяжекъ значительно свѣтлѣе окрашенъ, чѣмъ послѣдующіе. На каждомъ надкрыльѣ по одному продолговатому красному пятну ниже середины; пятна приближены къ наружному краю надкрылій. Переднегрудка довольно широкая, съ параллельными, не доходящими до края линіями. Ширина грудного щита немного больше, чѣмъ въ два раза, его длины. Линія на заднегрудки, начинаясь почти со середины, на $\frac{1}{6}$ своей длины переходитъ въ маленькій киль, которымъ и кончается. Бедряная линія первого брюшного сегмента, начинаясь отъ основанія, не доходитъ до вершины его; она не полная, т. е. верхняя дуга сглаживается къ концу приблизительно на $\frac{1}{3}$.

По таблицѣ J. W e i s e (Bestimmungs-Tabellen der europäischen Coleopteren, Coccinellidae, Mödling, 1885) этотъ видъ ближе всего подходитъ къ *Scymnus levaillanti* Muls., но многимъ отличается отъ послѣдняго.

Эта интересная находка сдѣлана А. Г. Якобсономъ въ ближайшихъ окрестностяхъ С.-Петербурга, именно на Лахтиской дорогѣ (отъ Елагина о-ва до Лахты) 18. VIII. 1890, и сохраняется въ коллекціи зоологическаго кабинета СПб. Университета. Составляя списокъ *Coccinellidae* С.-Петербургской губерціи, я при пересмотрѣ этой коллекціи обнаружилъ въ ней этотъ видъ *Scymnus*, опредѣленный какъ „*biguttatus* Muls.“—Называю его въ честь Г. Г. Якобсона, не отказавшаго мнѣ въ содѣйствіи при выясненіи этой формы.
