

BULLETIN
DE LA
SOCIÉTÉ IMPÉRIALE
DES NATURALISTES
DE MOSCOU

PUBLIÉ
SOUS LA RÉDACTION DU DOCTEUR RENARD.

ANNÉE 1866.

TOME XXXIX.

—
PÂMIÈRE PARTIE.
—

(Avec 12 planches.)



Moscou.
IMPRIMERIE DE L'UNIVERSITÉ IMPÉRIALE.
1866.

BULLETIN
DE LA
SOCIÉTÉ IMPÉRIALE
DES NATURALISTES

DE MOSCOU.

TOME XXXIX.

ANNÉE 1866.

N^o II.

MOSCOU.

IMPRIMERIE DE L'UNIVERSITÉ IMPÉRIALE.

(Katkoff & C^o.)

S^vm 1866.

ESSAI

D'UN CATALOGUE DES INSECTES DE L'ILE DE CEYLAN

PAR

VICTOR DE MOTSCHOULSKY.

(V. Bullet. 1863. N° 2 et 3.)

SUPPLÉMENT.

Depuis l'achèvement de cet Essai, j'ai reçu de nouveau un assez grand nombre de Coléoptères de l'ile de Ceylan, parmi lesquels beaucoup d'espèces nouvelles, surtout dans les *Ernophages*; ce qui me donne la possibilité de présenter un premier Supplément. Je profite de cette occasion pour expliquer que, dans le Catalogue, sous le nom: Mont Patannas, Sommité Patannas, ou simplement Patannas, se trouvent désignées les prairies élévées de l'ile de Ceylan.

Symphéropol,
le 28 Octobre 1863.

COLÉOPTÈRES.

ENTOMOPHAGES.

*Carabiques.**Caricus* Motsch. n. g.

Stenolophide. Forme de *Stenolophus*, mais élytres plus courtes, plus ovalaires, leurs stries plus profondément imprimées et sans lustre métallique. Caractères des *Anoplogenius*, avec le dernier article des palpes conique et pointu.

Caricus testaceipes Motsch., statura *Stenol. tentoni* sed paulo brevior et minor. Ovatus, convexus, nitidus, niger, elytris paulo infuscatis, his margine subtus, antennis, palpis pedibusque fusco testaceis; capite minuto; thorace subtransverso, marginato, angulis posticis rotundatis; elytris thorace paulo latioribus, ovatis, basi sub-elevatis, distincte striatis, intersticiis convexis.

Long. $2\frac{1}{4}$ l. — lat. $1\frac{1}{4}$ l.

Colombo.

Distrigodes bipunctatus Motsch. $4\frac{1}{4}$ l. *

Siernoxes.

{ *Alaus speciosus* F.

{ Colais id.

— *lateralis* Cand. El. (?) 9 l. *

(¹) Le quatrième volume des Elatérides de M. Candèze ne m'est pas encore parvenu.

- Tetrigus ater* Cand. 43 l. *
- Sphenomerus antennalis* Cand. 6 l. ♂
 — *submetallescens* Cand. 5 l. ♂
 — *canaliculatus* Cand. 5 l. ♂
- Singhalenus taprobanicus* Cand. 6 l. *
- Adiaphorus gracilicornis* Cand. 5 l. *
- Monocrepidius prionurus* Cand. 4 l.
- Heteroderes necombensis* Cand. 5 l. ♂
 — *spinicollis* Cand. 5 l. *
- Anchastus pusio* Cand. 2½ l.
 — *puncticollis* Cand. 2½ l.
 — *humeralis* Cand. 2½ l.
- Melanoxanthus undatus* Cand. 3 l.
 — *scitulus* Cand. 2½ l.
 — *{ discolor* Motsch. 2 l.
 { viticollis Cand.
 — *{ viticollis* Motsch. 2½ l.
 { variegatus Cand.
- { Pharotarsus diptychus* Cand. 4¾ l. *
- { Arhaphes* id. Cand.
- Platynychus* *{ notatus* L. 4 l.
 { pictus Motsch.
- Cardiophorus pallipes* Cand. 3½ l.
 — *stolatus* Er. 3½ l.
 — *sobrinus* Lap. 5 l.
- Cardiotarsus vulneratus* Cand. 5 l.
- Horistonotus fuscipennis* Cand. 1¾ l.
- Melanotus vermiculatus* Cand. 8 l.

Té r é d i e s.

Anthodromius tricolor Motsch., statura *Cyphon*, variabilis sed paulo minor. Corpulentus, ovatus, nitidus, punctatus, niger, antennarum basi capite thoraceque rufo-

testaceis, pedibus pallidis; thorace valde transverso, antice arcuato, angulis posticis acutis apice obtusis; elytris thorace paulo latioribus, grosso irregulariter punctatis, sparsim cinereo puberulis.

Long. 4 l. — lat. $\frac{1}{2}$ l.

Des Montagnes de Nura-Ellia.

Anthodromius cornifrons Motsch., statura et color precedenti sed elytrorum apice testaceo. Corpulentus, ovatus, nitidus, punctatus, niger, antennarum basi, capite, thorace elytrorumque apice rufo-testaceis, pedibus pallidis; fronte antice corniformi producto. (♂ ?)

Long. 4 l. — lat. $\frac{1}{2}$ l.

Des Montagnes de Nura-Ellia.

RHYPHOPHAGES.

Crassicornis.

Cryptophagus ceylonicus Motsch., statura *Crypt. dentati* sed thoracis lateribus simpliciter arcuatis non dentatis. Elongatus, subovatus, convexus, nitidus, punctatus, rufo-testaceus, oculis nigris; thorace transverso, lateribus aequaliter arcuatis, reflexis; elytris thorace paulo latioribus, subrugoso punctatis, seriatim pilosis.

Long. $\frac{3}{4}$ l. — lat. $\frac{1}{2}$ l.

Des Montagnes de Nura-Ellia.

Globicornes.

Brachypeplus omalinus Murray Mon. $4\frac{1}{2}$ l.

— *notatus* Murr. Mon. $4\frac{3}{4}$ l.

Carpophilus fulvipes Motsch. (*Ecnomorphus*).

— *fusculus* Motsch. (*Ecnomorphus*).

Carpophilus funereus Murr. Mon. $4\frac{1}{4}$ l.

- { ligatus Motsch.
- vittatus Motsch.
- bifenestratus Murr. Mon. $4\frac{1}{8}$ l.
- { obsoletus Er.
- cribellatus Motsch.
- strigipennis Motsch.
- cylindricus Murr. Mon. $4\frac{1}{4}$ l.
- curidus Dej. $4\frac{1}{2}$ l.

Nitops pubescens Murr. Mon. $4\frac{1}{4}$ l.

Eidocolastus plagiaticornis Motsch. (*Colastus*) 4 l.

Haptoncus tetragonus Murr. Mon. 4 l.

- *pubescens* Murr. Mon. $\frac{3}{4}$ l.

Murmidius bifasciatus Motsch., statura *Murmidi.* advenae sed latior et major. Ovatus, subconvexus, nitidus, rufo-piceus; elytris subtiliter rugulosis, basi apiceque fasciis rufis.

Long. $\frac{3}{4}$ l. — lat. $\frac{1}{2}$ l.

Des Montagnes de Nura-Ellia.

PSEUDORHYPOPHAGES.

Mycetophiles.

Diplocoelus indicus Motsch., statura *Diploc.* fagi sed angustior et duplo minor. Elongatus, subconvexus, postice attenuatus, nitidus, punctatus, pilosus, brunneus; thorace transverso, lateribus arcuatis, reflexis; elytris thoracis latitudine, punctato striatis.

Long. $\frac{3}{4}$ l. — lat. $\frac{1}{3}$ l.

Des Montagnes de Nura-Ellia.

Hydnobius tropicus Motsch., statura et color *Hydn.* punctati sed paulo minor. Ellypticus, subconvexus, vix

punctatus, nitidus, fulvo testaceus, oculis nigris; elytris punctato striatis, interstitiis planis, subtilissime rugulosis.

Long. 4 l. — lat. $\frac{1}{2}$ l.

Des Montagnes de Nura-Ellia.

Cybocephalus smaragdicollis Motsch., statura et color *Cyboceph. festivi* sed duplo longior. Oblongus, convexus, nitidus, glaber, niger, capite thoraceque smaragdulo aureis, pedibus pallidis; elytris ovatis.

Long. $\frac{3}{4}$ l. — lat. $\frac{1}{2}$ l.

Des Montagnes de Nura-Ellia.

Stenotarsus ceylonicus Motsch., statura et color *Sten. ferruginei* Say sed paulo brevior. Oblongo subrotundatus, convexus, nitidus, punctulatus, sparsim pilosus, castaneus, antennis infuscatis; thorace valde transverso, utrinque lato impresso, marginato; elytris leviter punctato striatis.

Long. $4\frac{1}{4}$ l. — lat. $\frac{3}{4}$ l.

Des Montagnes de Nura-Ellia.

ANTHOPHILES.

Obtusipennes.

Statura ceylonica Motsch., statura *Lagr. hirtae* sed paulo angustior. Elongato-ovata, convexa, subnitida, punctata, fusco testacea, capite thoraceque obscurioribus; oculis magnis cinereis, in fronte valde approximatis; thorace capitinis latitudine, rugoso punctato; elytris thorace fere duplo latioribus, punctato striatis, interstitiis subconvexis, sparsim pilosis; antennis dimidio corporis longioribus, tenuis.

Long. $2\frac{1}{2}$ l. — lat. 4 l.

Des Montagnes de Nura-Ellia.

Je possède encore trois espèces indiennes; l'une *St. nigripennis* est à peine plus grande et d'un testacé rougeâtre avec les élytres noires, l'autre *St. testacea* de la même taille, mais de couleur jaune rougeâtre, et la troisième *St. major* presque six fois plus grande, d'un noir brunâtre unicolore, vient de Java. Elles ont tous les yeux grands et rapprochés sur le front.

Salpingus ceylonicus Motsch., statura *Salp. bimaculata* sed brevior et fere duplo minor. Elongato-subovatus, convexus, nitidus, punctatus, nigro-aeneus, ore antennarum basi, tibiis tarsisque testaceis, thorace piceo, subquadrato, lateribus aequaliter arcuatis; elytris thorace vix latioribus, et plus duplo longioribus, postice paulo attenuatis, basi punctato striatis, humeris subpiceis.

Long. $\frac{1}{2}$ l. — lat. $\frac{1}{4}$ l.

Des Montagnes de Nura-Ellia.

XYLOPHAGES.

Longicornes.

{ *Macrocephalus cinereomaculatus* Motsch.
 Tropideres id.

Macrocephalus marmoratus Motsch., statura *Macroc. cincti* sed magis ellypticus et quadruplo minor. Elongato ellypticus, convexus, punctulatus, opacus, puberulus, piceus, cinereo variegatus, antennarum apice tarsisque infuscatis; thorace transverso, antice attenuato, postice transversim impresso et carinato; elytris thoracis latitudine, parallelis, punctato striatis, intersticiis ad basin subelevatis.

Long. $\frac{3}{4}$ l. — lat. $\frac{1}{2}$ l.

Des Montagnes de Nura-Ellia.

Araeocerus rhodopus Dalm.

Urodon maculatus Motsch., statura *Ur. concolori* sed elytris maculatis. Elongato-subovatus, convexus, cinereo sericeus; elytris antice utrinque macula magna posticeque variegato nigris, antennis pedibusque brunneo rufis, apice infuscatis.

Long. $\frac{3}{4}$ l. — lat. $\frac{1}{2}$ l.

Des Montagnes de Nura-Ellia.

Urodon tantillus Motsch., statura *Ur. pygmaei* sed oblongior et fere duplo minor. Oblongo subovatus, convexus, punctatus, piceus, cinereo velutinus, antennis tibiis tarsisque testaceis.

Long. $\frac{1}{2}$ l. — lat. $\frac{1}{4}$ l.

Des Montagnes de Nura-Ellia.

Urodon nigripes Motsch., statura et magnitudine precedenti sed antennis pedibusque piceo-nigris. Subovatus, convexus, punctatus, piceus, cinereo puberulus; elytris profundo punctato striatis, interstitiis rugulosis, sutura subalbido pubescens.

Long. $\frac{1}{2}$ l. — lat. $\frac{1}{4}$ l.

Des Montagnes de Nura-Ellia.

Variicornes.

Rhysodes punctostriatus Motsch., statura et color *Rhysod. exarati* sed paulo minor. Elongatus, antice leviter attenuatus, nitidus, nigro piceus; capite oblongo, postice vix angulato, medio bisulcato; thorace oblongo-ovato, lato trisulcato, sulcis integris; elytris thorace latioribus et plus duplo longioribus, grosso punctato striato.

tis, stria subsuturali profundo impressa, interstitiis fere planis; apice utrinque unicarinato.

Long. $2\frac{1}{2}$ l. — lat. $\frac{3}{4}$ l.

Des Montagnes de Nura-Ellia.

Phylothermus brevis Motsch., statuta *Phylot. Montandoni* sed brevior et triplo minor. Subelongato ova-tus, convexus, subnitidus, grosso punctatus, pilosus, rufo-testaceus, antennis pedibusque paulo dilutioribus; thorace subtransverso, lateribus leviter arcuatis; elytris thoracis latitudine et duplo longioribus, profundo punctato striatis, apice leviter attenuatis.

Long. $\frac{1}{2}$ l. — lat. $\frac{1}{4}$ l.

Des Montagnes de Nura-Ellia.

Olonthogaster Motsch. n. g.

Hylésinide de forme un peu cylindrique entre *Dendroctomus* et *Hylesinus*. Tête petite, avancée. Corselet atténue en avant, subconique. Élytres de la largeur du corselet, cylindriques, arrondies en arrière, profondément striées par de gros points imprimés. Funicule antennaire composé de cinq articles, massue allongée, elliptique, déprimée, uniarticulée, occupant la moitié de la longueur de l'antenne.

Olonthogaster nitidicollis Motsch., statuta *Dendroct. piniperdae* sed dimidio brevior. Subcylindricus, antece attenuatus, postice rotundatus, punctatus, nigro piceus, palpis antennis tarsisque rufo testaceis, thorace pedibusque rufo piceis; fronte aureo villosa, thorace transverso, antece conico attenuato, postice truncato, nitido, punctato; elytris thoracis latitudine et duplo longioribus, pro-

funde striatis, interstitiis rugosis, apice paulo tuberculatis.

Long. $1\frac{1}{4}$ l. — lat. $\frac{3}{4}$ l.

Des Montagnes de Nura-Ellia.

Olonthogaster nudifrons Motsch., statura precedenti sed paulo minor. Subcylindricus, antice attenuatus, postice rotundatus, punctatus, sparsim pilosus, piceus, thorace pedibusque rufescens, antennis rufo-testaceis; fronte subimpressa, denudata; thorace transverso, antice attenuato, nitido, punctato, lateribus subarcuatis; elytris thorace fere angustioribus, crenato striatis, interstitiis inaequalibus, seriatim pilosis.

Long. 4 l. — lat. $\frac{1}{2}$ l.

Des Montagnes de Nura-Ellia.

Hylesinus sericeus Motsch., statura *Phloiot. oleae* sed paulo angustior. Breviter cylindricus, nigro-piceus, antennis rufo-testaceis, thorace rugoso tuberculato, convexo, postice elevato, antice subattenuato; elytris thoracis latitudine, sed duplo longioribus, sericeo puberulis, striato punctatis, interstitiis seriatim subpilosis.

Long. $\frac{3}{4}$ l. lat. $\frac{3}{8}$ l.

Des Montagnes de Nura-Ellia.

Phloiotribus subquadratus Motsch., statura *Hyl. serraticorni* sed brevior. Breviter subcylindricus, cinereo puberulus, punctulatus, nigro piceus; thorace valde transverso, crebre punctulato; elytris thorace paulo latioribus, et fere duplo longioribus, transverso rugosis, seriatim pilosis, striis antice vix distinctis.

Long. $\frac{1}{2}$ l. — lat. $\frac{1}{3}$ l.

Des Montagnes de Nura-Ellia.

Hypoborus cinereotestaceus Motsch., statuta *Hyp. fici* sed angustior. Breviter cylindricus, subnitidus, cinereo testaceus; thorace subtransverso, vix punctato, dorso antice tuberculato rugoso; elytris thoracis latitudine et $1\frac{1}{2}$, longioribus, seriatim cinereo pilosis, interstitiis subrugulosis.

Long. $\frac{2}{3}$ l. — lat. $\frac{1}{2}$ l.

Des Montagnes de Nura-Ellia.

Je possède encore du continent des Indes orientales deux autres espèces: *Hyp. nebulosus* Motsch. qui a la taille et les couleurs du *Hyp. cinereotestaceus*, mais qui est le double plus large, et le *Hyp. dorsalis* Motsch. également de la couleur des précédents, mais le double plus grand, et avec la base du corselet d'un blanc jaunâtre.

Anodius distinctus Motsch., statuta et color *Anod. pusilli* sed paulo minor. Subovato cylindricus, subnitidus, rufo testaceus, antennis pedibusque dilutioribus; thorace subtransverso crebre punctato, dorso subelevato, antice posticeque angustato; lateribus arcuatis; elytris thoracis latitudine et duplo longioribus, vix distincte striatis, seriatim pilosis.

Long. 1 l. — lat. $\frac{1}{2}$ l.

Des Montagnes de Nura-Ellia.

Phlaeotrogus crassiusculus Motsch., statuta *Phlaeotr. obliquecaudi* sed duplo brevior. Breviter subcylindricus, nitidus, rufo - testaceus, apice paulo infuscato, subpiloso; thorace antice ruguloso; elytris thoracis latitudine et duplo longioribus, subtiliter punctulatis, postice vix

tuberculatis sed subseriatim pilosis, in maris paulo brevioribus et postice leviter declivis.

Long. 1 l. — lat. $\frac{1}{2}$ l.

Des Montagnes de Nura-Ellia.

Techa velutina Motsch., statura et color *Techae pellitae* Chev. sed paulo brevior. Subovata, convexa, antice posticeque attenuata, nigro-picea, undique cinereo-velutina, humeris leviter dilatatis.

Long. 1 l. — lat. $\frac{1}{2}$ l.

Des Montagnes de Nura-Ellia.

Techa minuta Motsch., statura precedenti sed quadruplo minor et brevior. Breviter subovata, convexa, nigra, undique cinereo albido densissime pubescens.

Long. $\frac{1}{2}$ l. — lat. $\frac{1}{4}$ l.

Des Montagnes de Nura-Ellia.

Techa angustata Motsch., statura *Driophil. pusilli* sed minor, elytris striis nullis. Elongata, nitida, impunctata, nigra, cinereo sericea; capite occulto; thorace subquadrato, convexo, angulis posticis dilatatis, acutis; elytris thoracis basi latitudine, et duplo longioribus.

Long. $\frac{1}{2}$ l. — lat. $\frac{1}{4}$ l.

Des Montagnes de Nura-Ellia.

Xyletinus pumilus Motsch., statura *Xyl. pectinati* sed octo duplo minor et paulo brevior. Subcylindricus, nitidus, punctulatus, castaneus cinereo-pubescent; thorace transverso, postice subconvexo; elytris thorace latio-

ribus et plus duplo longioribus, punctato striatis, cinereo puberulis.

Long. $\frac{1}{2}$ l. — lat. $\frac{1}{4}$ l.

Des Montagnes de Nura-Ellia.

Sericorhynus rotundatus Motsch., statura et color *Sericorh chinensi* sed brevior et quadruplo minor. Breviter ovatus, convexus, nitidus, rufo testaceus, cinereo pubescens, antennis pedibusque pallidis, oculis nigris.

Long. $\frac{1}{2}$ l. — lat. $\frac{1}{2}$ l.

Des Montagnes de Nura-Ellia.

Bruchus trifasciatulus Motsch., statura *Bruch. gitoi* sed paulo minor. Ovatus, nigro piceus, cinereo pubescens; elytris cinereo alboque maculatis, nigricante trifasciatis, antennarum basi, tibiis tarsisque rufo testaceis, posticis infuscatis; thorace conico, femoribus posticis dentiformi excavatis.

Long. 4 l. — lat. $\frac{1}{2}$ l.

Des Montagnes de Nura-Ellia.

Spermophagus niger Motsch., statura *Spermoph. rotundati* sed paulo major et angulis humeralis non productis. Rotundato subovatus, subconvexus, nitidus, niger, sparsim cinereo puberulus; elytris punctato striatis, dorso punctis cinereis nonnullis transversim dispositis, interstitiis subrugulosis.

Long. 4 l. — lat. $\frac{3}{4}$ l.

Des Montagnes de Nura-Ellia.

ERNOPHAGES.

Brachycéphales.

Orsodacna indica Motsch., statura *Orsod. cerasi* sed $\frac{1}{4}$, minor. Elongata, subelliptica, parallela, nitida, rufo testacea, elytris pedibusque pallidis. antennis antice, oculis, scutello suturaque nigris, tarsis infuscatis; elytris ruguloso punctatis, sparsim puberulis.

Long. $4\frac{3}{4}$ l. — lat. $\frac{3}{4}$ l.

Des Montagnes de Nura-Ellia.

Zeugophora apicalis Motsch., statura *Lemae cyanellae* sed testacea. Elongato subquadrata, convexa, subnitida, punctata, breviter puberula, rufo testacea, oculis, antennis, pectore, geniculis, tibiis tarsisque nigris; elytris pallidis, apice nigris; thorace subquadrato, lateribus utrinque angulatis; elytris fortiter punctatis.

Long. $4\frac{3}{4}$ l. — lat. $\frac{3}{4}$ l.

Des Montagnes de Nura-Ellia.

Poecilomorpha nigrocyanea Motsch., statura *Lemae cyanellae* sed paulo angustior. Elongato subquadrata, parallela, nitida, nigrosubcyanea, ore, fronte antice, antennarum basi pedibusque rufo-testaceis; oculis promenulis; thorace medio transversim impresso; elytris thorace fere duplo latioribus et triplo longioribus, subtiliter punctulatis, humeris subelevatis, rectangulis.

Long. $4\frac{1}{2}$ l. — lat. 4 l.

Des Montagnes de Nura-Ellia.

Eumolpus setulosus Motsch., statura *Pachneph. arenari* sed brevior. Elongato quadratus, convexus, opacus,

punctatus, fusco testaceus, antennis pedibusque rufo-testaceis, griseo puberulus; thorace transverso, lateribus arcuatis; elytris thorace fere duplo latioribus, subquadратis, rugoso punctatis, seriatim setulosis.

Long. 4 l. — lat. $\frac{1}{2}$ l.

Des Montagnes de Nura-Ellia.

Eumolpus picipes Motsch., statuta precedenti sed pedibus nigropiceis. Elongato quadratus, subnitidus, punctatus, nigro-piceus; thorace crebre punctato; elytris rugoso punctatis, seriatim setulosis, antennis paulo in-crassatis, humeris promenulis.

Long. 4 l. — lat. $\frac{1}{2}$ l.

Des Montagnes de Nura-Ellia.

Une espèce voisine, le double plus grande, habite le continent indien; elle présente les mêmes couleurs et se distingue par son corselet fortement ruguleux; les élytres sont simplement pubescentes, je l'ai nommée *Eumolpus rugicollis*. Une seconde espèce, *Eumolpus fascicularis* Motsch., de la même taille, de la même forme et du même pays que la précédente, présente une couleur brune plus uniforme et sur les élytres des sétules élevées et des fascicules tuberculiformes.

Eumolpus albostriatus Motsch., statuta *Eum. viti* sed paulo minor. Subquadratus, convexus, punctatus, fusco-testaceus, cinereo puberulus, antennis pedibusque rufescens-tibus, fronte thoraceque fusco vittatis, elytris fusco variegatis, utrinque seriis tribus macularum albidis striiformi dispositis.

Long. $4\frac{3}{4}$ l. — lat. 4 l.

Une espèce complètement semblable, *Eum. incanus* Motsch., se distingue de la précédente par le manque de bandes brunes sur le front et le corselet et des taches blanches striiformes sur les élytres. Elle vient du continent indien. Une seconde espèce *Eum. rufulus* Motsch. présente la taille, la forme, et les couleurs de notre *Eum. vitis*, à l'exception de la tête, du corselet et du dessous du corps, qui sont roux comme les élytres. Une troisième espèce de la même localité, *Eum. fusculus*, présente une couleur d'un roux un peu brunâtre, le reste comme chez le *rufulus*, mais une taille doublement plus grande. Tous du continent indien.

Odontionopa Motsch. n. g.

Eumolpide à couleurs métalliques avec les élytres profondément striées. Corselet granuleux ou transversalement striguleux. Elytres plus larges que le corselet avec les angles huméraux saillants. Pattes antérieures un peu plus longues que les intermédiaires. Antennes grèles, souvent plus longues que la moitié du corps.

Odontionopa aenea Motsch., statura *Eum. viti* sed quadruplo minor. Brevis subquadrata, convexa, nitida, punctata, cupreo-aenea, antennarum basi pedibusque rufo-testaceis; capite minuto, triangulare; thorace subtransverso, crebre punctato, lateribus arcuatis, angulis posticis acutis; elytris thorace dimidio latioribus, antice transversim impressis, profunde crenato striatis, interstitiis carinatim elevatis.

Long. $1\frac{1}{4}$ l. — lat. $\frac{1}{2}$ l.

Des Montagnes de Nura-Ellia.

Une seconde espèce le double plus grande et entièrement verte est l'*Odont. viridula* Murray de l'Old Calabar.

Une autre de la taille de l'*Eum. vitis*, *Odont. cupripes* Motsch. vient de Célèbes. Elle est verte avec des dessins noirs sur le corselet et les élytres, et avec les pattes d'un beau cuivré doré. Une troisième espèce du continent indien *Odont. stigicollis* a une forme plus étroite, couleur d'un bronzé verdâtre, le corselet strigulé transversalement, les élytres marquées sur le dos de quatre taches violâtres comme la suture, à peu près comme on le voit chez le *Bimbidium palludosum*.

Nodostoma picturata Motsch., *statura Eum. viti* sed triplo minor. Subquadrata, subconvexa, punctata, nitida, testacea; fronte, thorace crebre punctato et impresso, corpore subtus, geniculis, tibiis tarsisque infuscatis; antennis (basi excepto), oculis, elytrorum maculis utrinque quator suturaque nigris, elytris leviter punctato striatis.

Long. $4\frac{1}{4}$ l. — lat. 1 l.

Des Montagnes de Nura-Ellia.

Nodostoma triangularis Motsch., *statura Eum. viti* sed quadruplo minor. Subquadrata, convexa, nitida, testacea, oculis, thoracis maculis duabus, medio elytrorum triangulari utrinque ad basin suturaque nigris; elytris distincte punctato striatis.

Long. $4\frac{1}{4}$ l. — lat. $\frac{3}{4}$ l.

Des Montagnes de Nura-Ellia.

Des espèces testacées la *Nod. signata* est la plus petite; la *Nod. triangularis* très-voisine, mais le double plus grande.

Nodostoma fulva Motsch. $4\frac{1}{4}$ l. +

Une espèce entièrement semblable du continent indien

Nod. lateralis Motsch. se distingue par les côtés latéraux des élytres, qui sont largement bruns.

Nodostoma suturalis Motsch., statura precedenti sed paulo minor. Subquadrata, convexa, nitida, rufo-testacea, oculis suturaque nigris; thorace crebre punctato; elytris leviter punctato striatis.

Long. $4\frac{1}{4}$ l. — lat. $\frac{3}{4}$ l.

Des Montagnes de Nura-Ellia.

Nodostoma uniformis Motsch., statura precedenti sed unicolor. Subquadrata, convexa, nitida, rufo-testacea, oculis nigris; thorace crebre punctato; elytris distincte punctato striatis.

Long. 4 l. — lat. $\frac{1}{2}$ l.

Des Montagnes de Nura-Ellia.

De Java je possède encore deux espèces voisines et de couleur testacée; l'une *Nod. concolor* un peu plus petite que *l'uniformis* s'en distingue par les stries des élytres plus profondément imprimées à la base, y formant des intervalles un peu élevés. L'autre est quatre fois plus grande, d'un testacé assez pâle uniforme, avec un corselet et des élytres glabres sans ponctuation visible. Elle porte le nom de *Nod. flavescens* Motsch.

Nodostoma oblonga Motsch, precedentis duplo oblongior. Elongato-quadrata, convexa, nitida, rufo-testacea, oculis nigris; thorace punctulato; elytris subtiliter punctato striatis.

Long. $4\frac{1}{4}$ l. — lat. $\frac{1}{2}$ l.

Des Montagnes de Nura-Ellia.

Cryptocephalus carneobifasciatus Motsch., statura *Crypt. vittati* sed brevior et color tantum diversus. Elongato subovatus, convexus, nitidus, glaber, pallido testaceus, oculis griseo nigris, elytrorum basi fasciaeque postica ad suturam paulo interruptis, carnis; thoracis medio punctis duabus infuscatis; elytris oblique tenue punctato-striatis.

Long. $1\frac{3}{4}$ l. — lat. $1\frac{1}{4}$ l.

Des Montagnes de Nura-Ellia.

Monachus luridus Motsch., statura *Monach. saponati* sed duplo major et testaceus. Ovatus, convexus, nitidus, glaber, pallido testaceus, antennis antice oculisque nigris; thoracis angulis posticis acutis; elytris subtiliter oblique punctato striatis.

Long. $1\frac{1}{2}$ l. — lat. 1 l.

Des Montagnes de Nura-Ellia.

Monachus flaveolus Motsch., statura precedenti sed plus quadruplo minor. Ovatus, convexus, nitidus, punctulatus, rufo testaceus; elytris distincte punctato-striatis.

Long. $\frac{3}{4}$ l. — lat. $\frac{1}{2}$ l.

Des Montagnes de Nura-Ellia.

Monachus basalis Motsch., statura precedenti sed elytrorum basi infuscata. Subovatus, convexus, nitidus, punctulatus, rufo-testaceus; elytris distincte punctato striatis, basi angustissime infuscatis.

Long. $\frac{3}{4}$ l. — lat. $\frac{1}{2}$ l.

Des Montagnes de Nura-Ellia.

Monachus suturalis Motsch., statura et color precedenti sed sutura nigra. Subovatus, convexus,

N° 2. 1866.

27

punctulatus, nitidus, rufo-testaceus, elytrorum basi, lateribus suturaque nigris, apice rufo-testaceo; elytris profundo punctato striatis.

Long. $\frac{3}{4}$ l. — lat. $\frac{1}{2}$ l.

Des Montagnes de Nura-Ellia.

Monachus nigrolimbatus Motsch., statura precedentis sed elytris lato nigro limbatis. Subovatus, convexus, nitidus, punctulatus, rufo-testaceus, elytrorum limbo, sutura corporeaque subtus nigris, pectore anoque testaceis; elytris profunde punctato-striatis.

Long. $\frac{3}{4}$ l. — lat. $\frac{1}{2}$ l.

Des Montagnes de Nura-Ellia.

Monachus acutangulus Motsch., statura precedentis sed elytris nigris. Subovatus, convexus, nitidus, punctulatus, niger, thorace pedibusque rufo-testaceis, fronte infuscato; elytris profunde punctato-striatis.

Long. $\frac{3}{4}$ l. — lat. $\frac{1}{2}$ l.

Des Montagnes de Nura-Ellia.

Bathseba Motsch. n. g.

Calaspide à antennes grèles et plus longues que la moitié du corps. Forme allongée ovalaire, convexe. Yeux un peu rapprochés sur le front, en arrière de l'insertion des antennes. Corselet transversal, arrondi en avant, un peu bissinué à la base, avec les angles postérieurs droits. Écussions triangulaire. Élytres à peine plus larges que le corselet, régulièrement allongées, ovalaires, un peu obliquement striées par des points imprimés; intervalles planes, angles huméraux à peine distincts.

Bathseba ferruginosa Motsch., statura *Colaph. Sophiae* sed angustior et magis elliptica. Oblongo-ovata, curvata, convexa, nitida, rufo-castanea, antennis pedibusque rufo-testaceis; fronte inter oculos impresso; thorace capite duplo latiore, valde transverso, subtiliter sparsim punctulato, basi utrinque sinuato, lateribus subarcuatis, marginatis, angulis posticis rectis; elytris thorace vix latioribus et triplo longioribus, ovalis, punctato striatis, intersticiis planis, humeris subelevatis.

Long. $1\frac{1}{2}$ l. — lat. $1\frac{1}{4}$ l.

Des Montagnes de Nura-Ellia.

Par sa forme elliptique cet insecte rappelle un peu quelques *Pédirinites*.

Luperus coeruleipennis Motsch., statura et color *Lup. pyrennaei* sed paulo minor et brevior. Elongato subovatus, convexus, nitidus, capite, antennarum basi, thorace, scutello pedibusque, pallido flavis; elytris coeruleis, subtilissime punctulatis; antennis antice corporeaque subtus nigris.

Long. $1\frac{1}{2}$ l. — lat. $\frac{3}{4}$ l.

Des Montagnes de Nura-Ellia.

Trichocerastes Motsch. n. g.

Gallérucide de la forme parallèle des *Luperus*. Yeux grands et saillants. Corselet plus étroit que la tête ou aussi large, avec une impression transversale au milieu. Élytres plus larges que le corselet, allongées et parallèles, sans stries rugueusement ponctuées. Antennes chez le mâle, plus longues que le corps et garnies de longs poils droits et épars.

Trichocerastes flavofemoratus Motsch., statura *Lup. longicorni* sed paulo minor. Elongatus, parallelus, subconvexus, nitidus, viridis, oculis antennis corporeque subtus nigris, antennarum articulo primo, fronte femori- busque testaceis, tibiis tarsisque infuscatis; oculis magnis, prominulis; thorace capite angustiore, subquadrato, postice paulo angustato, medio transversim impresso, glabro; elytris thorace fere duplo latioribus et quadruplo longioribus, parallelis, rugoso punctatis.

Long. $1\frac{3}{4}$ l. — lat. $\frac{1}{2}$, l.

Des Montagnes de Nura-Ellia.

Une seconde espèce du même genre, est le *Luperus pilicornis*, que j'ai décrit dans mes Etudes entomologiques 1858. p. 99.

Trichocerastes? sericeus Motsch., statura precedenti sed fere duplo latior. Elongatus, parallelus, subconvexus, testaceus, elytrorum basi marginisque infuscatis, oculis antennisque (basi excepto) nigris; thorace subtransverso; elytris thorace duplo latioribus, subtiliter coriaceo punctulatis, testaceo sericeo puberulis.

Long. 2 l. — lat. 1 l.

Des Montagnes de Nura-Ellia.

Trichocerastes? viridimarginellus Motsch., statura et color *Calom. circumfusi* sed pedibus pallidis. Elongatus, subconvexus, nitidus, pallide testaceus, antennis, oculis mesothoraceque nigris, capite thoraceque rufo-testaceis, hoc subcordato, nigro subviridi marginato; elytris thorace duplo latioribus, ruguloso punctatis, sutura marginisque viridinigris.

Long. $1\frac{1}{4}$ l. — lat. $\frac{1}{2}$, l.

Des Montagnes de Nura-Ellia.

Trichocerastes? cinctulus Motsch., statura et color *Teinodact. nigrocillae* sed paulo parallela et thorace medio transversim impresso. Elongato ovatus, convexus, nitidus, rufo-testaceus, corpore subtus antenisque infuscatis; elytris pallidioribus, ruguloso punctatis. marginis, sutura angustissime oculisque nigris.

Long. 1 l. — lat. $\frac{1}{2}$ l.

Des Montagnes de Nura-Ellia.

Calomicrus lividus Motsch., statura *Calom. circumfusi* sed pedibus pallidis. Elongatus, subparallelus, nitidus, pallido testaceus, oculis, scutello suturaque nigris, antennis mesothoraceque infuscatis; thorace subtransverso, nigro marginato, utrinque ad basin fossulato; elytris thorace fere duplo latioribus et quadruplo longioribus, rugoso punctatis.

Long. $1\frac{1}{4}$ l. — lat. $\frac{1}{2}$ l.

Des Montagnes de Nura-Ellia.

Diabrotica albescens Motsch., statura *Diabrot. vittatae* sed brevior et quadruplo minor. Elongato-ovata, convexa, fortiter punctata, nitida, pallide testacea, oculis, antennis longissimis antice, thoracis elytrorumque marginis suturaque nigris, corpore subtus infuscato; thorace transverso, medio impresso; elytris thorace dimidio latioribus, fortiter punctato striatis.

Long. $1\frac{1}{4}$ l. — lat. $\frac{3}{4}$ l.

Des Montagnes de Nura-Ellia.

Luperodes dorsalis Motsch., statura et color *Lup. quadripustulati* sed paulo minor et macula dorsali infuscata. Ovatus, convexus, nitidus, pallido testaceus,

capite thoraceque rufescentibus, scutello sutura maculaque dorsali trifida nigriscente fuscis, corpore subtus, antennis antice, elytrorum marginis, tibiis tarsisque infuscatis.

Long. $1\frac{1}{4}$ l. — lat. $\frac{1}{4}$ l.

Des Montagnes de Nura-Ellia.

Luperodes scriptus Motsch., statura precedenti sed aliter coloratus. Oblongo-ovatus, convexus, nitidus, pallido testaceus, capite postice, oculis, thoracis lateribus angustissime, elytrorum marginis, sutura, macula utrinque basali, altera postica triangulari fasciato formi apiceque nigris, antennis antice mesothoraceque infuscatis; thorace transverso, punctulato; elytris thorace latioribus, ovatis, ruguloso punctatis.

Long. $1\frac{1}{4}$ l. — lat. $\frac{3}{4}$ l.

Des Montagnes de Nura-Ellia.

Teinodactila suturanigra Motsch., statura et color *Teinodact. nigrocillae* sed plus duplo major. Elongato ovata, convexa, nitida, rufo-testacea; antennis (basi excepto), oculis, scutello, sutura lato, elytrorum marginis corporeaque subtus nigris, geniculis tibiisque posticis atris tarsis omnis infuscatis.

Long. $1\frac{1}{4}$ l. — lat. $\frac{3}{4}$ l.

Des Montagnes de Nura-Ellia.

Teinodactila suturella Motsch., statura et color precedenti sed minor, tibiis tarsisque testaceis. Elongato-ovata, convexa, nitida, subfuscotestacea, oculis suturaque angustissime nigris, antennarum apice, geniculis posticis corporeaque subtus infuscatis.

Long. 1 l. — lat. $\frac{1}{2}$ l.

Des Montagnes de Nura-Ellia.

Teinodactila atripes Motsch., statura et color precedentis sed sutura concolor. Elongato-ovata, convexa, nitida, rufo-testacea, antennis, oculis pedibusque nigris, tibiis antennarumque basi paulo infuscatis.

Long. 1 l. — lat. $\frac{1}{2}$ l.

Des Montagnes de Nura-Ellia.

Une espèce très-voisine un peu plus petite se trouve sur le continent indien. Elle se distingue principalement par la couleur blanchâtre de ses élytres et ses pattes testacées, excepté les cuisses postérieures, qui sont enfumées. Je l'ai nommée *Teinod. albescens*.

Teinodactila simplex Motsch., statura et color *Teinodact. luridae* sed paulo minor, thorax angustior. Elongato-ovata, convexa, rufo-testacea, antennis pedibusque pallidioribus, oculis nigris, thorace subquadrato.

Long. $\frac{3}{4}$ l. — lat. $\frac{1}{2}$ l.

Des Montagnes de Nura-Ellia.

Le continent indien présente aussi une espèce très-voisine *T. paria* Motsch. qui est un peu plus courte et présente la tête et la partie antérieure des antennes fortement enfumées. Une autre espèce, très-voisine de la *T. tabila*, se distingue par la couleur blanchâtre des élytres, qui sont comme polies; elle vient de Java, je l'ai nommée *T. polita*.

Teinodactila undulatovittata Motsch., statura *Teinodact. dorsali* sed oblongior. Elongato-subovata, subconvexa, nitida, testacea, antennarum apice subclavato, capite elytrorumque utrinque vitta undulata, nigris, thorace subquadrato, rufo-testaceo.

Long. 1 l. — lat. $\frac{1}{2}$ l.

Colombo.

Une espèce voisine plus petite du continent indien, la *T. nigripennis* Motsch., est très-remarquable par ses couleurs, ayant la tête et le corselet testacés et les élytres noires.

Teinodactila morio Motsch., statura et color *Teinod. anhusae* sed brevior et dimidio minor. Oblongo-ovata, convexa, nitida, punctata, antennarum basi pedibusque testaceis, posticis infuscatis; humeris paulo prominulis.

Long. $\frac{3}{4}$ l. — lat. $\frac{1}{4}$ l.

Des Montagnes de Nura-Ellia.

Psylliodes palleola Motsch., statura *Psyl. luteolae* sed paulo minor. Oblonga, subconvexa, nitida, punctata, pallido-testacea, supra subaeneo splendidula, oculis nigris; thorace punctato; elytris profundo punctato striatis, marginis subinfuscatis.

Long. $\frac{3}{4}$ l. — lat. $\frac{1}{2}$ l.

Des Montagnes de Nura-Ellia.

Ochrosis nigripennis Motsch., statura *Ochr. salicariae* sed minor et elytris nigris. Oblongo-ovata, convexa, nitida, brunnea, antennis antice, elytris corporeque subtus nigris; thorace transverso, glabro; elytris thorace latioribus et triplo longioribus, subovatis, punctato striatis.

Long. $\frac{1}{2}$ l. — lat. $\frac{1}{4}$ l.

Des Montagnes de Nura-Ellia.

Aphthona nigrita Motsch., statura et color *Aphth. euphorbiae* sed paulo brevior. Oblongo-ovata, convexa, nitida, fere glabra, nigra, antennarum basi pedibusque pallidis, femoribus posticis nigris.

Long. $\frac{3}{4}$ l. — lat. $\frac{1}{2}$ l.

Des Montagnes de Nura-Ellia.

Sur le continent indien il existe encore une espèce de la forme de la taille et des couleurs de *Aphth. coerulea*, mais qui présente une tête et un corselet d'un testacé roussâtre. Je l'ai nommée *Aphth. cyanipennis*.

Elytropachys Motsch. n. g.

Halticide avec les caractères des *Aphthma*, à corselet très-large, élytres presque carrées, lisses et transversalement imprimées sur leur partie antérieure.

Elytropachys latissima Motsch. (*Aphthona*) $1\frac{1}{2}$ l. +

Elytropachys viridescens Motsch., statura precedenti sed paulo minor. Breviter subovata, convexa, nitida, glabra, viridi aenea, antennis pedibusque flavo testaceis, illis apice, femoribus posticis corporeaque subtus nigris.

Long. $1\frac{1}{4}$ l. — lat. 1.

Des Montagnes de Nura-Ellia.

Elytropachys obscurata Motsch., statura precedenti sed paulo minor. Breviter subovata, convexa, nitida, glabra, nigra, antennarum basi, tibiis tarsisque rufo-testaceis, tibiis posticis infuscatis.

Long. $1\frac{1}{4}$ l. — lat. $\frac{3}{4}$ l.

Des Montagnes de Nura-Ellia.

Elytropachys dorsalis Motsch., statura *Elytr. latissimae* sed elytris rufo-marginatis. Breviter subovata, convexa, nitida, glabra, rufa, capite, thorace elytrisque dorso nigris; corpore subtus subfuscato.

Long. $1\frac{1}{4}$ l. — lat. 1 l.

Des Montagnes de Nura-Ellia.

Elytropachys dimidiata Motsch. (Aphthona) $1\frac{1}{2}$ l. +
Podagraria tropica Motsch., statura et color *Podagr.*
fulvipedi sed thorace breviore. Oblongo-ovata, convexa, nitida, rufo-testacea, antennis antice, oculis prominulis corporeque subtus nigris, geniculis, tibiis tarsisque posticis infuscatis; elytris subseriatim punctatis, ovatis, thorace dimidio latioribus, cum scutello nigro aeneis; thorace transverso quadrangulato, angulis anticis rectis, prominulis

Long. $1\frac{1}{2}$ l. — lat. 1 l.

Des Montagnes de Nura-Ellia.

Parlina Motsch. n. g.

Halticide à caractères de *Crepidodera*, mais élytres sans stries ponctuées, presque lisses. Forme assez largement ovalaire et acuminée à l'extrémité. Corselet très-transversal, avec une ligne imprimée parallèlement à la base et limitée de chaque côté par une impression foveiforme. Elytres plus larges que le corselet, ovales, angles huméraux un peu élevés.

Parlina trancisa Motsch., statura *Colaphi Sophiae* sed paulo minor. Ovata, convexa, nitida, fere glabra, rufo-testacea, elytris nigro subaeneis, dorso paulo flavescentibus, apice flavo testaceis, antennis antice oculisque nigris; thorace transverso, impunctato, basi utrinque sinuato; elytris thorace dimidio latioribus et triplo longioribus, ovatis, subtiliter sparsim punctulato rugulosis.

Long. $1\frac{1}{2}$ l. — lat. 1 l.

Des Montagnes de Nura-Ellia.

Sphaeroderma viridipennis Motsch., statura *Sph. testacea* sed paulo latior. Rufo-testacea, elytris laete viri-

dicoeruleis, antennis antice oculisque nigris; thorace transverso, antice utrinque impresso; elytris thorace latioribus, subtiliter subseriatim punctulatis.

Long. 1 $\frac{1}{2}$, l. — lat. 1 l.

Des Montagnes de Nura-Ellia.

La *Sphaeroderma indica* F. est un peu plus grande que la précédente avec les élytres de couleur plus noisâtre et les impressions sur le bord antérieur du corselet moins distinctes. Elle vient du continent indien. Dans l'île de Java il se trouve une espèce plus petite, *Sph. javana* Motsch., qui a les élytres d'un verdâtre plus bronzé et plus fortement ponctué; le dessous du corps est brun. Une quatrième espèce, encore plus petite, des mêmes couleurs, habite le continent indien oriental, et chez elle les impressions sur le bord antérieur du corselet sont presque entièrement effacées; les élytres sont plus fortement ponctuées. Elle porte le nom de *Sphaer. orbiculata*.

Sphaeroderma gracilenta Motsch, statura et color *Sphaer. testaceae* sed brevior et duplo minor. Elytris fere glabris.

Long. 1 l. — lat. 1 $\frac{1}{2}$ l.

Des Montagnes de Nura-Ellia.

Une espèce très-voisine *Sphaer. brunnea* Motsch, habite l'île de Java, elle est un peu plus arquée sur les côtés latéraux des élytres. Une seconde, des mêmes localités, de la même forme et de la même taille, présente une couleur d'un noir brunâtre uniforme; je l'ai nommée *Sph. fusca*. Une troisième espèce du continent indien a la forme et les couleurs de la *gracilenta*, mais sa taille est moitié plus petite. Elle porte le nom de *Sph. fulva*.

Sphaeroderma rufopicta Motsch., statura *Sph. testacei* sed triplo minor. Ovata, convexa, nitida, nigra, capite, antennarum basi, thorace, elytrorum vittis duabus arcuatis ad suturam medio approximatis pedibusque rufis.

Long. 1 l. — lat. $\frac{3}{4}$ l.

Des Montagnes de Nura-Ellia.

Hypnophila flaviguttata Motsch., statura *Hypn. carici* sed paulo obtusior. Ovata, convexa, nitida, nigra, elytris flavo testaceis, fronte thoraceque antice subpiceis; elytris distincte punctato striatis.

Long. 1 l. — lat. $\frac{1}{2}$ l.

Mniophila ruficollis Motsch., statura *Mnioph. muscorum* sed major et paulo oblongior. Oblongo-ovata, valde convexa, nitida, capite, antennarum basi, thorace, scutello pedibusque rufo-testaceis; elytris punctatis, viridis, antennis antice corporeaque subtus nigris.

Long. 1 l. — lat. $\frac{1}{2}$ l.

Des Montagnes de Nura-Ellia.

Anisodera nigricauda Motsch., statura *Anis. zinzibari* sed elytris postice nigris. Elongata, subdepressa, parallela, supra opaca; nigra, thorace elytrisque rubris, his apice macula nigra, femoribus anticis medio rufis; thorace subquadrato antice biseolato, postice transversim impresso; elytris thorace latioribus, grosso per pariam punctato striatis, utrinque carinis tribus elevatis.

Long. 2 l. — lat. $\frac{3}{4}$ l.

Des Montagnes de Nura-Ellia.

Platyccephales.

Chilocorus sanguinolentus Motsch.; statura *Chiloc. bipustulati* sed quadruplo minor. Orbiculatus, convexus,

marginatus, *nitidus*, *antennis pedibusque rufis*, *elytris rubris*, *his marginis, maculis tribus in medio (1 $\frac{1}{2}$ utrinque) transversim dispositis nigris.*

Des Montagnes de Nura-Ellia.

Une espèce voisine un peu plus grande, *Ciloc. sanguinosus* Motsch., habite le continent indien; elle présente la tête et le corselet d'un brun roussâtre et sur les élytres la tache suturale est beaucoup plus allongée, et à la base il y a une troisième tache noire au dessus de la seconde, qui se trouve au milieu un peu en arrière.

Chilocorus rufoplagiatus Motsch., statura *Chiloc. bipustulati* sed octoduplo minor. *Orbicularis*, valde convexus, *nitidus*, *niger*, *elytris rufescente marginatis*, *utrinque vitta lata basali punctoque postice pedibusque rufis*.

Long. 1 $\frac{1}{2}$ l. — lat. $\frac{1}{2}$ l.

Des Montagnes de Nura-Ellia.

Une espèce un peu plus large *Chiloc. transversus* habite le continent indien, elle se distingue de la précédente par une tête rousse et la tache rouge à la base des élytres transversale, n'atteignant pas la posticale.

Oeneis flavescens Motsch., statura *Agathidii*. Rotundata, globosa, nitida, glabra, testacea; elytris paulo dilutioribus.

Long. $\frac{1}{2}$ l. — lat. $\frac{1}{2}$ l.

Des Montagnes de Nura-Ellia.

Oeneis nigritula Motsch., statura precedenti sed nigra. Orbiculata, convexa, subglobosa, nitida, glabra, nigra.

Long. $\frac{1}{2}$ l. — lat. $\frac{1}{2}$ l.

Des Montagnes de Nura-Ellia.

Oeneis lateralis Motsch., statura precedenti sed magis convexa. Orbiculata, globosa, nitida, glabra, nigra, thoracis lateribus pedibusque rufescens.

Long. $\frac{1}{4}$ l. — lat. $\frac{1}{2}$ l.

Des Montagnes de Nura-Ellia.

Yauravia albidula Motsch., statura rotundata Chilocori sed puberula. Orbiculata, subglobosa, nitida, punctulata, albescente puberula, rufo-testacea, pedibus dilutioribus, corpore subtus paulo infuscato.

Long. $1\frac{1}{4}$ l. — lat. $1\frac{1}{4}$ l.

Des Montagnes de Nura-Ellia.

M. Mulsant m'a déterminé *Pentilia? tescivestis* une espèce intermédiaire du continent indien, mais elle n'a pas été décrite. Elle a les couleurs de la *Y. pallidula*, présentant une forme plus courte. La première est plus petite que la *Y. albidula*.

Yauravia limbata Motsch., statura Hyperaspi laterali sed minor. Rotundata, convexa, nitida, vix puberula, pallido flava, oculis, elytrorum dorso corporeque subtus nigris.

Long. 1 l. — lat. $\frac{3}{4}$ l.

Des Montagnes de Nura-Ellia.

Aspidimerus nigrovittatus Motsch., statura precedenti sed minor. Subovatus, convexus, nitidus, sparsim puberulus, pallide flavus, elytris utrinque vitta lata nigra, apice non attinguenda.

Long. 1 l. — lat. $\frac{3}{4}$ l.

Des Montagnes de Nura-Ellia.

Nephus quadrillum Motsch. (*Scymnus*) $\frac{3}{4}$ l. +

Scymnus corporosus Motsch., color et statura *Scym. abieti* sed brevior. Subovato-rotundatus, convexus, nitidus, brunnescente rufus, testaceo pilosus; elytris fere glabris.

Long. 4 l. — lat. $\frac{3}{4}$ l.

Des Montagnes de Nura-Ellia.

Scymnus brunnescens Motsch., statura et color precedenti sed minor. Subovatus, convexus, subnitidus, rufo-testaceus, oculis suturaque angustissime nigriscentibus; elytris punctulatis, testaceo-pilosus.

Long. 4 l. — lat. $\frac{1}{2}$ l.

Des Montagnes de Nura-Ellia.

Scymnus uniformis Motsch., statura et color precedenti sed sutura concolor. Subovatus, convexus, subnitidus, rufo-testaceus, pilosus.

Long. $\frac{3}{4}$ l. — lat. $\frac{1}{2}$ l.

Des Montagnes de Nura-Ellia.

Scymnus nitidulus Motsch., statura et color precedenti sed paulo minor et nitidior. Subovatus, convexus, valde nitidus, rufo-testaceus; elytris punctatis.

Long. $\frac{3}{4}$ l. — lat. $\frac{1}{2}$ l.

Des Montagnes de Nura-Ellia.

Scymnus stabilis Motsch., statura et color *Pull. discoides* sed paulo major. Ovatus, postice paulo attenuatus, convexus, subnitidus, pilosus, niger; elytris pedibusque rufis, sutura angustato nigra.

Long. 4 l. — lat. $\frac{1}{2}$ l.

Des Montagnes de Nura-Ellia.

Scymnus gracilis Motsch., statura et color *Pull. minimi* sed minor. Ovatus, subconvexus, nitidus, pilosus, niger, pedibus rufo-testaceis.

Long. $\frac{1}{2}$ l. — lat. $\frac{1}{4}$ l.

Des Montagnes de Nura-Ellia.

Pullus rotundulus Motsch., color et statura precedenti sed paulo latior. Subovato-rotundatus, convexus nitidus, pilosus, niger, pedibus rufo-testaceis; elytris antice arcuatis, postice subattenuatis.

Long. $\frac{1}{2}$ l. — lat. $\frac{1}{4}$ l.

Des Montagnes de Nura-Ellia.

Sacium convexiusculum Motsch. $\frac{1}{2}$ l. +

Sacium picipenne Motsch., statura et color *Sac. pusilli* sed thorace testaceo. Elongato-ellipticum, depresso, nitidum, nigro-piceum, thorace pedibusque testaceis.

Long. $\frac{1}{2}$ l. — lat. $\frac{1}{4}$ l.

Des Montagnes de Nura-Ellia.

Sacium luridum Motsch., statura *Sac. pusilli* sed paulo minor. Elongato-ellipticum, parallelum, nitidum, lurido testaceum, elytris antice paulo infuscatis, testaceo-puberulis.

Long. $\frac{1}{2}$ l. — lat. $\frac{5}{8}$ l.

Des Montagnes de Nura-Ellia.

Sericoderus infuscatus Motsch., statura *Seric. laterali* sed duplo major. Subovatus, subconvexus, cinereo-sericeus, rufo-testaceus, elytrorum marginis lato infuscatis.

Long. $\frac{1}{2}$ l. — lat. $\frac{1}{4}$ l.

Des Montagnes de Nura-Ellia.

Moronillus orientalis Motsch., statura et color *Moron.* *ruficollis* sed duplo major et thorace piceo. Subrotundatus, convexus, nitidus, niger, thorace piceo, antice testaceo marginato.

Long. $\frac{1}{4}$ l. — lat. $\frac{1}{4}$ l.

Des Montagnes de Nura-Ellia.

Phalacrus indus Motsch. $1\frac{1}{2}$ l. +

Phalacrus antennatus Motsch., statura *Phal. carici* sed paulo latior. Ovatus, convexus, nitidus, niger, thoracis lateribus pedibusque brunnescentibus, antennis nigris, articulo ultimo acuto basisque pallidis; elytris fere glabris, stria subsuturali distincto impresso.

Long. 1 l. — lat. $\frac{3}{4}$ l.

Des Montagnes de Nura-Ellia.

Phalacrus rufipes Motsch., statura *Phal. carici* sed antennis rufis. Oblongo-ovatus, convexus, subaeneo nitidus, niger, antennis pedibusque rufis; stria subsuturali distincta.

Long. 1 l. — lat. $\frac{1}{2}$ l.

Des Montagnes de Nura-Ellia.

Phalacrus oblongulus Motsch., statura *Phal. carici* sed minor. Oblongus, postice subattenuatus, convexus, nitidus, niger, antennis pedibusque rufis; stria subsuturali vix distincta.

Long. $\frac{3}{4}$ l. — lat. $\frac{1}{2}$ l.

Des Montagnes de Nura-Ellia.

Phalacrus affinis Motsch., statura precedenti sed antennis piceis. Oblongus, convexus, nitidus, niger, antennis pedibusque piceus.

Long. $\frac{3}{4}$ l. — lat. $\frac{1}{2}$ l.

Des Montagnes de Nura-Ellia.

N° 2. 1866.

28

Phalacrus rugipennis Motsch., statura *Phal. carici* sed duplo minor. Oblongus, convexus, nitidus, niger, antennis pedibusque rufescentibus; elytris ruguloso-punctulatis.

Long. $\frac{1}{2}$ l. — lat. $\frac{1}{4}$ l.

Des Montagnes de Nura-Ellia.

Olibrus rufopiceus Motsch. $\frac{3}{4}$ l. +

Olibrus minusculus Motsch., statura *Ol. pygmaei* sed minor. Oblongus, postice attenuatus, convexus, nitidus, rufo-testaceus.

Long. $\frac{1}{2}$ l. — lat. $\frac{1}{4}$ l.

Des Montagnes de Nura-Ellia.

Olibrus flavotestaceus Motsch., statura *Ol. picei* sed paulo angustior. Oblongus, postice attenuatus, convexus, nitidus, fulvus, elytris paulo dilutioribus.

Long. $\frac{3}{4}$ l. — lat. $\frac{1}{2}$ l.

Des Montagnes de Nura-Ellia.

Augasma magna Motsch., statura *Ol. picei* sed quadruplo major. Oblonga, postice subattenuata, convexa, nitida, fulva; elytris punctato striatis.

Long. $1\frac{1}{4}$ l. — lat. $\frac{3}{4}$ l.

Des Montagnes de Nura-Ellia.

Cladoxena Motsch., n. g.

Tétramère de forme intermédiaire entre *Lissomus* et *Languria*. Corselet convexe antérieurement, un peu rétréci en arrière, angles postérieurs droits. Élytres allongées, rétrécies à la base et atténues vers l'extrémité, striées par de points imprimés. Écusson quadrangulaire

et accuminé postérieurement. Antennes surpassant en longueur la base du corselet, un peu monoliformes, à massue de trois articles. Dernier article des palpes acumинé. Tarses assez larges, le troisième bilobé.

Ce genre ressemble beaucoup aux *Cladophila* de l'Amérique, mais je ne sais pas s'ils sont identiques.

Cladoxena rufipes Motsch., statura *Aphannstici emarginati* sed duplo major. Elongata, attenuata, thoracis elytrorumque basi substrangulato angustatis, convexa, nitida, cupreo aenea, ore, palpis, antennarum basi pedibusque rufo-testaceis, corpore subtus brunneo; elytris fortiter punctato striatis, postice valde attenuatis.

Long. $\frac{3}{4}$ l. — 2 l. — lat. $\frac{1}{2}$ l. — $\frac{3}{4}$ l.

Des Montagnes de Nura-Ellia.

Cladoxena picipes Motsch., statura et color precedenti sed minor et pedibus piceis. Elongata, attenuata, thoracis elytrorumque basi substrangulato angustatis, convexa, nitida, cupreo aenea, corpore subtus pedibusque nigro piceis, antennarum basi rufescens; elytris fere glabris, valde attenuatis.

Long. 1 l. — $1\frac{1}{2}$ l. — lat. $\frac{1}{2}$ l. — $\frac{3}{4}$ l.

Des Montagnes de Nura-Ellia.

Cladoxena maculata Motsch., statura precedenti sed angustior. Elongata, sublinearis, attenuata, thoracis elytrorumque basi subangustatis, convexa, nitida, cupreo-aenea, elytrorum maculis utrinque in medio tribus alteraque oblonga postice pedibusque rufo-testaceis; elytris distincte punctato striatis.

Long. $1\frac{1}{2}$ l. — lat. $\frac{1}{2}$ l.

Des Montagnes de Nura-Ellia.

Rhynchocéphales.

- Cerobates parallelus* Motsch. $1\frac{3}{4}$ — $2\frac{1}{4}$ l. +
Nardodes collyrioides Motsch. 3 l. +
Euops ceylonicus Motsch. $1\frac{1}{4}$ l. +
Rhynchites fasciatus Motsch. $1\frac{1}{4}$ l. +
Conopium gracile (Apion) Gerst. 1. l. +
Rhynapion suratum Motsch. 1 l. +
 — *convexusculum* Motsch. 1 l. +
 — *breviusculum* (¹) Motsch. 1 l. +

Phytonomus ochraceus Motsch., statura *Phyton. nigro-rostri* sed brevior et minor. Oblongo - ovatus, convexus, ochraceus, dense testaceo pubescens, capite rostroque nigro; elytris dilute lineatis.

Long. 4 l. — lat. $\frac{1}{2}$, l.

Des Montagnes de Nura-Ellia.

Peritelus imbricatis Motsch., statura *Perit. necessarü* sed minor. Elongato-subovatus, convexus, niger, dense surato pubescens, fronte in medio linea longitudinale impresso; thorace subtrivittato; elytris oblongis, profunde punctato striatis, interstitiis pilosis, cinereo imbricato maculatis, sutura lateribusque dilutioribus.

Long. $4\frac{1}{2}$, l. — lat. 4 l.

Colombo.

Balaninus lugubris Motsch., statura *Balan. villosi* sed duplo minor. Subtriangularis, convexus, nigro-piceus, subtus dense subalbido pubescens, elytris fasciis angustis albescentibus interruptis duabus, macula quadrata scutel-

(¹) Les espèces mentionnées de Rhyncocéphales se trouvent décrites dans un manuscrit envoyé à la Société Impériale des Naturalistes de Moscou.

ari nigra, apice albida; rostro thoracis basi vix superante, subarcuato, antice rufo-testaceo.

Long. corp. $4\frac{1}{4}$ l. — lat. $\frac{3}{4}$ l.

Long. r. $\frac{3}{4}$ l.

Des Montagnes de Nura-Ellia.

Balaninus tessellatus Motsch., statura *Balan. cruci* sed paulo brevior. Triangularis, subconvexus, nigropiceus, supra ochraceo tessellatus, subtus dense subalbido pubescens, elytrorum basi suturaque antice testaceo-maculatis; rostro, thoracis basi non superante, antice subulato, cum pedibus rufo.

Long. 4 l. — lat. $1\frac{1}{2}$ l.

Long. r. $\frac{1}{2}$ l.

Des Montagnes de Nura-Ellia.

Balaninus lineolatus Motsch., statura precedenti sed elytris lineolatis. Triangularis, subconvexus, rufo-testaceus, supra ochraceo, subtus subalbido dense pubescens, thoracis vitta media lateribusque albescentibus, elytrorum sutura lineisque tribus utrinque albidis; rostro, thoracis basi paulo superante, rufo, apice piceo.

Long. 4 l. — lat. $1\frac{1}{2}$ l.

Long. r. $\frac{1}{2}$ l.

Des Montagnes de Nura-Ellia.

Balaninus rufimanus Motsch., statura et color *Balan. pyrrhoceri* sed minor. Elongato-ovatus, convexus, nigropiceus, dense cinereo pubescens, antennarum basi rostro, tibiis tarsisque rufo-testaceis, femoribus anticis, subincrastatis, longioribus, medio infuscatis; thorace postice in medio foveolato.

Long. $\frac{3}{4}$ l. — lat. $\frac{1}{4}$ l.

Long. r. $\frac{1}{4}$ l.

Des Montagnes de Nura-Ellia.

L'Inde abrite encore plusieurs autres espèces, dont je possède les suivantes: *Bal. X album* Motsch., forme et couleurs du *Bal. crux*, mais un peu plus petit, les bandes blanches de la base du corselet et des élytres formant la figure d'un X, rostre presque plus long que le corps, courbé et roussâtre vers l'extrémité. *Bal. basithorax* Motsch., couleurs et dessins du précédent, de forme un peu plus large, et presque quatre fois plus grand, rostre plus court, noir, base du corselet blanche vers les angles postérieurs comme chez le précédent, suture concolore. De Java. *Bal. bifasciatus* Motsch de la forme, de la taille et avec les couleurs du précédent, mais base du corselet noire, bandes blanches des élytres plus droits, rostre de la longueur du corps. Birma. *Bal. bicruciatus* Motsch., taille, forme et couleurs du précédent, mais plus nébuleux sur les côtés et le dessous; les bandes blanchâtres sur les élytres sont réunies par la suture de la même couleur. Australie boréale.

Dorytomus bivittatus Motsch., statura *Erirh. majali* sed paulo minor. Elongato-subovatus, postice paulo dilatatus, convexus, opacus, pubescens, fusco-ferrugineus, corpore subtus, thoracis lateribus elytrorumque vitta subobliqua utrinque subalbidis; rostro paulo depresso, ruguloso.

Long. $1\frac{1}{4}$ l. — lat. $\frac{1}{2}$ l.

Des Montagnes de Nura-Ellia.

Orchestes meridianus Motsch., statura *Orch. fagi* sed minor. Elongato-ovatus, convexus, pubescens, opacus, nigro-cinereus, thoracis medio maculaque magna scutellari albescente cinereis; thoracis angulis posticis subrectis.

Long. 1 l. — lat. $\frac{1}{2}$ l.

Des Montagnes de Nura-Ellia.

Orchestes flavidus Motsch., statura *Orch. rufi* sed minor. Oblongo-ovatus, subconvexus, subnitidus, rufo-testaceus, elytris pallidioribus, postice utrinque macula laterali fusca, oculis nigris.

Long. $\frac{3}{4}$ l. — lat. $\frac{1}{2}$ l.

Des Montagnes de Nura-Ellia.

Orchestes? rufipes Motsch., statura *Orch. fagi* sed duplo minor et angustior. Elongato-subovatus, subconvexus, subnitidus, niger, tenue cinereo puberulus, pedibus rufis, geniculis tibiisque infuscatis, femoribus anticis paulo incrassatis.

Long. $\frac{3}{4}$ l. — lat. $\frac{1}{2}$ l.

Des Montagnes de Nura-Ellia.

Acalyptus sabulicolor Motsch., statura *Sib. potentillae* sed minor, thorax angustior. Ovatus, convexus, subnitidus, flavo ferrugineus, testaceo pubescens, capite rostroque piceo, elytris vix dilutiore sublineatis, humeris rectis.

Long. 1 l. — lat. $\frac{1}{2}$ l.

Des Montagnes de Nura-Ellia.

Amorphoidea testacea Motsch. $1\frac{1}{4}$ l. *

Dans la collection de Schönerr ce genre se trouve représenté par une espèce sous le nom de *Lyterius?* *rufus*, mais qui n'est pas décrit dans les ouvrages de ce savant.

Amorphoidea rufotestacea Motsch., statura *Sib. primi* sed paulo major. Oblongo-ovata, subconvexa, punctulata, subnitida, rufo-testacea, antennis pedibusque pallidioribus, oculis nigris.

Long. $\frac{3}{4}$ l. — lat. $\frac{1}{2}$ l.

Des Montagnes de Nura-Ellia.

Lytodactylus testaceus Motsch., statura *Lytodact.* ve-
lati sed quadruplo minor. Triangularis, convexus,
subnitidus, fusco-testaceus, pallido pubescens, antennis,
rostro pedibusque rufo-testaceis, antennarum clava ocu-
lisque nigris; thorace conico, medio transversim impres-
so; elytris profunde striatis, interstitiis paulo costatis, hu-
meris rectis.

Long. $\frac{1}{2}$ l. — lat. $\frac{1}{4}$ l.

Des Montagnes de Nura-Ellia.

Anchonus velatus Motsch. (*Orthosinus*).

Une espèce très - voisine se trouve dans la collection
de Schönherr sous le nom d'*Anchonus indus*.

Anchonus suturalis Motsch., statura *Orch. fagi* sed
paulo latior. Elongato subovatus, subconvexus, nitidus,
punctulatus, sparsim puberulus, rufo - testaceus, thoracis
marginé antice, elytrorum suture lateribusque nigro pi-
ceis; apice diluto; elytris profundo punctato striatis.

Long. 1 l. — lat. $\frac{1}{2}$ l.

Des Montagnes de Nura-Ellia.

Phaenomerus nebulosus Motsch. (*Podalgorerus*) $1\frac{1}{2}$ l. +

Le *Phaenomerus Sundevallii* Sch. est plus petit que le
nebulosus et ses cuisses sont moins renflées.

Baridius septemguttatus Motsch., statura *Barid. arte-*
misiae sed albo guttatus. Elongato - ovatus, convexus,
subnitidus, profundo punctatus, niger, thoracis angulis
posticis, elytrorum guttis quatuor scutelloque albidis; ely-
tris striatis, interstitiis planis, rugoso punctatis.

Long. $1\frac{1}{4}$ l. — lat. $\frac{3}{4}$ l.

Des Montagnes de Nura-Ellia.

Des espèces indiennes voisines par leur coloration du
Bar. septemguttatus sont: *Bar. quadriwittulus* Motsch. de

Java est un peu plus petit et les quatres taches blanches sur les élytres sont allongées ou vitiformes. *Bar. novemmaculatus* Motsch. le double plus grand que le *septemguttatus* avec les angles antérieurs du corselet blancs.

Baridius interruptofasciatus Motsch., statura *Bar. pincini* sed depressior. Oblongo-ovatus, dorso impressus, opacus, crebre punctatus, puberulus, thorace sparsim subferrugineo - tessellatus; elytris striatis, interrupto subalbido bifasciatis et ad suturam albescente maculatis, interstitiis planis, rugoso-punctatis; corpore subtus pedibusque subcinereo puberulis.

Long. $1\frac{1}{2}$ l. — lat. $\frac{3}{4}$ l.

Des Montagnes de Nura-Ellia.

Les espèces du continent indien voisines par la coloration du *l'interruptofasciatus* sont: *Bar. ochraceo-maculatus* Motsch. un peu plus grand, plus luisant à ponctuation moins serrée, côtés latéraux du corselet largement bordés de testacé. *Bar. alboscutellatus* Motsch. un peu plus grand, plus ovalaire, plus convexe. *Bar. subsignatus* Motsch. encore un peu plus grand, plus allongé, plus luisant, avec les taches blanchâtres très-petites. *Bar. lineolatofasciatus* Motsch. presque le double plus grand, luisant, les bandes interrompues des élytres sont composées de petites lignes longitudinales blanchâtres.

Cryptorhynchus fascicularis Motsch., statura *Acentri histrioni* sed brevior et duplo minor. Ovatus, convexus, opacus, pubescens, fusco-testaceus, subnigro variegatus, setoso fascicularis, elytrorum medio fascia obliqua subalbida; capite aequale; thorace subconico, fasciculis

duabus antice, altera postice elevatis nigris; elytris punctato striatis, interstitiis planis.

Long. $1\frac{1}{4}$ l. — lat. $\frac{3}{4}$ l.

Des Montagnes de Nura-Ellia.

Tylodes semicolles Motsch., statura *Acalli hypocrita* sed fere duplo minor. Ovatus, convexus, opacus, nigro-piceus, cinerascente variegatus, corpore subtus pedibusque cinereo-puberulus; thorace antice albido, medio nigro bimaculato, lateribus valde arcuatis; subcrenulatis; elytris thorace paulo latioribus, antice fascia subalbida vix distincta, striis profundo impressis, interstitiis paulo-convexis.

Long. $1\frac{1}{2}$ l. — lat. $\frac{3}{4}$ l.

Des Montagnes de Nura-Ellia.

Acalles histrix Motsch., statura et color *Ac. ptinioides* sed paulo oblongior. Elongato-ovatus, subattenuatus, convexus, nigro-piceus, fusco-puberulus et setosus; elytris medio fascia albescente vix distincta.

Long. 1 l. — lat. $\frac{1}{2}$ l.

Des Montagnes de Nura-Ellia.

Conotrachelus? pistrinarius Motsch., statura et color *Conotr. verticali* sed duplo minor. Oblongo-ovatus, antice posticeque subattenuatus, tuberculato-punctatus, setosus, pubescens, niger; elytris cinereo ochraceo-que variegatis, punctato-striatis, interstitiis planis.

Long. $1\frac{1}{2}$ l. — lat. $\frac{3}{4}$ l. -

Des Montagnes de Nura-Ellia.

Elattocerus bifasciatus Motsch., statura et color *Orchesti rusci* sed paulo major et femoribus anticis

incrassatis. Ovatus, convexus, opacus, cinereo-pubescent, thoracis vittis duabus mediisque elytrorum fasciis duabus nigris, sutura albescente; tarsis rufo-piceis.

Long. $1\frac{1}{4}$ l. — lat. $\frac{1}{2}$ l.

Des Montagnes de Nura-Ellia.

Une espèce du continent indien, voisine par la forme et les couleurs, est un peu plus petite et présente des bandes plus obliques sur les élytres; elle porte le nom de *Elattoc. obliquefasciatu*s. Une autre, un peu plus oblongue et dépourvue de bandes est simplement nébuleuse, cuisses antérieures plus fortement dilatées, je l'ai nommée *Elattoc. nebulosu*s.

Elattocerus affinis Motsch., statura et color precedentis sed minor et angustior. Oblongo-ovatus, convexus, subnitidus, cinereo-pubescent, thoracis vittis duabus mediisque elytrorum fasciis duabus nigris; thorace crebre punctato; elytris striatis, interstitiis planis, ruguloso-punctatis; tarsis rufo-testaceis, femoribus anticis incrassatis, dentatis.

Long. 1 l. — lat. $\frac{1}{2}$ l.

Des Montagnes de Nura-Ellia.

Elattocerus similis Motsch., statura et color precedentis sed minor. Oblongo-ovatus, convexus, subopacus, cinereo-pubescent, thoracis vittis duabus mediisque elytrorum fasciis duabus nigris; thorace punctato; elytris striatis, interstitiis planis, rugulosis; tibiis tarsisque rufo-piceis, femoribus anticis incrassatis.

Long. $\frac{3}{4}$ l. — lat. $\frac{1}{4}$ l.

Des Montagnes de Nura-Ellia.

Du continent indien je possède une espèce très-voisine par sa taille et ses couleurs, mais un peu plus large, je l'ai nommée *El. tessellatus*.

Elattocerus angustatus Motsch., statura precedenti sed angustior. Elongato-subovatus, convexus, nitidus, puberulus, nigro-piceus, elytris rufo-piceis, subcinereo-nebulosis, pedibus fusco-testaceis, femoribus anticis in-crassatis, postice nigriscentibus, thoracis vittis duabus mediisque elytrorum macula scutellari nigris.

Long. 4 l. — lat. $\frac{1}{2}$ l.

Des Montagnes de Nura-Ellia.

Une espèce du continent indien voisine par sa forme, sa taille et ses couleurs est un peu plus courte, d'un ocre un peu brunâtre, avec une grande tache postérieure de chaque côté du corselet, la base des élytres, une bande transversale au milieu et l'extrémité plus ou moins blanchâtre, une petite ligne d'un blanc éclatant occupe la suture derrière l'écusson. Elle porte le nom d'*El. albopictus*.

Copturus trimaculatus Motsch., statura *Tichii tomentosi* sed angustior. Elongato-subovatus, antice postice que attenuatus, convexus, dorso subdeplanatus, vix nitidus, punctatus, niger, elytris dorso cinereis, corpore subtus, thoracis maculis duabus ad basin alteraque post scutellari albidis; elytris punctato striatis, interstitiis sub-convexis, seriatim albido setulosis, macula oblonga suturali lateribusque nigris.

Long. 4 l. — lat. $\frac{1}{2}$ l.

Des Montagnes de Nura-Ellia.

Lobotrachelus angulatus Motsch. (*Coelosternus*) 4 l. +

D'après la collection de Schönherr il paraît que tous les *Coelosternus* que j'ai décrits dans mes Et. entom. 1848. p. 73 appartiennent au genre *Lobotrachelus* Sch.

Lobotrachelus olivaceus Motsch., statura *Tichii tomentosi* sed latior. Antice posticeque triangulari attenuatus, convexus, pubescens, griseo - olivaceo sericeus, thoracis medio, sutura, corpore subtus pedibusque albido tomentosis, oculis, thoracis vittis duabus fasciaque arcuata elytrorum nigriscentibus, rostro rufo.

Long. 4 l. — lat. $\frac{1}{2}$ l.

Des Montagnes de Nura-Ellia.

Lobotrachelus bifasciatus Motsch., statura precedenti sed minor. Antice posticeque triangulari attenuatus, convexus, nitidus, elytrorum fasciis duabus antice, corpore subtus pedibusque albescente - cinereis, thorace ad basin albido trimaculato.

Long. 4 l. — lat. $\frac{1}{2}$ l.

Des Montagnes de Nura-Ellia.

Lobotrachelus cinerascens Motsch., statura precedenti sed minor. Antice posticeque triangulari attenuatus, convexus, cinereo - subolivaceo sericeus, corpore subtus pedibusque albescentibus, scutello albido, thoracis angulis posticis suturaque elytrorum albescente puberulis.

Long. $\frac{3}{4}$ l. — lat. $\frac{1}{4}$ l.

Des Montagnes de Nura-Ellia.

Lobotrachelus fulvus Motsch., statura precedenti sed angustior. Oblongus, antice posticeque attenuatus, nitidus, subalbido puberulus, thoracis basi in medio elytrorumque sutura testaceo-pubescentis.

Long. 4 l. — lat. $\frac{1}{2}$ l.

Des Montagnes de Nura-Ellia.

Lobotrachetus cruciatus Motsch., statura *Lob. bifasciati* sed brevior. Antice posticeque triangulari attenuatus, convexus, subnitidus, elytris subolivaceo sericeis, sutura basi fasciaque media albescens.

Long. $\frac{3}{4}$ l. — lat. $\frac{1}{2}$ l.

Des Montagnes de Nura-Ellia.

Lobotrachelus obliquevittatus Motsch., statura *Lob. fulvi* sed paulo major. Oblongus, antice posticeque attenuatus, convexus, subnitidus, rufo-piceus, cinereo-puberulus; elytris distincto striatis, utrinque antice vitta obliqua lateribusque subalbido pubescens, basi macula magna triangulari suturaque nigriscentibus, antennis, geniculis, tibiis tarsisque rufo-testaceis.

Long. 4 l. — lat. $\frac{1}{2}$ l.

Des Montagnes de Nura-Ellia.

Lobotrachelus piceofasciatus Motsch., statura *Lob. bifasciati* sed minor. Antice posticeque triangulari attenuatus, convexus, nitidus, subpiceo-rufus, griseo-puberulus, thorace elytrorumque fascia antica ad suturam interrupto denudatis.

Long. $\frac{3}{4}$ l. — lat. $\frac{1}{2}$ l.

Des Montagnes de Nura-Ellia.

Lobotrachelus albotessellatus M. (*Coelosternus*) $\frac{1}{2}$ l. +

Lobotrachelus? setigerus Motsch., statura *Lob. fulvi* sed magis arcuata. Oblongo ovatus, antice posticeque attenuatus, nitidus, sparsim puberulus et setosus, fusco-piceus, supra sordido pubescens.

Long. 4 l. — lat. $\frac{1}{2}$ l.

Des Montagnes de Nura-Ellia.

Cette espèce ressemble beaucoup par sa forme extérieure à un *Orthocistes*, mais son rostre se contracte fortement vers la poitrine.

Mecystoderes undulatus Motsch. (*Coeliosomus*) $\frac{1}{2}$ l. +
— *pictus* Motsch. (*Coeliosomus*) $\frac{1}{2}$ l. +

Mecystoderes grisescens Motsch., statura precedenti sed paulo minor. Breviter ovatus, convexus, subopacus, nigro-piceus, elytris rufescentibus, thorace medio subcarinato, elytrorum basi, corpore subtus pedibusque cinereo puberulis, macula suturali ante medium, subalbida; elytris profunde punctato sulcatis.

Long. $\frac{3}{4}$ l. — lat. $\frac{1}{2}$ l.

Des Montagnes de Nura-Ellia.

Mecystoderes euglyptus Dalm. $\frac{3}{4}$ l. +

Mecystoderes umbrinus Motsch., statura precedenti sed paulo angustior. Subovato triangularis, convexus, subnitidus, nigro-piceus, pedibus rufo-testaceis corporeque subtus cinereo puberulis, thoracis lateribus, elytrorum basi maculaque suturali subtestaceis; elytris lato punctato sulcatis, intersticiis angustis, subcarinatis.

Long. $1 \frac{1}{4}$ l. — lat. $\frac{3}{4}$ l.

Des Montagnes de Nura-Ellia.

Mecystoderes stramineus Motsch., statura *Coelidi dyymi* sed fere minor. Subovato triangularis, convexus, opacus, dense subolivaceo stramineo pubescens, corpore subtus, thoracis lateribus et linea media, elytrorum sutura intersticiisque alternis plus minusve subalbidis, rostro rufo.

Long. $1 \frac{1}{4}$ l. — lat. $\frac{1}{2}$ l.

Des Montagnes de Nura-Ellia.

Les Coeliosomus que j'ai décrits dans mes Et. entom. 1858. p. 70 appartiennent au genre *Mecysmoderes*.

Sur le continent indien on trouve une grande espèce de *Mecysmoderes* de la taille et des couleurs du *Mono-nychus pseudoacori*, mais avec une tache subscutellaire blanche et des élytres sillonnées de stries ponctuées profondes; le dessous du corps, pieds, tête, et les côtés latéraux du corselet, sont couverts d'une pubescence d'un testacé blanchâtre. Je l'ai nommée *M. semiablidus*.

Ceuthorhynchus nebulosomaculatus Motsch., statura *Ceuth. quercicolae* sed paulo brevior. Subovatus, convexus, opacus, crebre punctatus, niger, thoracis linea media impressa lateribusque elytrorum maculis vel lineis interruptis pluribus, corpore subtus pedibusque subcine- reis, tarsis rufo-piceis.

Long. 4 l. — lat. $\frac{1}{2}$ l.

Des Montagnes de Nura-Ellia.

Ceuthorhynchus latrunculatus Motsch., statura *Ceuth. quercicolae* sed minor. Subovatus, convexus, opacus, crebre punctatus, dense pubescens, nigro piceus, thoracis linea media impressa lateribusque, elytrorum macu- lis latrunculato dispositis, corpore subtus pedibusque te- staceis; elytris profunde punctato striatis, tarsis rufo - te- staceis; rostro subdepresso, antice paulo dilatato.

Long. $\frac{3}{4}$ l. — lat. $\frac{1}{2}$ l.

Des Montagnes de Nura-Ellia.

Ceuthorhynchus debilis Motsch., statura et color precedenti sed paulo minor. Subovatus, convexus, subopacus, punctatus, niger, thoracis linea media im- pressa lateribusque, elytrorum maculis, corpore subtus

pedibusque testaceo pubescens; elytris profunde striatis,
intersticiis subelevatis.

Long. $\frac{3}{4}$ l. — lat. $\frac{1}{4}$ l.

Des Montagnes de Nura Ellia

Le rostre de ces trois espèces étant plus robuste que chez les autres *Ceuthorhynchus* demanderait peut-être la formation d'un genre nouveau si d'autres espèces analogues en augmentaient le nombre.

Nanophyes trimaculatus Motsch., statura et color *Nan. lythri* sed major. Oblongo ovatus, convexus, subopacus, puberulus, rufo-testaceus, thoracis marginis angustissime, scutellarum striga utrinque, elytrorum fascia obliqua antice, intersticiis postice (alternis maculatis) corporeaque subtus subalbidis, elytrorum basi triangulariter utrinque maculaque post scutellari fuscis.

Long. 1 l. — lat. $\frac{1}{2}$ l.

Des Montagnes de Nura-Ellia.

Une espèce très-voisine du continent indien (Tenasserrim) par sa taille, sa forme et ses couleurs se distingue par sa pubescence uniforme blanchâtre sur la partie postérieure des élytres, ne formant pas de lignes ni de taches alternativement comme chez l'espèce de Ceylan. Je l'ai nommée *Nan. ochreatus*.

Nanophyes quadrivittatus Motsch., statura *Nan. lythri* sed paulo major et latior. Ovatus, convexus, sparsim puberulus, subnitidus, rufo-testaceus, fronte, oculis elytrisque nigris, his fascia obliqua vittisque duabus utrinque in medio, pallido testaceis.

Long. 1 l. — lat. $\frac{1}{2}$ l.

Des Montagnes de Nura-Ellia.

N° 2 1866.

29

Nanophyes subfasciatus Motsch., statura *Nan. lythri* sed paulo major. Oblongus, convexus, nigro piceus, rostro ad basin, thorace pedibusque rufescentibus; elytris nitidis, antice utrinque fascia oblique alba; thorace subcinereo pubescens.

Long. 4 l. — lat. $\frac{1}{4}$ l.

Des Montagnes de Nura-Ellia.

Nanophyes rufipes Motsch., statura *Nan. lythri* sed niger. Oblongus, convexus, nitidus, elytris antice utrinque fascia nebulosa, pedibus rufis, geniculis paulo infuscatis.

Long. $\frac{3}{4}$ l. — lat. $\frac{1}{4}$ l.

Colombo.

Le continent indien présente quelques espèces voisines: *Nan. nigripennis* Motsch. de forme un peu plus large que celle du *rufipes*, d'un testacé roussâtre, avec les élytres noires et recouvertes d'une pubescence blanchâtre éparses plus serrée vers la suture. *Nan. jota* Motsch. de forme un peu plus courte et plus large, noir, rostre et pieds entièrement d'un testacé roussâtre; une tache allongée blanche sur la suture des élytres derrière l'écusson. *Nan. latus* Motsch. taille et couleurs du *Nan. rufipes*, mais beaucoup plus large, tout le corps unicolorément noir et luisant. *Nan. plumbeus* Motsch. taille et couleurs du *rufipes*, mais plus allongé, pattes noires avec la base des cuisses roussâtre.

Nanophyes niger Motsch., statura *Nan. lythri* sed unicolor. Oblongus, convexus, nitidus, niger, sparsim albescente puberulus, pedibus rufo-brunneis, geniculis obscurioribus.

Long. $\frac{3}{4}$ l. — lat. $\frac{1}{4}$ l.

Patanias.

Nanophyes pallidulus Motsch., statura et color *Nan.* *palliduli* sed paulo minor. Ovatus, convexus, puberulus, dilute pallidulus, rostro, oculis, elytrorum maculis tribus subscutellari pectoreque plus minusve infuscatis.

Long. $\frac{1}{2}$ l. — lat. $\frac{1}{4}$ l.

Des Montagnes de Nura-Ellia.

Gymnaetron pallidimanus Motsch., statura *Gymn. icteric* sed thorace angustiore rostro robustiore. Oblongo - ovatus, convexus, puberulus, niger, elytris flavo - testaceis, basi suturaque infuscatis, tibiis tarsisque anticis pallidis.

Long. $\frac{3}{4}$ l. — lat. $\frac{1}{2}$ l.

Des Montagnes de Nura-Ellia.

Cotaster apioniformis Motsch., statura *Cot. uncipedi* sed angustior et longior. Elongato subovatus, angustatus, convexus subopacus, castaneus, rostro subarcuato, nitido, thoracis longitudine, antennis rufo - testaceis; thorace capite vix latiore, subelongato, grosso punctato; elytris ad basin thoracis latitudine, ellypticis, postice subdilatatis, grosso scrobiculato striatis, interstitiis paulo elevatis.

Long. $1\frac{1}{4}$ l. — lat. $\frac{1}{4}$ l.

Des Montagnes de Nura-Ellia.

Rhyncolus linearis Motsch. (*Phloeophagus*) $1\frac{1}{2}$ — 2 l. +

Mesites suturalis Motsch., statura et color *Mes. pallidipenni* sed minor. Elongatus, subparallelus, depresso, nitidus, rufo - testaceus, capite, rostro, antennarum clava suturaque infuscatis; elytris grosso punctato striatis, interstitiis planis; thorace medio impunctato, triangulariter excavato.

Long. cum r. $1\frac{3}{4}$ l. — lat. $\frac{1}{2}$ l.

Des Montagnes de Nura-Ellia.

Mesites subvittatus Motsch., statura *Mes. pallidipenni* sed minor et angustior. Elongatus, parallelus, depresso, nitidus, nigro-piceus; elytris profundo punctato striatis, utrinque vitta elongata subtestacea; thorace grosso punctato, medio utrinque longitudinaliter impresso.

Long. cum r. $1\frac{3}{4}$ l. — lat. $\frac{1}{2}$ l.

Des Montagnes de Nura-Ellia.

Rhyncolus ater Motsch., statura *Rhync. filiformi* sed minor. Elongatus, subcylindricus, punctatus, subnitidus, niger, antennis apice rufo-testaceis, pedibus paulo piceis; thorace grosso punctato, lateribus arcuatis; elytris scrobiculato striatis, interstitiis angustis, subelevatis.

Long. c. r. $1\frac{1}{2}$ l. — lat. $\frac{1}{2}$ l.

Des Montagnes de Nura-Ellia.

Rhyncolus taciturnus Motsch., statura *Rhync. filiformi* sed latior. Elongatus, antice posticeque attenuatus, convexus, opacus, crebre punctatus, niger, antennis, tibiis tarsisque piceis; thorace antice attenuato; elytris thorace paulo latioribus, subparallelis, scrobiculato punctatis.

Long. c. r. $1\frac{3}{4}$ l. — lat. $\frac{1}{2}$ l.

Des Montagnes de Nura-Ellia.

Rhyncolus cossoides Motsch. (*Phloeophagus*) $1\frac{2}{5}$ l.— $1\frac{1}{2}$ l. +

Sitophilus oryzae L. $1\frac{1}{4}$ l. +

Dryophthorus? setulosus Motsch., statura *Dr. lymexylon* sed duplo minor. Elongatus, antice posticeque attenuatus, subdepressus, opacus, crebre punctatus, ferrugineus, rostro pedibusque dulutioribus; elytris crenato striatis, interstitiis seriatim setulosis.

Long. c. r. $\frac{3}{4}$ l. — lat. $\frac{1}{4}$ l.

Des Montagnes de Nura-Ellia.
