

I N S E C T A
M U S E I G RÆCENSIS,
QUE
IN ORDINES, GENERA ET SPECIES
J U X T A
S Y S T E M A N A T U RÆ
C A R O L I L I N N Æ I
D I G E S S I T
N I C O L A U S P O D A ,
E S O C I E T A T E J E S U ,
P H I L O S O P H I Æ D O C T O R , E T
M A T H E S E O S P R O F E S S O R .

P R O S T A N T
A P U D J O A N N E M B A P T I S T A M
D I E T R I C H , B I B L I O P O L A M .

G RÆCII ,
T Y P I S HÆREDUM WIDMANSTADI.
A N N O M . D C C . L X I .

COCCINELLA.

* *Coleoptris rubris flavisque; punctis nigris maculatis.*

2 punctata. 1. C. *coleoptris rubris: punctis nigris duobus.* S. N. L.

3 punctata. 2. C. *coleoptris rubris: punctis universim tribus; duobus ad apicem coleopterorum & puncto uno communi.* S. N. L.

7 punctata. 3. C. *coleoptris rubris: punctis 7. nigris.* S. N. L.

Habitat in agris & plantis frequentissima.

Rœf. inf. 2. Scar. 3. pag. 7. Gottes-Sühlein. Gottes-Schäflein, Marien-Schäferlein vulg. Frauen-Schäferlein.

Larva cærulescens, tuberculis fulvis pluribus seta armatis, postice attenuata, sex pedibus pectoralibus instruitur.

Pupa pellicula flava punctis nigris distincta obtegitur, cuticula larvæ ad anum retracta, qua culmis adbæreret: itaque sex diebus permanet, tum veste abjecta c. 7. punctata mense Junio prodiverat.

14 pun-

In Coccinellis. 1 - 3. Thorax niger lucidus macula utrinque laterali alba.

14 punctata. 4. C. coleoptris flavis punctis nigris quatuordecim nullis contiguis sed sparsis, thorace concolor : punctis sex nigris.

Ocellata β . 5. C. coleoptris subgriseis, punctis nigris 17, singulis annulo albo cinctis, thorace nigro, albo maculato.

Subocellus unus communis, seu in concursu elytrorum. Ordo reliquorum sequens : I. 3. 3. I.

*** *Coleptris rubris, flavisve : albo maculatis.*

* **12 guttata.** 6. C. thorace flavo, utrinque macula laterali alba coleoptris concoloribus punctis 12. albis.

14 guttata β . 7. C. thorace flavo, utrinque macula laterali alba coleoptris concoloribus punctis quatuordecim albis.

18 guttata. 8. C. thorace rubro utrinque macula laterali alba coleoptris concoloribus : punctis albis sedecim : duobus primis lunatis.

S. N. L.

*** *Coleoptris nigris : rubro maculatis.*

6 pustulata. 9. C. thorace nigro, immaculato : coleoptris punctis rubris sex. S. N. L.

Puncta duo majora ad basim elytrorum.

4 pustulata. 10. C. thorace nigro nitido; immaculato, coleoptris punctis rubris quatuor: interioribus longioribus. S. N. L.

Habitat in urticis, rubis.

* * * * * *Coleoptris nigris, albo flavoque maculatis.*

*** 14 maculata.** 11. C. thorace nigro, utrinque macula laterali alba, coleoptris concoloribus punctis flavis 14.

Minimis adnumeranda.

CHRYSOMELA.

* *Corpore ovato.*

Graminis. 1. C. ovata, viridis nitida, antennis pedibusque concoloribus; alis rubentibus.

Habitat in gramine.

Alni. 2. C. ovata violacea, elytris punctis excavatis sparsis. S. N. L.

Habitat in alno.

Betulæ. 3. C. ovata violacea, thorace antice excavato, elytris punctis excavatis sparsis. S. N. L.

Habitat in betula alba.

Aenea. 4. C. ovata viridi ænea, thorace antice excavato, abdome supra decolore.

Minor præcedentibus omnibus.