

*duidelijk versmald. Voorcoxae tegen elkaar aanstaande, min of meer uitpuilend. Mesosternum tusschen de middelcoxae smal. Het tweede tarslid smal.*

*Van de 8 Europeesche soorten komt 1 in het aangrenzend gebied voor.*

### XXXV. Familie MYCETAEIDAE.

Sprieten 11-, bij uitzondering 10-ledig (Alexia), naar het uiteinde geleidelijk verdikt of met 2- (Lelestes), meestal 3- of 4 (Myrmecoxenus) grootere eindleedjes; hetzij op het voorhoofd vrij voor de oogen, of vóór de oogen onder den zijrand van den kop ingeplant. — Clypeus meer of minder duidelijk van het voorhoofd gescheiden, behalve bij het niet in ons gebied voorkomend genus *Lithophilus*. Kop zonder sprictgroeven. — Voorkaken aan den top gespleten of 2- of 3-tandig.

- 1 Klauwen gespleten. Achterhoeken van het halsschild stomp of afgerond. Gevleugeld. . . . 2  
 Klauwen gewoon, slechts met een tand aan de basis. Achterhoeken van het halsschild tamelijk  
 recht, tegen de schouders der dekschilden aansluitend. Ongevleugeld. . . . (Cynegelis.)
- 2 Klauwen in twee bijna even lange deelen gespleten en aan de basis met een breed tand.  
 Achterhoeken van het halsschild afgerond. . . . . 4. **Epilachna.**

### III. Tribus COCCINELLINI.

- 1 Metasternum en eerste sterniet zonder dijlijnen. De randlijn der metasternale voortzetting  
 tusschen de middelcoxae in eene flauwe bocht op vrij grooten afstand van den eigenlijken  
 toprand verloopend. Klauwen met een scherp middenstand . . . . . 6. **Hippodamia.**

## 6. HIPPODAMIA.

Lichaam aan de zijden gelijkmatig afgerond, naar achteren nauwelijks meer dan naar voren versmald, geel- of bruinrood; eene gewoonlijk onduidelijke vlek in 't midden van het halsschild en 12 (3. 4. 2. 2) stippen op elk der dekschilden zwart. Achterlijf dicht

(Sub-gen. *Adonia* Muls.). Halsschild zwart, de voor- en zijrand, benevens eene korte middellijn en twee stippen op het midden, welke soms met den voorrand samenhangen, geelachtig-wit. Dekschilden rood, naast het schildje witachtig; eene rondachtige scutellair-vlek en 6 (1. 2. 2. 1.) stippen op elk der dekschilden, welke evenals bij *Hippodamia* 13-punctata geplaatst zijn, zwart. Van deze soort zijn verscheidene kleur-aberraties bekend, waarvan enkelen ook in Nederland zijn waargenomen. Dekschilden ongevlekt of slechts met de scutellair-vlek (*immaculata* Gmel.); met de scutellair-vlek en stip 1 (*betae* Walter), of 5 (*inhogesta* Weise), of 4 (*Hummelli* Weise), of 6, of 2. De scutellair-