

В. Плигинскій (Курскъ).

Новый видъ рода *Harpalus* Latr. изъ Крыма (Coleoptera, Carabidae).

(Съ 1 рисункомъ).

V. Pliginsky (Kursk).

Une espèce nouvelle du genre *Harpalus* Latr. de Crimée (Coleoptera, Carabidae).

(Avec 1 figure).

Harpalus mitridati, sp. n.

♂. По цвѣту и общему внѣшнему виду близокъ къ *H. rubripes* Duft., отъ котораго существенно отличается гораздо меньшей величиною и присутствіемъ только одной точки на третьемъ промежуткѣ надкрыльевъ.


Голова гладкая; сяжки желто-красные, средніе ихъ членики безъ замѣтнаго потемнѣнія. Переднеспинка почти такой же ширины, какъ надкрылья, прямоугольная, болѣе или менѣе выпуклая, короче чѣмъ у *H. fuliginosus* Duft.; спереди округлена болѣе чѣмъ у *H. latus* L., но слабѣе чѣмъ у *H. fuliginosus* Duft.; задніе углы ея слабо тупоугольные, округлены слабѣе, чѣмъ у *H. latus* L.; срединная линія отчетливая, идетъ отъ одного края переднеспинки къ другому; середина совершенно гладкая, безъ нѣжныхъ, косыхъ къ срединной линіи, морщинъ и точекъ; пунктировка задняго края однообразна почти по всей ширинѣ переднеспинки; точки отдѣльныя, не сливаются одна съ другой, въ боковыхъ ямкахъ болѣе глубоки и расположены гуще; ямки продолговатыя, не глубоки. Эпистерны заднегруди почти треугольной формы, ихъ длина только въ полтора раза превышаетъ наибольшую ширину; покрыты ясными, отдѣльными, не расплывающимися точками. Надкрылья плоскія, гладкія, блестящія, съ одной только точкою на третьемъ промежуткѣ; бороздки тонкія и неглубоки, промежутки плоскіе, менѣе выгнутые, чѣмъ у *H. rubripes* Duft.; на концѣ над-

крылья слабо вырѣзаны, бока ихъ параллельны. Послѣдніе сегменты брюшка гладкіе, не покрыты волосками; второй и третій стерниты брюшка покрыты посрединѣ отдѣльными, нерасплывающимися точками. Ноги желто-красныя, лапки болѣе свѣтлыя. Длина 9 мм.

♀ неизвѣстна.

Керченскій полуостровъ, Мама-чокракъ, 1. III. 1911, 22. III. 1911, 4 экз. (А. Диринъ!); окр. Симферополя, 6. VI. 1904, 1 экз. (въ моей колл.); Феодосія, 18. V. 1880, 1 экз. (О. Ф. Ретовскій, колл. ест.-истор. музея Губ. Земства въ Симферополѣ).

По опредѣлительной таблицѣ Reitter'a, *Harpalus mitridati* долженъ стоять между *H. fuliginosus* Duft. и *H. latus* L., отличаясь отъ обоихъ видовъ болѣе узкой и плоской формой тѣла и цвѣтомъ. Отъ *H. fuliginosus* описываемый видъ отличается кромѣ того болѣе короткой и гладкой переднеспинкой, свѣтлыми ногами, болѣе тупыми передними углами переднеспинки и меньшей величиной. Отъ *H. latus* нашъ видъ отличается болѣе округленной спереди переднеспинкой и отчетливой пунктировкой заднегруди, эпистерновъ заднегруди и средины второго и третьяго стернитовъ брюшка. Наиболѣе близко нашъ видъ стоитъ къ *H. luteicornis* Duft., отъ котораго отличается большей величиной, болѣе плоскими надкрыльями, промежутки которыхъ также плоче, бороздки же менѣе глубокія и уже, а также и пунктировкой груди.



Harpalus mitridati, sp. n. Эпиплевры заднегруди и первые сегменты брюшка снизу. Увел. около 10.

1. (2). Thorax deux fois plus large que long. Bord antérieur fortement arrondi. Épisternes du métathorax finement chagrinés. Longueur 10—11 mm. *fuliginosus* Duft.
2. (1.) Thorax moins que deux fois plus large que long. Longueur 6—9 mm.
3. (4.) Bord antérieur du thorax graduellement arrondi. Épisternes du métathorax ponctués dispersement. Corps étroit, élytres plats, finement striés, avec des intervalles plats. Longueur 9 mm. . *mitridati*, sp. n.
4. (3.) Bord antérieur du thorax peu arrondi. Épisternes du métathorax non ponctués ou à petits points sont fondus.
5. (6.) Longueur 8—9 mm. *latus* L.
6. (5.) Longueur 6—7,5 mm.; plus étroit *luteicornis* Duft.