



ЗАМЕТКИ

Первые находки долгоносика *Lixus linearis* (Coleoptera, Curculionidae) на территории Украины [First Records of Weevil *Lixus linearis* (Coleoptera, Curculionidae) in Ukraine]. — Долгоносик *Lixus (Dilixellus) linearis* Olivier, 1807 (= *cribricollis* Boheman, 1835) очень близок к *L. bardanae* (Fabricius, 1787), хорошо отличаясь от последнего явственными голыми точками на стернитах брюшка. Развивается на различных видах шавеля, особенно *Rumex acetosa* L. Был известен ранее из Средней Европы и Средиземноморья (Dieckmann, 1983). Впервые обнаружен в Украине по материалам сборов авторов в 1991—2006 гг. в Черниговской (Борзнянский, Ичнянский, Менский, Сосницкий, Черниговский р-ны) и Сумской (Середино-Будский р-н) областях. — В. Ю. Назаренко, З. Л. Берест (Институт зоологии им. И. И. Шмальгаузена НАН Украины, Киев), В. Н. Павлюк, П. Н. Шешурак (Нежинский государственный педагогический университет им. В. Гоголя).

***Selysiothemis nigra* (Insecta, Odonata) — первая находка для фауны Украины [The First Record of *Selysiothemis nigra* (Insecta, Odonata) from Ukraine].** — Обнаружена 20.07.2002 одна самка *Selysiothemis nigra* (Vander Linden, 1825) на западной окраине с. Покровка (Ковалевка) Очаковского р-на Николаевской обл. (46°28'36" N, 31°39'33" E) у берега оз. Чирнино. Длина особи — 33,5 мм (от головы до конца последнего брюшного сегмента), размах передних крыльев — 61 мм. В Европе вид отмечен в Болгарии, Греции, на территории бывшей Югославии, Италии, на Мальте и в Испании. Данная находка существенно меняет представления о северной границе ареала вида. — В. М. Титар (Институт зоологии им. И. И. Шмальгаузена НАН Украины, Киев).