

АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР

Биолого-почвенный институт

ЖУКИ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА И ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ

(новые данные
по фауне и систематике)

ВЛАДИВОСТОК
1979

НОВЫЕ СВЕДЕНИЯ ПО ФАУНЕ ЖУЖЕЛИЦ (COLEOPTERA,
CARABIDAE) ЮЖНОГО ПРИБАЙКАЛЯ*В. Г. Шиленков*

Иркутский государственный университет

В опубликованном ранее списке (Шиленков, 1974) содержится 246 видов жужелиц, причем часть из них указана по литературным данным. С момента сдачи в печать этой работы в результате обработки собственных сборов автора, а также обширных коллекционных материалов Зоологического института АН СССР (ЗИН), других учреждений и частных лиц накоплены значительные новые сведения, позволяющие увеличить список жужелиц еще на 120 видов, многие из которых впервые отмечаются для Южного Прибайкалья. Для некоторых видов, приведенных ранее по литературным источникам, нахождение в Южном Прибайкалье не подтвердилось, и их пришлось из списка исключить. В результате к настоящему времени для Южного Прибайкалья с достоверностью известно 344 вида жужелиц, относящихся к 53 родам.

Для всех видов указаны пункты сбора, крайние сроки их находок в природе и суммарное количество исследованных экземпляров. Для редких и интересных видов этикетки приводятся полностью, указывается также учреждение, в котором они хранятся. Если вид уже был указан для Южного Прибайкалья, в большинстве случаев цитируется соответствующая литература. Приведены также сведения об ареале видов.

В настоящей статье мы сочли полезным сообщить новые сведения о распространении некоторых интересных видов, приведенных нами ранее по литературным источникам. Кроме того, внесены некоторые исправления в связи с новейшими номенклатурными изменениями.

Значительные материалы по жужелицам переданы автору на обработку Э. Я. Берловым, Е. П. Бессолицыной, А. А. Воинковым, Г. П. Лукиной, Л. Г. Прохоровой. Автор также имел возможность ознакомиться с коллекциями Сибирского института физиологии и биохимии растений СО АН СССР (преимущественно сборы А. С. Рожкова), Иркутского опорного пункта защиты растений ВИЗР. Обширные и до конца еще не обработанные материалы по жужелицам Прибайкалья хранятся в фондах ЗИН АН СССР. Это прежде всего сборы известного иркутского энтомолога-любителя С. Н. Родионова, ссыльных польских натуралистов А. Л. Чекановского, Н. Гартунга, А. Ксенжопольского, а также Я. Королькова, В. И. Мельниковой, Д. А. Смирнова, Т. О. Юринского, В. Е. Яковлева.

Автор благодарен всем учреждениям и лицам, предоставившим материалы своих коллекций для просмотра и определения. Особо признателен автор доктору биологических наук О. Л. Крыжановскому за постоянную помощь в работе и доктору Ф. Хике (ГДР) за проверку определений видов рода Амага и ценные сведения о жужелицах, собранных им в 1974 г. в Прибайкалье.

Список составлен в систематическом порядке. Виды, впервые при-

водимые для Южного Прибайкалья, отмечены одной звездочкой, для территории СССР — двумя.

1. *Cicindela (Cylindera) obliquefasciata* Adams, 1817

Семенов-Тянь-Шанский, 1908 — Мальта.

Распространение. Ср. Азия, Алтай, Прибайкалье, Забайкалье, Афганистан, Вост. Иран, МНР, Сев.-Вост. и Сев.-Зап. Китай. Описан из окр. Иркутска.

Материал. Иркутская обл.: Мальта, 21.VI—25.VII 1907, 8 экз. (Смирнов), ЗИН.

2. *C. (s. str.) maritima restricta* Fischer-Waldheim, 1828

Solsky, 1871—Иркутск, Култук. Семенов-Тянь-Шанский, 1908 — Мальта, Селенгинск. Mandl, 1935 — Иркутск, Култук, Монды, Тунка, Улан-Удэ.

Распространение. Номинативный подвид распространен на побережье Атлантического океана, Северного и Балтийского морей. Наш подвид встречается на северо-востоке европ. ч. СССР, широко распространен в Сибири до Магаданской обл., Сахалина и Камчатки, на юге от Алтая до Забайкалья и Приамурья.

Материал. Иркутская обл.: Мальта, Слюдянка, Тибельти, Усть-Балей. Бурятская АССР: Гуджиры, Кырен, Монды, Орлик, Тунка, Туран, Хара-Хужир, Хорбятка. 29.V—27.VIII, 166 экз.

3. *C. (Eugrapha) arenaris viennensis* Schrank, 1781

Семенов-Тянь-Шанский, 1908 — Мальта.

Распространение. Лесостепная и степная зоны европ. ч. СССР, Вост. Предкавказье, юг Сибири до Прибайкалья. Юго-Вост. Европа.

Материал. Иркутская обл.: Мальта, 11—15.VI 1907, 16.V 1908 (Смирнов), 5 экз., ЗИН.

4. *C. (Eugrapha) mongolica* Faldermann, 1835

Motschulsky, 1844 — «Аларские степи». Семенов-Тянь-Шанский, 1908 — Новоселенгинск.

Распространение. Южн. Прибайкалье, Забайкалье. МНР, Китай.

Материал. Бурятская АССР: Новоселенгинск, 18—20.VII 1899 (Мельникова), 6 экз.

5. *Carabus (Eupachys) glyptopterus* Fischer-Waldheim, 1927**

Распространение. Степи Бурятской АССР и Читинской обл. МНР, Китай (Внутренняя Монголия).

Материал. Бурятская АССР: оз. Гусиное, 28.VI 1957 (Рожков), 1 экз.; Новоселенгинск, 20.VI 1912 (Мельникова), 1 экз., ЗИН, Улан-Удэ, 30.VII 1915 (Оглоблин), 5 экз., ЗИН.

6. *C. (Coptolabrus) smaragdinus* Fischer-Waldheim, 1823

Баллион, 1870 — окр. Иркутска. Mandl, 1931—Улан-Удэ.

Распространение. От Прибайкалья до Приамурья и Приморья. Корея, Сев.-Вост. Китай. Распадается на много подвидов, в Прибайкалье обитает номинативный.

Материал. Бурятская АССР: Ильинка, сосняк рододендрон-
вый, 20.VII 1974 (Воинков), 1 экз.

7. *C. (Hemicarabus) macleayi* Dejean, 1826*

Распространение. Сибирь от Прибайкалья и Якутии до
Приморья, Приамурья, Магаданской обл., Камчатки. Сев. Корея, Сев.-
Вост. Китай.

Материал. Бурятская АССР: Хамар-Дабан, левый берег
р. Абидуя, горная тундра, 4—14.VII 1973 (Галкина), 4 экз.

8. *C. (Diocarabus) sloltzovi* Mannerheim, 1849

Распространение. Гольцы Восточного Саяна. Мандль
(Mandl, 1973) указывает для гор Прихубсугулья и Монгольского
Алтая.

Материал. Бурятская АССР: верховья Иркута, 2.VII 1914 (Ро-
дионов), 2 экз.; перевал Нуху-Дабан в верховьях Иркута, 2260 м над
ур. м., 28.VI 1913, 19.VI 1915 (Родионов), 4 экз.; оз. Сусер-Нор в вер-
ховьях Иркута, 1940 м над ур. м., 13—14.VI 1915 (Родионов), 13 экз.;
гора Хулугайша. 2700—3000 м над ур. м.. под камнями в горной тунд-
ре, 26.VI—1.VII 1974 (Шиленков, Берлов), 25 экз.

9. *Nebria (Reductonebria) altaica* Gebler, 1847

Баллион, 1870 — окр. Иркутска. Шиленков, 1974 — Прибайкалье
(как *N. ochotica* R. F. Sahib.).

Распространение. Алтай, Кузнецкий Алатау, Тувинская
АССР, Саяны, Хамар-Дабан.

Материал. Иркутская обл.: Выдрино, Култук, Мангутай. Бу-
рятская АССР: Туран, Тунка, Танхой, р. Сорока. 1.VI—23.VII, 83 экз.

10. *Notiophilus impressifrons* A. Morawitz, 1863*

Распространение. Приамурье, Приморье, Сахалин, на за-
пад до Прибайкалья.

Материал. Иркутская обл.: Култук, 1 экз., ЗИН. Бурятская
АССР: Ильинка, 31.V 1975 (Воинков), 1 экз.

11. *Diacheila polita* Faldermann, 1835

Распространение. Голарктический арктоальпийский вид.
Тундра и лесотундра европ. ч. СССР, Сибирь до Магаданской обл.,
Камчатки, Приамурья, на юге Сибири в горах Алтая и Прибайкалья,
северо-запад Сев. Америки.

Материал. Иркутская обл.: Култук, 6.VII 1878 (Ксенжополь-
ский), 1 экз. Бурятская АССР: Монды, гора Хулугайша, 2700 м над
ур. м., под камнями у ручья, 25.VI 1974 (Берлов), 1 экз.; р. Сорока,
2.VI 1914 (Родионов), 1 экз.

12. *Elaphrus angusticollis* R. F. Sahlberg, 1844

Распространение. Север европ. ч. СССР (на юг до Ярослав-
ской и Горьковской областей) и Сибири до Магаданской обл., Приа-
мурья, Сахалина, на юг до Прибайкалья. Сев. Европа (Финляндия),
Сев. Америка (Канада, Аляска).

Материал. Иркутская обл.: Тибельти, 17.VI 1916 (Родионов).

13. *E. cupreus* Duftschmid, 1812

Mandl, 1931—Улан-Удэ.

Распространение. Европ. ч. СССР, Казахстан, Сибирь до Лены и Забайкалья. Сев. и Ср. Европа.

Материал. Иркутская обл.: Иркутск, на пустыре у воды, 30.V 1970 (Берлов), 1 экз.; р. Ушаковка, 10—28.V 1912 (Родионов), 15 экз.

14. *E. lapponicus* Gyllenhal, 1810*

Распространение. Голарктический вид. Север Европы и Сибири, в Прибайкалье в горах, Сев. Америка.

Материал. Бурятская АССР: Монды, гора Хулугайша, 1600 м над ур. м., в заболоченном лиственничнике, 26—30.VI 1974 (Шиленков, Берлов), 2 экз.

15. *E. punctatus* Motschulsky, 1844

Mandl, 1931—Улан-Удэ.

Распространение. Прибайкалье, Забайкалье, Приамурье, Приморье. Север МНР, Корея.

Материал. Иркутская обл.: Иркутск (Яковлев), 8 экз.; там же, 27.VI 1912 (Пахомов), 1 экз., ЗИН. Бурятская АССР: Монды, на берегу Иркуты, 1.VII 1974 (Шиленков), 1 экз.; Зун-Мурино, заболоченный луг, 30.VIII 1975 (Шиленков), 1 экз.

16. *E. splendidus* Fischer-Waldheim, 1828

Распространение. Красноярский край, Тувинская АССР, Прибайкалье, Забайкалье, Приамурье, Приморье, Магаданская обл. МНР.

Материал. Иркутская обл.: Большая Речка, Вдовино, Иркутск, Оёк. Бурятская АССР: Торы, Тунка. 15.IV—6.VII, 14 экз.

17. *E. trossulus* Semenov, 1904

Csiki, 1927 —Тунка.

Распространение. Широко распространен на севере МНР, откуда был описан. На территории СССР известен пока только из Тункинской долины.

Материал. Бурятская АССР: Монды, гора Хулугайша, 1100 м над ур. м., на берегу озера, 23.VI—1.VII 1974 (Шиленков), 1 экз.; там же, 23.VI 1972 (Берлов), 1 экз.

18. *Dyschirius aeneus* Dejean, 1825

Распространение. Сев. и ср. полоса европ. ч. СССР, Сибирь до Забайкалья, Приамурья, ? Камчатки. Вся Европа, Сев.-Вост. Китай, ? Япония.

Материал. Иркутская обл.: Вдовино. Бурятская АССР: Зун-Мурино, Ильинка. 31.V—31.VII, 20 экз.

19. *D. ? fossifrons* Putzeys, 1866

Распространение. Известен из Забайкалья. Экземпляр под вопросом определен К. Култом.

Материал. Иркутская обл.: о-в Ольхон, пос. Харанцы, 13.VII 1974 (Бессолицына), 1 экз.

20. *D. longicollis* Motschulsky, 1844*

Распространение. Описан из Кяхты. Прибайкалье, Забайкалье.

Материал. Бурятская АССР: Таежный, участок голой глины на болоте, 21.VI 1975 (Воинков), 3 экз.

21. *D. tristis* Stephens, 1827

Распространение. Сев. и ср. полоса европ. ч. СССР, Казахстан, Сибирь до Прибайкалья, Забайкалья, Якутии. Сев. и Ср. Европа.

Материал. Бурятская АССР: Таежный, заиленный берег озера, 21—27.VI 1975 (Шиленков), 3 экз.; Ильинка, болото, 29.VII 1975 (Воинков), 1 экз.

22. *Miscodera arctica* Paykull, 1798

Распространение. Голаркт. Сев. Европа (на юге в горах), Сибирь до Приамурья и Магаданской обл. на юг до Прибайкалья. Сев. Америка.

Материал. Иркутская обл.: Большая Глубокая, на поляне под камнями, 27.VIII 1970 (Шиленков), 1 экз.; Выдрино, под камнями, 9.VII 1974 (Берлов), 2 экз.

23. *Eraphius rivularis* Gyllenhal, 1810*

Распространение. До сих пор был известен только с севера Европы (Фенноскандия, Карелия, Архангельская обл., Коми АССР) и локально в Центр. Европе. Для Прибайкалья, как и Сибири в целом, указывается впервые.

Материал. Бурятская АССР: Ильинка, мохово-разнотравное болото, 15.VI 1975 (Шиленков, Воинков), 2 экз.; там же, 29.VI 1975 (Воинков), 1 экз.

24. *E. secalis* Paykull, 1790

Распространение. Европ. ч. СССР, Кавказ, Сибирь до Забайкалья. Сев. и Ср. Европа.

Материал. Иркутская обл.: Большая Глубокая, Выдрино, Еланы, Иркутск, Косая Степь, Култук, Троицк, Бурятская АССР: Ильинка. 2.VII- -20.VIII, 29 экз.

25. *Trechus almonius* Reitter, 1903

Распространение. Вост. Саян, горы севера МНР.

Материал. Бурятская АССР: Монды, гора Хулугайша, 2700 м над ур. м., под большими камнями в горной тундре, 23—30.V 1974 (Шиленков), 8 экз.

26. *Trechus montanus* Motschulsky, 1844

Распространение. Широко распространен в Прибайкалье, известен также из Братска. По долине Лены доходит до Якутии.

Материал. Иркутская обл.: Култук, 1871 (Чекановский), 3 экз.; Выдрино, смешанный лес, 8—11.VII 1974 (Шиленков), 4 экз., Бурятская АССР: Ильинка, в подстилке смешанного леса, 24.V—9.VII 1975 (Шиленков, Воинков).

27. *T. rubens* (Fabricius, 1801)*

Распространение. Сев. и ср. полоса европ. ч. СССР, Сибирь до Лены и Прибайкалья. Сев. и Ср. Европа, завезен в Сев. Америку.

Материал. Иркутская обл.: «Иркутская губ.», 31.V 1907 (Смирнов), 2 экз., ЗИН. Возможно, экземпляры происходят из Мальты.

28. *Bembidion (Chrysobracteon) argenteolum* Ahrens, 1812

Распространение. Европ. ч. СССР, Сибирь до Якутии, Забайкалья и Приамурья. Сев. и Ср. Европа.

Материал. Бурятская АССР: Тунка, 28.VI 1915 (Родионов), 28 экз.

29. *B. (Chrysobracteon) conicolle* Motschulsky, 1844

Распространение. От Алтая до Прибайкалья, Забайкалья, Якутии, Приморья, Сахалина. Север МНР.

Материал. Иркутская обл.: Тибельти. Бурятская АССР: Зун-Мурино, Кырен, Монды, Туран. 31.V—30.VII, 28 экз.

30. *B. (Chrysobracteon) lapponicum* Zetterstedt, 1828

Распространение. Север европ. ч. СССР, Сибирь до Камчатки и Приамурья. Север Фенноскандии, Сев. Америка.

Материал. Бурятская АССР: Ильинка, илистые наносы реки, 11—18.VI 1975 (Шиленков), 6 экз.; Тунка, 28.VI 1915 (Родионов), 13 экз.

31. *B. (Chrysobracteon) litorale* (Olivier, 1791)

Mandl, 1931—Улан-Удэ.

Распространение. Европ. ч. СССР, Казахстан, Сибирь до Байкала. Сев. и Ср. Европа, север МНР.

Материал. Иркутская обл.: Култук, 28.IV 1878 (Чекановский), 1 экз., ЗИН.

32. *B. (Eurytrachelus) vitiosum* Gemminger et Harold, 1868

Распространение. От Красноярского края до Приморья, Якутии. МНР, Сев.-Вост. Китай.

Материал. Иркутская обл.: Вдовино. Бурятская АССР: Зун-Мурино, Таежный. 19.V—4.IX, 36 экз.

33. *B. (Eupetedomus) sibiricum* Dejean, 1831

Mandl, 1931 — Улан-Удэ (как *B. fuscovariegatum* Motsch.).

Распространение. Юго-восток европ. ч. СССР, Сибирь до Алтая, Прибайкалья, Забайкалья, Якутии, Приамурья, Приморья, Магаданской обл., Камчатки.

Материал. Бурятская АССР: Ильинка, заиленный берег реки, 14.VI 1975 (Шиленков), 1 экз.

34. *B. (Notaphus) semipunctatum* Donovan, 1806

Mandl, 1931—Улан-Удэ.

Распространение. Голаркт. Европ. ч. СССР, Кавказ, Казахстан, Сибирь до Прибайкалья, Приамурья, Приморья, Сахалина. Вся Европа, Сев. Африка, север МНР, Сев. Америка.

Материал. Бурятская АССР: Зун-Мурино, Ильинка, Таежный. 30.V—27.VI, 7 экз.

35. В. (*Plataphodes*) *crenulatum* R. F. Sahlberg, 1844

Распространение. Кольский п-ов, Сибирь от Енисея до Чукотки, на юг до Прибайкалья (в горах). Запад Сев. Америки.

Материал. Бурятская АССР: Монды, гора Хулугайша, 2700 м над ур. м., у ручья в гольцовой зоне, 20—30.VII 1973 (Шиленков), 10 экз.; там же, 23.VI—1.VII 1974 (Шиленков), 48 экз.

(1)

36. В. (*Plataphodes*) *difficile* Motschulsky, 1844

Распространение. Север европ. ч. СССР, Сибирь до Прибайкалья, Забайкалья, Магаданской обл., Приморья. Сев. Европа (на юге в горах), север МНР.

Материал. Иркутская обл.: Большие Коты. Бурятская АССР: Ильинка, Монды, долина р. Левая Мишиха. 22.V—1.VII, 75 экз.

37. В. (*Plataphus*) *coelestinum* Motschulsky, 1844

Распространение. Прибайкалье, Забайкалье, на востоке до Магаданской обл., Приамурья, Приморья. Север МНР.

Материал. Иркутская обл.: Большие Коты, Выдрино. Бурятская АССР: Зун-Мурино, Монды, Таежный. 21.V—2.IX, 48 экз.

38. В. (*Plataphus*) *gebleri* Gebler, 1833

Распространение. Сибирь от Алтая до Прибайкалья, Якутии, Чукотки. Сев. Америка.

Материал. Иркутская обл.: Большие Коты. Бурятская АССР: Зун-Мурино, Монды, Таежный, долина р. Левая Мишиха. 20.V—17.VIII, 19 экз.

39. В. (*Plataphus*) *hirmocoelum* Chaudoir, 1850

Распространение. Север европ. ч. СССР, горы Казахстана, Сибирь до Якутии, Приморья. Север МНР.

Материал. Иркутская обл.: Бурдаковка, Выдрино, Мальта, Урик. Бурятская АССР: Ильинка. 11.VI—10.VIII, 31 экз.

40. В. (*Trichoplataphus*) *deplanatum* A. Morawitz, 1862*

Распространение. От Красноярского края до Приморья. Сев.-Вост. Китай.

Материал. Бурятская АССР: Ильинка, галечник, 14.VI 1975 (Шиленков), 3 экз.

41. В. (*Peryphus*) *amurense* Motschulsky, 1859

Распространение. От Прибайкалья до Приморья и Магаданской обл. Корея, Япония.

Материал. Иркутская обл.: Большая Глубокая. Бурятская АССР: Зун-Мурино, Таежный. 31.V—2.IX, 43 экз.

42. В. (*Peryphus*) *dauricum* Motschulsky, 1844

Распространение. Прибайкалье, Забайкалье, Якутия, Магаданская обл. Швеция, Норвегия, север МНР, Аляска, Канада.

Материал. Иркутская обл.: Большие Коты, Мангутай. Бурятская АССР: Танхой, Таежный, долина р. Левая Мишиха. 27.V—30.VI, 5 экз.

43. *B. (Peryphus) obscurellum turanicum Csiki, 1928*

Mandl, 1931 — Улан-Удэ (как *B. fuscicum* Motsch.).

Распространение. От Алтая до Забайкалья, а также в горных системах Памира, Гиссаро-Дарваза, Копет-Дага. МНР, Китай, Сев. Индия. Подвид голарктического вида. Номинативный подвид обитает на севере Европы, Сибири и Сев. Америки.

Материал. Иркутская обл.: Большая Речка, Вдовино, Еланцы, Нукуты, о-в Ольхон. Бурятская АССР: Зун-Мурино, Ильинка, Монды, Таежный. 2.V—6.IX, 88 экз.

44. *B. (Peryphus) captivorum Netolitzky, 1943*

Распространение. От Прибайкалья до Приморья. МНР.

Материал. Иркутская обл.: Вдовино, Выдрино, Иркутск. Бурятская АССР: Зун-Мурино, Ильинка, Монды, Таежный. 2.V—2.IX, 65 экз.

45. *B. (Peryphus) jedlickai Fassati, 1945*

Распространение. Описан из Улан-Удэ, указан также для МНР (Jedlicka, 1968).

Материал. Бурятская АССР: Зун-Мурино, на илестых наносах реки, 31.V—28.VII 1975 (Шиленков), 4 экз.

46. *B. (Peryphus) semilunium muchei Jedlicka, 1965**

Распространение. Подвид распространен от Прибайкалья до Приамурья. МНР. Другие подвиды в Приморье, на Курилах, в Китае и Японии.

Материал. Бурятская АССР: Таежный, на галечниках, 21—27.VI 1975 (Шиленков, Воинков), 6 экз.

47. *B. (Peryphus) yukonum Fall, 1926**

Распространение. Имеет циркумполярное распространение в тундровой и лесотундровой зонах, в Сибири на юг до Прибайкалья. Редок и спорадичен.

Материал. Бурятская АССР: Монды, на галечниках, 20—30.VII 1973 (Шиленков), 1 экз.

48. *B. (Semicampa) dormeyeri Reitter, 1897*

В коллекции ЗИН имеются два экземпляра с этикетками: «Quell. d. Irkut, Reitter» и «Sibirien, Reitter, Leder». Известен только из Прибайкалья.

49. *B. (Emphanes) rivulare axillare Motschulsky, 1844*

Jedlicka, 1965- Улан-Удэ.

Распространение. Прибайкалье, Забайкалье. МНР. Номинативный подвид распространен на юге Европы, Кавказе, в Сев. Африке, Передн. Азии, Сев. Индии.

Материал. Иркутская обл.: Нукуты, солончак, 11.VIII 1974 (Шиленков), 3 экз.

50. B. (s. str.) humerale Sturm, 1825*

Распространение. Европ. ч. СССР, Сибирь до Прибайкалья. Сев. и Ср. Европа.

Материал. Иркутская обл.: Иркутск (Яковлев), 3 экз., ЗИН.

51. B. (s. str.) mandli Netolitzky, 1932

Mandl, 1931—Улан-Удэ.

Распространение. От Прибайкалья до Приморья. Сев. Китай.

Материал. Бурятская АССР: Зун-Мурино, в подстилке пойменного леса, 29.V 1975 (Шиленков), 1 экз.

52. B. (Trepanedoris) doris Panzer, 1797*

Распространение. Европ. ч. СССР, Казахстан, Сибирь до Прибайкалья. Сев. и Ср. Европа.

Материал. Иркутская обл.: Иркутск (Яковлев), 2 экз., ЗИН.

53. B. (Philochtus) biguttatum (Fabricius, 1799)*

Распространение. Европ. ч. СССР, Крым, Кавказ, Казахстан, Сибирь до Прибайкалья. Вся Европа, кроме Крайнего Севера.

Материал. Иркутская обл.; Иркутск, на пустыре у воды, 14.V 1972 (Берлов), 1 экз.

54. B. (Necpericompsus) punctatellum Motschulsky, 1844

Распространение. Описан из Улан-Удэ. До сих пор был известен только по типу.

Материал. Бурятская АССР: Зун-Мурино, подстилка в зарослях ивняка, 27.VIII—1.IX 1975 (Шиленков), 7 экз.

55. Tachys (Elaphropus) zouhari Jedlicka, 1961

Jedlicka, 1961—Улан-Удэ.

Распространение. Известен по нескольким находкам из Прибайкалья, севера Кореи, Южн. Приморья, Сев.-Вост. Китая до Пекина.

56. Pogonus iridipennis Nicolai, 1822*

Распространение. Юг европ. ч. СССР, Казахстан, Ср. Азия, Южн. Сибирь от Алтая до Забайкалья. Центр. Европа, МНР.

Материал. Иркутская обл.: Алтарик, 16.VIII 1916 (Родионов), 1 экз., ЗИН.

57. P. transfuga Chaudoir, 1850*

Распространение. Юг европ. ч. СССР, Крым, Казахстан, Сибирь до Прибайкалья. Южн. Европа, Передн. Азия.

Материал. Иркутская обл.: Мальта, солончак, 21—28.VI 1908 (Смирнов), 2 экз., ЗИН.

58. Diplous depressus Gebler, 1829*

Распространение. Алтай, Прибайкалье, Забайкалье, Примурье, Приморье, Магаданская обл. Север МНР, Япония.

Материал. Иркутская обл.: Култук, Мангутай, Усть-Балей, о-в Ольхон. Бурятская АССР: р. Архут, Зун-Мурино. 10.VI—22.VII, 37 экз.

59. *Pterostichus (Pledarus) gibbicollis* Motschulsky, 1844 Mandl,

Mandl, 1931 — Улан-Удэ (как *P. crassicollis* A. Mor.).

Распространение. Красноярский край, Алтай, Прибайкалье, Забайкалье, Якутия, Приамурье. Север МНР.

Материал. Иркутская обл.: Ахины, Балаганск, Быстрая, Гаханы, Иркутск, о-в Ольхон, Тибельти, Троицк, Тургеневка, Усть-Ордынский. Бурятская АССР: Аршан, Зун-Мурино, Ильинка, Кырен, Монды, Нилова Пустынь, Орлик, р. Сорока, Торы, Тунка, Хара-Хужир. 26.III—8.IX, 88 экз. Указание *P. crassicollis* A. Mor. для Прибайкалья (Шиленков, 1974) относится к этому виду.

60. *P. (Badistrinus) laticollis* Motschulsky, 1844

Mandl, 1931—Улан-Удэ.

Распространение. Сев. Казахстан, Алтай, Красноярский край, Прибайкалье, Забайкалье, Приамурье, Приморье. Сев.-Вост. Китай, Корея, Япония.

Материал. Бурятская АССР: дельта Селенги, 2.V 1913 (Родионов), 1 экз., ЗИН.

61. *P. (Adelosia) macer* Marsham, 1802*

Распространение. Ср. полоса и юг европ. ч. СССР, Кавказ, Казахстан, Сибирь до Прибайкалья. Ср. и Южн. Европа.

Материал. Иркутская обл.: долина р. Белая, 1873 (Гартунг), 16 экз., ЗИН.

62. *P. (Argutor) morawitzianus* Lutshnik, 1922

Mandl, 1931 — Улан-Удэ (как *P. subfuscus* A. Mor.).

Распространение. Прибайкалье, Забайкалье, Приамурье, ? Приморье. Север МНР.

Материал. Иркутская обл.: Большие Коты, Иркутск, Култук, Усть-Ордынский. Бурятская АССР: Зун-Мурино, Ильинка. 23.IV—18.IX, 24 экз.

63. *P. (Cryobius) lederi* Tschitscherine, 1894

Mandl, 1931 — Улан-Удэ.

Распространение. Алтай, Саяны, горы Прибайкалья и Забайкалья. Север МНР.

Материал. Иркутская обл.: Култук. Бурятская АССР: Ильинка, р. Левая Мишиха, Монды, оз. Сусер-Нор (верховья Иркуты), голец Тубота (Тункинские Альпы). 22.V—30.VIII, 100 экз.

64. *P. (Cryobius) lucidus* Motschulsky, 1844

Распространение. Красноярский край, Прибайкалье, Забайкалье, Приамурье. Север МНР.

Материал. Бурятская АССР: Монды, гора Хулугайша, 3000 м над ур. м., у тающих снежников, 23.VI—1.VII 1974 (Шиленков), 4 экз.; верховья р. Левая Мишиха, 1800 м над ур. м., у тающих снежников, 1.VII 1975 (Шиленков), 21 экз.

65. P. (*Cryobius*) *ventricosus* Eschscholtz, 1823*

Распространение. Тундра и лесотундра северо-востока европ. ч. СССР (Новая Земля, Вайгач), Сибирь до Чукотки, на юг до Прибайкалья, Забайкалья, Приамурья. Север Сев. Америки.

Материал. Бурятская АССР: Таежный, в смешанном прирубье-ЕОМ лесу, 25.VI 1975 (Шиленков), 1 экз.

66. P. (*Steropus*) *parens* Tschitscherine, 1897

^ч
Jedlicka, 1962 — Байкал.

Распространение. Красноярский край, Прибайкалье, Забайкалье, Якутия, Приамурье, Приморье. Север МНР.

Материал. Иркутская обл.: Култук, 24.IV—30.V 1878 (Ксенжопольский), 3 экз.; Тибельти, 16. VI 1916 (Родионов), 1 экз., Бурятская АССР: Монды, гора Хулугайша, 1100—1500 м над ур. м., на берегу озера и моховом болоте, 24—28.VI 1974 (Шиленков), 4 экз.

67. P. (*Euryperis*) *dauricus* Gebler, 1832*

Распространение. Прибайкалье, Забайкалье, Приамурье. Север МНР.

Материал. Бурятская АССР: долина р. Темник, пос. Ацула, 22.VII 1970 (Алексеева), 1 экз., ЗИН.

68. P. (*Euryperis*) *turanensis* Jedlicka, 1959

Распространение. Описан из Тункинских Альп (Туран). Известен только из Вост. Саяна, возможен на севере МНР.

Материал. Бурятская АССР: Монды, гора Хулугайша, 2700—3000 м над ур. м., в высокогорной тундре под камнями, 23.VI—1.VII 1974 (Шиленков), 24 экз.; голец Тубота (Тункинские Альпы), 1800 м над ур. м., 20.VII 1974 (Хике), 2 экз.

69. P. (*Lyperopherus*) *rugosus* Gebler, 1823

Распространение. Красноярский край, Прибайкалье, Забайкалье, Якутия, Приамурье. Север МНР.

Материал. Бурятская АССР: перевал Нуху-Дабан в верховьях Иркуты, 2400 м над ур. м., 10—11.VI 1915 (Родионов), 2 экз., ЗИН. (Ленинград).

70. *Agonum* (s. str.) *dolens* (C.R. Sahlberg, 1827)

Распространение. Сев. и ср. полоса европ. ч. СССР, Сев. Казахстан, Сибирь до Приморья и Камчатки, Шантарские острова. Сев. и Ср. Европа, Сев.-Вост. Китай.

Материал. Иркутская обл.: Иркутск, Тибельти, Усть-Ордынский. Бурятская АССР: Ильинка, Таежный. 30.V—9.IX, 88 экз.

71. A. (s. str.) *mandli* Jedlicka, 1933*

Распространение. Приморье, Приамурье, на запад до Прибайкалья. Север МНР, Сев.-Вост. Китай.

Материал. Иркутская обл.: Мальта, 12.VI 1907 (Смирнов), 9 экз. Бурятская АССР: Таежный, на берегу р. Темник под камнями, 22.VI 1975 (Воинков), 1 экз.

72. *A. (s. str.) nitidum* Motschulsky, 1844

Распространение. Сибирь от Барабинских степей до Якутии, Магаданской обл., на юг до Прибайкалья, Забайкалья.

Материал. Иркутская обл.: Большая Речка, Вдовино, Иркутск, Усть-Ордынский. Бурятская АССР: Таежный, Тунка, Улан-Удэ. 15.IV—26.VII, 27 экз. К этому виду относится указание *A. warnieri* Reitt. для Прибайкалья (Шиленков, 1974).

73. *A. (s. str.) quinquepunctatum* Motschulsky, 1844*

Распространение. Обычен в Северном Прибайкалье (Витимское плоскогорье, Чарская котловина), широко распространен в Якутии, Магаданской обл., Приамурье, найден в Сев. Сихотэ-Алине. На запад доходит до Урала, но здесь редок и спорадичен. Указание для МНР (Jedlicka, 1966, 1967b) основано на ошибочном определении, хотя здесь вполне возможен. Сев. Америка от Аляски до Гудзонова залива.

Материал. Бурятская АССР: «р. Монгол-Дабан, верховья Иркутка» (Яковлев), 1 экз., ЗИН; Монды, гора Хулугайша, 1600 м над ур. м., 26.VI 1974 (Шиленков), 1 экз.

74. *A. (s. str.) sutschanense* Jedlicka, 1958*

Распространение. Широко распространен в Приморье и Приамурье, на запад доходит до Прибайкалья. Сев.-Вост. Китай, север Кореи, Япония. Указание для МНР (Jedlicka, 1967a) относится к другому виду, хотя здесь вполне возможен.

Материал. Иркутская обл.: «с. Пашковское, 40 в. от Иркутска» (Яковлев), 1 экз., ЗИН.

75. *A. (s. str.) versutum* (Gyllenhal, 1827)

Распространение. Лесная и лесостепная зоны европ. ч. СССР, Крым, Сибирь, по крайней мере до Прибайкалья. Сев. и Ср. Европа. Распространение в Сибири из-за смешения с близкими видами остается неясным. Старые указания для Приамурья и Камчатки нуждаются в подтверждении.

Материал. Бурятская АССР: Ильинка, на берегу лесной лужи, 11—18.VI 1975 (Шиленков), 4 экз.

76. *A. (Europhilus) consimile* (Gyllenhal, 1810)*

Распространение. Голаркт. Север европ. ч. СССР, Сибирь до Камчатки, на юг до Прибайкалья, Забайкалья, Приамурья, Приморья, Шантарских островов. Сев. Европа, Сев. Америка.

Материал. Бурятская АССР: Тунка, 20.VII 1911 (Родионов), 1 экз., ЗИН.

77. *A. (Europhilus) gracile* (Gyllenhal, 1827)

Распространение. Сев. и Ср. Европа, Сибирь до Приамурья и Приморья, Сахалин, Япония.

Материал. Иркутская обл.: окр. Иркутска, падь Каштак, 18.V

1936 (Родионов), 1 экз.; Иркутск, 2G.V 1974 (Шиленков), 1 экз.; там же (Яковлев), 3 экз.

78. *A. (Europhilus) piceum* (Linne, 1758)*

Распространение. Сев. и Ср. Европа, Сибирь до Приморья, Алтай, Прибайкалье, Забайкалье, Якутия. Указан для Японии (Nabu, 1963).

Материал. Бурятская АССР: Ильинка, заиленный берег Селенги, 14.VII 1975 (Шиленков), 1 экз.

79. *Olisthopus sturmi* (Duftschmid, 1812)*

Распространение. Средняя полоса и юг европ. ч. СССР, Кавказ, Казахстан, Сибирь до Прибайкалья, Якутии, Приамурья, Приморья (в Сибири и на Дальнем Востоке редок). Известен из Центр, и Южн. Европы.

Материал. Иркутская обл.: Иркутск, 8.IX 1912 (Родионов), 1 экз., ЗИН.

80. *Amara* (s. str.) *aeneola* Poppius, 1906*

Распространение. Прибайкалье, Забайкалье, Якутия, Магаданская обл., Приамурье, Север МНР.

Материал. Иркутская обл.: окр. Иркутска, р. Кая, 17.IV 1914 (Родионов), 1 экз.; Култук, 29.VII 1872 (Чекановский), 1 экз.; Иркутск, VI 1964, 1 экз.; Моты, 1869 (Чекановский), 1 экз. Бурятская АССР: «Верховья р. Оки», (Яковлев), 1 экз.

81. *A. (s. str.) anxia* Tschitscherine, 1898*

Распространение. Прибайкалье, Забайкалье, Приамурье, Приморье. МНР, Сев. Китай, Корея.

Материал. Иркутская обл.: Моты, Култук. Бурятская АССР: Зун-Мурино, Монды, р. Тисса, Тунка, Туран. 20.V--8.VIII, 34 экз.

82. *A. (s. str.) coraica* Kolbe, 1886*

Распространение. Алтай, Тувинская АССР, Прибайкалье, Забайкалье, Приамурье, Приморье. На запад, возможно, доходит до Урала (Nieke, 1972). МНР, Сев. Китай, Корея.

Материал. Иркутская обл.: Большие Коты, в подстилке смешанного! леса, 7.VI 1971 (Шиленков), 1 экз.

83. *A. (s. str.) elliptica* Heyden, 1885*

Распространение. Прибайкалье, Забайкалье, Приамурье. МНР.

Материал. Бурятская АССР: оз. Щучье, 19.VIII 1971 (Лукина), 1 экз.

84. *A. (s. str.) kingdom* Baliani, 1934**

Распространение. Описан из Тибета. Спорадично распространен в Сибири. Самое северное нахождение отмечено в Магаданской обл.

Материал. Иркутская обл.: Большие Коты, 16.VIII 1974 (Шиленков), 1 экз.

85. *A. (s. str.) littorea* Thomson, 1857

Распространение. Аркто-альпийский вид. Север европ. ч. СССР, горы Кавказа, Заилийский Алатау, Сибирь до Приамурья. В Европе известен из Фенноскандии и в горах Чехословакии и Польши.

Материал. Иркутская обл.: «р. Лена, Иркут. губ.», V 1873 (Чекановский), 9 экз., ЗИН.

86. *A. (s. str.) magnicollis* Tschitscherine, 1894*

Распространение. Юг Сибири от Алтая до Приморья. МНР, Китай, Корея, Индия (Кашмир).

Материал. Иркутская обл.: Култук. Бурятская АССР: Зун-Мурино, Монды, Орлик. 13.V—27.VII, 7 экз.

87. *A. (s. str.) morio bamidunyae* Bates, 1878*

Распространение. Подвид широко распространен от юго-востока европ. ч. СССР через Казахстан, Алтай до Якутии, Прибайкалья, во всех горных системах Ср. Азии, Афганистан, Памир, Тибет, Гималаи, МНР. Номинативный подвид обитает на Кавказе, особый подвид во Французских Альпах и на Балканах.

Материал. Иркутская обл.: Иркутск (Р. Маак), 1 экз., ЗИН; Ользаны, 1871 (Чекановский), 1 экз., ЗИН; «Сосновка на Байкале», VII 1915 (Сватош), 1 экз., ЗИН. Бурятская АССР: оз. Щучье, пос. Ягодный, 1.VII 1913 (Тугаринов), 1 экз., ЗИН.

88. *A. (s. str.) nigricornis* Thomson, 1857

Распространение. Север европ. ч. СССР, Сибирь до Прибайкалья, Забайкалья, Якутии, Приамурья. Сев. Европа, на юге в горах (Альпы, Карпаты, Балканы).

Под названием *A. manca* Jedl. описан из долины Иркутта (Jedlicka, 1957). Указан Ф. Хике (Hieke, 1973) для Сев. Байкала (бухта Аяя).

89. *A. (s. str.) nitida* Sturm, 1825

Распространение. Европ. ч. СССР, Казахстан, Сибирь до Приморья. Сев. и Ср. Европа, МНР, Сев.-Вост. Китай, Корея. На востоке, начиная с Байкала, представлен подвидом *ssp. consimilis* Bal., который в Прибайкалье встречается наряду с номинативным.

Материал. Иркутская обл.: Бабушкин, Большие Коты, Выдрино, Иркутск, Култук. Бурятская АССР: Зун-Мурино, 2.V—27.VIII, 17 экз.

90. *A. (s. str.) ovata* (Fabricius, 1801)*

Распространение. Транспалеаркт. Европ. ч. СССР, Кавказ, Казахстан, Сибирь до Приамурья. Вся Европа, Мал. Азия, Китай до Тибета и Сычуани, Япония.

Материал. Иркутская обл.: Култук, 1869 (Чекановский), 2 экз., ЗИН.

91. *A. (Celia) interstitialis* Dejean, 1828

Распространение. Циркумпольярный вид. Север европ. ч. СССР, Сибирь до Камчатки, на юг до Прибайкалья и Приамурья. Сев. Европа, Сев. Америка.

Материал. Иркутская обл.: Большие Коты, Бурдаковка, Иркутск, Култук, Мангутай. Бурятская АССР: Бабушкин, Зун-Мурино. 23.IV—27.VIII, 34 экз.

92. *A. (Celia) laevicollis* Maklin, 1877*

Распространение. Юг Сибири от Алтая до Забайкалья. МНР.

Материал. Иркутская обл.: Сахюрта (Приольхонье), 15.VII 1972 (Прохорова), 2 экз.

93. *A. (Celia) praetermissa* (C. R. Sahlberg, 1827)*

Распространение. Европ. ч. СССР, Кавказ, Сибирь до Камчатки, на юг до Прибайкалья. Сев. и Ср. Европа, север МНР.

Материал. Иркутская обл.: Бирит, Быстрая, Слюдянка, Тибельти. Бурятская АССР: Бабушкин, Улан-Удэ, 21.VI—24.VIII, 6 экз.

94. *A. (Celia) quenseli* Schoenherr, 1806

Распространение. Голаркт. Север европ. ч. СССР, Кавказ, Сибирь до Камчатки, на юг до Прибайкалья, Забайкалья. Сев. Европа, на юге в горах, Сев. Америка.

Материал. Иркутская обл.: Большая Глубокая, Большие Коты, Вдовино, Иркутск, Мальта, Моты, о-в Ольхон. Бурятская АССР: р. Белый Иркут, Зун-Мурино, оз. Щучье. 2.V—24.IX, 58 экз.

95. *A. (Celia) saginata* Menetries, 1847*

Распространение. Описан из Туркмении. По данным Ф. Хике (Hieke, 1973) распространен от Забайкалья до Польши.

Материал. Бурятская АССР: Монды, VII 1974 (Хике), 1 экз.?

96. *A. (Leiocnemis) solskyi* Heyden, 1881

Solsky, 1875 — Култук (как *Leiocnemis rotundicollis* Sols).

Распространение. Юг Сибири от Алтая до Приамурья.

Материал. Бурятская АССР: Зун-Мурино, в подстилке березового и смешанного лесов, в ивняках, 30.V—6.IX 1974 (Шиленков), 65 экз.; там же, 29.V—14.VI 1975 (Шиленков), 25 экз.; Ильинка, в смешанном березняке, 22.V—14.VI 1975 (Шиленков, Воинков), 6 экз.

97. *A. (Bradytus) distinguenda* A. Morawitz, 1862*

Распространение. Прибайкалье, Забайкалье, Приамурье.

Материал. Бурятская АССР: Зун-Мурино, на краю поля овса, 1.IX 1975 (Шиленков), 4 экз.

98. *A. (Bradytus) glacialis* Mannerheim, 1853*

Распространение. Север Сибири от Красноярского края до Магаданской обл., Камчатки, на юге в горах Прибайкалья. Север Сев. Америки.

Материал. Бурятская АССР: верховья р. Саган-Хар (Китойские Альпы), 15.VII 1873 (Чекановский), 1 экз., р. Тисса, 6.VI 1913 (Родионов), 2 экз., устье р. Сорока, 1.VI 1913 (Родионов), 1 экз., гольц Тубота (Тункинские Альпы), 20.VII 1974 (Хике), 3 экз.

99. *A. (Bradytus) irkutensis* Baliani, 1934

Распространение. Описан из верховий Иркутта. Обитает в степных районах Прибайкалья, Забайкалья. МНР.

Материал. Бурятская АССР: оз. Щучье, 17.VIII 1971 (Лукина), 3 экз.

100. *A. (? Bradytus) minuta* Motschulsky, 1844

Распространение. Приамурье, Приморье, на запад до Прибайкалья. Сев.-Вост. Китай, Корея, Япония.

Материал. Бурятская АССР: Зун-Мурино, VII 1974 (Хике), 1 экз., там же, 29.VII—30.VIII 1975 (Шиленков), 5 экз., голец Тубота (Тункинские Альпы), 20.VII 1974 (Хике), 53 экз.

101. *A. (Bradytus) pallidula* Motschulsky, 1844

Распространение. Прибайкалье, Забайкалье, Приамурье, Приморье. Восток МНР, Сев.-Вост. и Сев. Китай.

Материал. Бурятская АССР: Зун-Мурино, на песчаном пляже в корнях травы, 27.VII—3.IX 1974 (Шиленков), 17 экз., там же 29.VII 1975 (Шиленков), 2 экз.

102. *A. (Bradytus) reitteri* Tschitscherine, 1894

Распространение. Прибайкалье, Забайкалье. Север МНР. Описан из Прибайкалья. Нами не найден.

103. *A. (Amathitis) microdera* Chaudoir, 1844

Распространение. От Алтая до Забайкалья и степей Якутии. МНР, Сев. Китай. Указание *A. cordata* Putz. для Прибайкалья (Шиленков, 1974) относится к этому виду.

Материал. Иркутская обл.: Мальта. Бурятская АССР: р. Армак (приток Джиды), Зун-Мурино, Новоселенгинск, Таежный. 16.V—3.IX, 214 экз.

104. *A. (Amathitis) parvicollis* Gebler, 1833*

Распространение. Предкавказье, Нижнее Поволжье, Казахстан, Алтай, Прибайкалье, Забайкалье.

Материал. Иркутская обл.: Вдовино, Иркутск, Оёк. Бурятская АССР: Улан-Удэ. 9.V—8.IX, 39 экз.

105. *A. (Amathitis) subplanata* Putzeys, 1866*

Распространение. Красноярский край, Прибайкалье, Забайкалье, Якутия, Приамурье. МНР, Сев.-Вост. Китай.

Материал. Иркутская обл.: Мальта, на солонцах, 23.VI 1908 (Смирнов), 8 экз., ЗИН.

106. *A. (Percosia) equestris* (Duftschmid, 1812)*

Распространение. Европ. ч. СССР, Кавказ, Казахстан, Ср. Азия, Сибирь до Прибайкалья, Европа, кроме Крайнего Севера и юга

Материал. Иркутская обл.: Вдовино, Иркутск. Бурятская АССР: Ильинка, Танхой. 2.V—30.VIII, 35 экз.

107. *Curtonotus aulicus* (Panzer, 1797)*

Распространение. Европ. ч. СССР, Кавказ, горы Ср. Азии, Сибирь до Прибайкалья. Сев. и Ср. Европа, завезен в Сев. Америку. Материал. Иркутская обл.: Иркутск, 15.V 1971 (Шиленков), 1 экз., Бурятская АССР: Ильинка, в зарослях кустарников, 4—6.VI 1975 (Воинков), 1 экз.

108. *C. irkuteanus* (Jedlicka, 1957)

Описан из Прибайкалья (долина Иркуты). Известен также с Алтая, из МНР. Нами не найден.

109. *Ophonus (Metophonus) cordatus* Duftschmid, 1812*

Распространение. Средняя полоса и юг европ. ч. СССР, Кавказ, Казахстан, Туркмения, Сибирь до Прибайкалья. Ср. и Южн. Европа, Сев. Африка (Алжир), Мал. Азия. Материал. Иркутская обл.: Иркутск, Тараса, Троицк, Усть-Ордынский, Харат. 7.VI—7.VIII, 7 экз.

ПО. *O. (Metophonus) hystrix* Reitter, 1894

Распространение. Прибайкалье, Забайкалье. МНР. Описан из долины Иркуты и севера МНР.

111. *O. (Metophonus) stricticollis* Tschitscherine, 1893*

Распространение. Прибайкалье, Забайкалье, Приамурье. Север МНР. Материал. Иркутская обл.: Жердовка, 28.VIII 1912 (Родионов), 1 экз., ЗИН.

112. *Harpalus (s. str.) amplicollis* Menetries, 1848

Распространение. Юго-восток европ. ч. СССР, Кавказ, Казахстан, Сев. Туркмения, Сибирь до Забайкалья. МНР, Сев. и Зап. Китай. Материал. Бурятская АССР: оз. Щучье, 17—19.VIII 1971 (Лукина), 3 экз.

113. *H. (s. str.) ellipticus sushkini* Lutshnik, 1933*

Распространение. Подвид *sushkini* распространен на юге Сибири от Алтая до Забайкалья. МНР. Номинативный подвид обитает в Южн. Приуралье, Казахстане, Ср. Азии. Материал. Иркутская обл.: Сахюрта (Приольхонье), вострещовая степь, 30.VI—16.VII 1972 (Прохорова), 4 экз.

114. *H. (s. str.) lederi* Tschitscherine, 1898

Распространение. Описан из Прибайкалья, найден также в Магаданской обл. Материал. Иркутская обл.: Большие Коты, 15.VI 1972 (Шиленков), 1 экз. Бурятская АССР: Монды, гора Хулугайша, 2500 м над ур. м., 20—30.VII 1973 (Шиленков), 1 экз.

115. Н. (s. str.) luteicornis Duftschmid, 1812

Распространение. Европ. ч. СССР, Кавказ, Казахстан, Сибирь до Прибайкалья. Сев. и Ср. Европа.

Материал. Иркутская обл.: Иркутск, 16.V 1971 (Шиленков), 1 экз. Бурятская АССР: Ильинка, смешанный березняк, II—18.VI 1975 (Шиленков), 1 экз.; там же, 21—28.VII 1975 (Воинков), 2 экз.

116. Н. (s. str.) modestus Dejean, 1826

Reitter, 1900 — Иркутск.

Распространение. Юг европ. ч. СССР, Кавказ, Казахстан, юг Сибири до Приморья. Ср. и Южн. Европа.

Материал. Иркутская обл.: Иркутск, 19.VI—14.VIII 1912 (Родионов), 4 экз.; там же, 9.IV 1972 (Берлов), 1 экз.; Вдовино, 2.V 1972 (Шиленков), 6 экз. Бурятская АССР: Зун-Мурино, 1.IX 1975 (Шиленков), 2 экз.

117. Н. (s. str.) nigrans A. Morawitz, 1862*

Распространение. От Прибайкалья до Приморья.

Материал. Иркутская обл.: Иркутск, Мальта, Московское, Оёк, Усть-Ордынский. Бурятская АССР: Аршан, 8.V—7.VIII, 26 экз.

118. Н. (s. str.) nigritarsis C. R. Sahlberg, 1817

Reitter, 1900 — долина Иркуты.

Распространение. Север европ. ч. СССР (Кольский п-ов, Полярный Урал), Сибирь (восточные пределы распространения не выяснены), горы Прибайкалья. Сев. Америка от Аляски до Ньюфаундленда.

Материал. Бурятская АССР: Монды, гора Хулугайша, 1600—2700 м над ур. м., в высокогорной тундре и в заболоченных лиственничниках, 20—30.VII 1973, 23.VI—1.VII 1974 (Шиленков), 9 экз.; перевал Нуху-Дабан в верховьях Иркуты, 2400 м над ур. м., 8—15.VI 1915 (Родионов), 2 экз.; оз. Сусер-Нор (верховья Иркуты), 13.VI 1915 (Родионов), 3 экз.

119. Н. (s. str.) obesus A. Morawitz, 1862

Распространение. От Красноярского края до Прибайкалья, Забайкалья, Якутии, Магаданской обл., Приамурья, Приморья. Север МНР, север Кореи.

Материал. Иркутская обл.: Ангасолка, Култук, Маритуй, Тибельти. Бурятская АССР: Зун-Мурино, Монды. 26.V—18.VIII, 13 экз.

120. Н. (s. str.) rufiscapus Gebler, 1833

Распространение. Сибирь от Алтая и Красноярского края до Прибайкалья, Забайкалья, Якутии. Север МНР.

Материал. Иркутская обл.: Еланцы, Иркутск, Усолье-Сибирское. Бурятская АССР: Ильинка, Монды, Орлик, Таежный, Хара-Хужир, оз. Щучье. 30.IV—6.VIII, 33 экз.

121. Н. (s. str.) sinuatus Tschitscherine, 1893

Распространение. Красноярский край, Тувинская АССР, Прибайкалье, Забайкалье, Якутия, Приамурье. МНР, Сев.-Вост. Китай.

Материал. Иркутская обл.: Вдовино, Иркутск, Листвянка, Мальта, Пивовариха, Усть-Ордынский. Бурятская АССР: Аршан, Зун-Мурино. 12.VI-9.VIII, 25 экз.

122. *H. (s. str.) smaragdinus* Duftschmid, 1812

Распространение. Европ. ч. СССР, Кавказ, Казахстан, Ср. Азия, Сибирь до Забайкалья. Вся Европа, кроме Крайнего Севера, Передн. Азия, север МНР.

Материал. Иркутская обл.: верховья р. Белая, 1873 (Гартунг), 1 экз., ЗИН.

123. *H. (s. str.) tirridoides* Reitter, 1900

Распространение. Прибайкалье, Забайкалье, Якутия, Приморье, Приморье. Север МНР, Япония (Хоккайдо).

Материал. Иркутская обл.: Большие Коты, Иркутск, Култук, о-в Ольхон, Тибельти.

Бурятская АССР: Бабушкин, Кырен, Монды, Орлик, р. Сорока, Торы. 25.V-37.VIII, 30 экз.

124. *H. (Haploharpalus) froelichi* Sturm, 1818

Mandl, 1931—Улан-Удэ.

Распространение. Европ. ч. СССР, Кавказ, Казахстан, Ср. Азия, Сибирь до Забайкалья, Якутии, Приморья. Центр. Европа, МНР, Сев. Китай.

Материал. Иркутская обл.: Балаганск, Вдовино, Жердовка, Иркутск, Мальта, о-в Ольхон, Пивовариха, Усолье-Сибирское, Харат. Бурятская АССР: Новоселенгинск, Таежный. 2.V-27.VIII, 25 экз.

125. *H. (Hypsinephus) lumbaris* Mannerheim, 1825

Mandl, 1931—Улан-Удэ.

Распространение. Красноярский край, Тувинская АССР, Прибайкалье, Забайкалье. Запад МНР, Сев. Китай.

Материал. Иркутская обл., западное побережье Байкала возле о-ва Ольхон: бухта Сахюрта, вострещовая степь, 21-25.VII 1972 (Прохорова), 2 экз., бухта Уланур, степной склон, 2.VIII 1974 (Шиленков), 1 экз.

126. *H. (Hypsinephus) salinus* Dejean, 1829*

Распространение. Степи Заволжья, Казахстан, Ср. Азия, Сибирь до Забайкалья. МНР, Сев.-Зап. Китай. Указан для Тибета, Гималаев.

Материал. Иркутская обл., Иркутск, о-в Ольхон. Бурятская АССР: Зун-Мурино, Монды, Новоселенгинск, оз. Щучье. 28.VI-28.VII, 25 экз.

127. *H. (Phygas) microcephalus* Faldermann, 1849*

Распространение. Вост. Казахстан, Алтай, Тувинская АССР, Прибайкалье, Забайкалье. МНР, Китай (Синьцзян, Цинхай, Ганьсу).

Материал. Бурятская АССР: Новоселенгинск, 22.VII 1899 (Корольков), 1 экз., ЗИН.

128. *Harpalobrachys leiroides* (Motschulsky, 1844)

Распространение. Сев. Приуралье, Сибирь до Прибайкалья, Забайкалья, Якутии, Магаданской обл., Приамурья, Сахалина. Север Сев. Америки.

Материал. Иркутская обл.: Суховская. Бурятская АССР: Зун-Мурино, Тунка, Торы, Улан-Удэ. 28.VI—29.VII, 21 экз.

129. *Bradycellus (Tachycellus) glabratus* Reitter, 1849

Распространение. Описан из долины Иркуты. Пока известен только из Прибайкалья. К этому же виду относится указание *Asiraipus limbatus* Gebl. для Прибайкалья (Шиленков, 1974).

Материал. Иркутская обл.: падь Большая Кадильная (Байкал), Большие Коты, Быстрая, Выдрино, Урик. Бурятская АССР: Зун-Мурино, Ильинка. 19.V—6.IX, 39 экз.

130. *B. (s. str.) collaris* (Paykull, 1798)*

Распространение. Европ. ч. СССР, Кавказ, Казахстан, Сибирь до Прибайкалья. Вся Европа, кроме тундры.

Материал. Иркутская обл.: Выдрино, 4.VII 1974 (Воинков), 1 экз.

131. *B. (? subg.) bradycelliformis* Reitter, 1900

Распространение. Описан из долины Иркуты, известен также из МНР.

Материал. Бурятская АССР: Монды, заиленный берег озера, 20—30.VII 1973 (Шиленков), 2 экз.

132. *Trichocellus parallelus* Reitter, 1894

Reitter, 1900—Иркутск, Mandl, 1931—Улан-Удэ.

Распространение. Прибайкалье, Забайкалье, Якутия.

Материал. Иркутская обл.: Иркутск (Яковлев), 15 экз.; там же, 23.IV 1905 (Юринский), 1 экз.; там же, 11.IV—17.V 1970 (Берлов), 2 экз., Усть-Ордынский, 7.VIII 1912 (Родионов), 1 экз.

133. *Oreoxenus mannerheimi* R. F. Sahlberg, 1844

Распространение. Север европ. ч. СССР (Кольский п-ов), Сибирь до Якутии, Магаданской обл., на юг до Прибайкалья. Горы Центр. Европы, север МНР, Сев. Америка.

Материал. Бурятская АССР: Монды, гора Хулугайша, 23.VII 1973 (Шиленков), 1 экз., Таежный, 25.VI 1975 (Воинков), 1 экз.

134. *Callistus lunatus* (Fabricius, 1775)*

Распространение. Средняя полоса и юг европ. ч. СССР, Кавказ, Казахстан, горы Ср. Азии, Алтай, Прибайкалье. Ср. и Южн. Европа, Передн. Азия.

Материал. Иркутская обл.: верховья р. Белая, 1873 (Гартунг), 44 экз., ЗИН.

135. *Badister bipustuiatus* (Fabricius, 1792)

Распространение. Европ. ч. СССР, Кавказ, Казахстан, Сибирь до Забайкалья, Прибайкалья, Приамурья, Приморья, Курил (Кунашир). Европа, Сев.-Зап. Африка, Иран.

Материал. Иркутская обл.: Иркутск, Выдрино. Бурятская АССР: Ильинка, 26.IV—11.VII, 6 экз.

136. *B. peltatus* (Panzer, 1796)*

Распространение. Европ. ч. СССР, Кавказ, Казахстан, Ср. Азия, Сибирь до Прибайкалья. Вся Европа, кроме севера, Сев.-Зап. Африка, Иран.

Материал. Иркутская обл.: Иркутск (Яковлев), 1 экз., ЗИН.

137. *Masoreus wetterhali* (Gyllenhal, 1813)*

Распространение. Европ. ч. СССР, Кавказ, Казахстан, Сибирь до Прибайкалья и Забайкалья. Вся Европа, кроме севера, Сев. Африка, Мал. Азия.

Материал. Иркутская обл.: Бирит, 7.VIII 1974 (Шиленков), 1 экз.

138. *Apristus striatus* (Motschulsky, 1844)*

Распространение. Сибирь от Прибайкалья до Приамурья и Приморья, Магаданской обл. Япония.

Материал. Иркутская обл.: Пивовариха, на дороге, 15.VII 1973 (Шиленков), 1 экз.

139. *Cymindis* (s. str.) *angularis*, 1810

Распространение. Сев. и ср. полоса европ. ч. СССР, Казахстан, Сибирь до Прибайкалья. Сев. Европа, на юге в горах.

Материал. Бурятская АССР: Бабушкин, 24.VIII 1971 (Лукина), 1 экз.

140. *Cymindis* (Menas) *faldermanni* Gistel, 1832

Распространение. Юг европ. ч. СССР, Казахстан, Призайсанье, Алтай, юг Красноярского края, Прибайкалье, Забайкалье, Якутия. МНР, Сев. Китай (Ганьсу).

Материал. Иркутская обл.: Еланцы, 1.VIII 1974 (Шиленков), 1 экз., Мальта, 13.VI 1907, 28.VI 1908 (Смирнов), 2 экз.

141. *C. (Tarsostinus) equestris* Gebler, 1825

Распространение. Нижнее Поволжье, Казахстан, Сибирь до Забайкалья. Запад МНР, Китай.

Материал. Иркутская обл.: Еланцы, на берегу солоноватого озера, 1.VIII 1974 (Шиленков), 10 экз.

ЛИТЕРАТУРА

Баллион Э. Э. Список жесткокрылых в окрестностях г. Иркутска. — «Известия о-ва любителей естествознания, антропологии и этнографии», 1870, т. 8, в. 1, с. 233—236.

Семенов-Тянь-Шанский А. П. Несколько бионимических соображений по поводу видовой застава представителей подсемейства Cicindelinae (Coleoptera, Carabidae) в фауне западного Прибайкалья. — «Русск. энтомол. обозр.», 1908, т. 8, в. 3—4, с. 305—311.

Шиленков В. Г. Фауна жужелиц (Coleoptera, Carabidae) юго-западного Прибайкалья. — Фауна насекомых Восточной Сибири и Дальнего Востока. Изд. Иркутского ун-та, 1974. с. 42—76.

Csiki E. Carabidae 1. — Junk et Schenkling Coleopterorum Catalogue. Berlin, 1927. 1648 S.

Habu A. On the seven species of Europhilus, the subgenus of Agonum, from Ja-

pan (Coleoptera, Carabidae). — «Bull. Nat. Inst. Agric. Sci., 1963, ser. C, V, 16, p. 135—150.

Hieke F. Ergebnisse der zoologischen Forschungen von Dr. Z. Kaszab in der Mongolei. 291. Die Amara-Arten der Mongolei (Coleoptera, Carabidae). — «Rovart. Kosl.», 1972, B. 25, L. 2, S. 413—443.

Hieke A. Beitrag zur Synonymie der palaarktischen Amara-Arten (Coleoptera, Carabidae). — «Deutsch. entom. Zeit.», 1973, B. 20, H. 1—3, S. 1—125.

Jedlicka A. Neue Carabiden aus der palaarktischen Region (Coleoptera). — «Acta Ent. Mus. Nat. Praga», 1957, B. 31, H. 473, S. 91—101.

Jedlicka A. Neue Carabiden aus der palaarktischen Region (Coleoptera). — «Acta Ent. Mus. Nat. Praga», 16 1961, B. 34, H. 584, S. 155—166.

Jedlicka A. Monographic des Tribus Pterostichini aus Ostasien (Coleoptera, Carabidae). — «Entomol. Abh. Ber. Staatl. Mus. Tierk. Dresden», 1962, B. 26, H. 21, S. 177—346.

Jedlicka A. Monographic des Tribus Bembidiini aus Ostasien (Coleoptera, Carabidae). — «Entomol. Abh. Ber. Staatl. Mus. Tierk. Dresden», 1965, B. 32, H. 7, S. 79—198.

Jedlicka A. Carabidae. II. Ergebnisse der zoologischen Forschungen von Dr. Kaszab in der Mongolei (Coleoptera). — «Reichenbachia», 1966, B. 7, H. 23, S. 205—223.

Jedlicka A. Ergebnisse der I. mongolisch-tschechoslowakischen entomologisch-botanischen Expedition in der Mongolei. N 4. Coleoptera — Carabidae. — «Acta faunist. entomol. Mus. Nat. Praga», 1967a, B. 12, H. 115—133, S. 103—114.

Jedlicka A. Carabidae der III. Expedition. Ergebnisse der zoologischen Forschungen von Dr. Z. Kaszab in der Mongolei (Coleoptera). — «Reichenbachia», 1967b, B. 9, H. 3, S. 25—43.

Jedlicka A. Carabidae der IV. Expedition. Ergebnisse der zoologischen Forschungen von Dr. Z. Kaszab in der Mongolei (Coleoptera). — «Reichenbachia», 1968, B. 11, S. 115—151.

Mandl K. Systematische Zusammenstellung einer Sammelausbeute aus Transbaicalien und dem Ussurgebiete. — «Wien. Entomol. Ztg.», 1931, B. 48, H. 1, S. 1—28.

Mandl K. Vorarbeiten für eine monographische Neubearbeitung der palaarktischen Cicindeliden. Revision der *Cicindela hybrida*-Gruppe. 1. Teil. — «Arb. morf. taxon. Ent. Berlin-Dahlem», 1935, B. 2, H. 4, S. 283—306. r

Mandl K. Cicindelidae und Carabidae (Coleoptera). VI. Ergebnisse der zoologischen Forschungen von Dr. Kaszab in der Mongolei. — «Faunist. Abh. Staatl. Mus. Tierk. Dresden», 1973, B. 4, H. 8, S. 61—68.

Motschulsky V. Insectes de la Siberia rapportes d'un voyage fait en 1839—1840. — «Mem. Acad. St.-Peterb.», 1844, t. 13, p. 1—274.

Reitter E. Carabidae. Harpalini und Licini. — Bestimmungstabelle der europäischen Coleopteren, 51. 1900, S. 33—155.

Solsky S. Coleopteres de la Siberia orientale. — «Horae Soc. Ent. Ross», 1871, t. 7, p. 334—406.

Solsky S. Materiaux pour l'entomographie des provinces asiaticques de la Russie. — «Horae Soc. Ent. Ross.», 1875, t. 11, p. 253—299.