

*Dorcadion shirvanicum* Bogachev, 1934, stat. rev. = *D. azerbaijdzhanicum* Plavilshchikov, 1937, syn. n. (Coleoptera, Cerambycidae) — 69 ♂, 22 ♀, Азербайджан, Вост. Кобыстан, долина р. Сумгаит у пос. Перекишкюль, 24.04.1986 (Хвыля). Часть самок собранной серии (12) оказались полностью лишенными опушения, т. е. представляли собой новую, неизвестную ранее у этого вида голую форму, весьма обычную у близких *D. talyshense* Gang. и *D. laeve* Fald. Голые самки *D. azerbaijdzhanicum* отличаются от опущенных еще и редкой пунктировкой темени и переднеспинки, на центральных участках переднеспинки пунктировка обычно совсем отсутствует. Как показало сравнение с типом, такая самка была описана А. В. Богачевым (1934) как *D. mniszehi shirvanica* и рассматриваемый вид должен называться *D. shirvanicum* — он распространен в Восточном Азербайджане по крайней мере до Шемахи, откуда Богачев располагал одним экземпляром. — М. Л. Данилевский (Институт эволюционной морфологии и экологии животных им. А. Н. Северцова АН СССР, Москва), С. И. Хвыля (Институт питания АМН СССР, Москва).