

# РУССКОЕ ЭНТОМОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНІЕ,

ОСНОВАННОЕ

Д. К. Глазуновыиъ, Н. Р. Кокуевыиъ, Н. Я. Кузнецовыиъ, А. П. Семеновыиъ-  
Тянъ - Шанскимъ, Т. С. Чичериныиъ, Н. Н. Ширяевыиъ и А. И. Яковлевыиъ.

ИЗДАВАЕМОЕ

Русскимъ Энтомологическимъ Обществомъ

подъ редакціей

В. В. Редикорцева.

## Revue Russe d'Entomologie,

FONDÉE PAR

D. Glazunov, A. Jakovlev, N. Kokujev, N. Kusnezov, A. Semenov-Tian-Shanskij  
N. Shirlajev et T. Tshitsherin.

PUBLIÉE PAR

la Société Entomologique de Russie.

Rédacteur

V. Redikorzev.

1915.

т. XV.



Петроградъ. — Petrograd.

Типографія Кюгельгенъ, Гличъ и Ко., Екатерингофскій пр., 87.

1916.

Г. Л. Суворовъ (Петроградъ).

Новые роды и виды жесткокрылыхъ (Coleoptera, Curculionidae и Cerambycidae) палеарктической области.

G. L. Suvorov (Petrograd).

Genres nouveaux et espèces nouvelles des Coléoptères paléarctiques (Curculionides et Cérambycides).

**Myllocerus satunini**, sp. n.

Этотъ новый видъ весьма схожъ по строенію тѣла съ *M. benignus* Fst. (Bestimm.-Tab., LVIII. Heft: *Ptochus* Schön., bearbeitet von Edmund Reitter, p. 245), отличаясь отъ него окраскою тѣла и ногъ, которая обусловлена маленькими, другъ къ другу прилегающими, ланцетовидно-обрѣзанными чешуйками зеленовато-желтоватаго цвѣта.

♂. Хоботъ почти квадратный, боковыя стороны его кпереди едва суживающіяся, вершина прямо обрѣзанная, съ глубокимъ треугольнымъ вдавленіемъ. Усиковыя ямки глубокія, сильно ребристыя. Глаза большіе, круглые, сильно выпуклые, очень близко стоящіе къ переднему краю переднеспинки. Усики крѣпкіе, толстые, съ первымъ членикомъ почти равнымъ по длини второму, 3-їй и 4-ый вмѣстѣ взятые составляютъ длину 2-го; остальные поперечные; булава темная, вершина ея свѣтлая. Переднеспинка поперечная, почти квадратная, съ переднимъ краемъ прямо обрѣзаннымъ; задній край ея сильно двувыемчатый, боковыя стороны почти параллельныя, только по срединѣ едва расширенныя. Щитокъ большой, сильно выпуклый, густо одѣтый чешуйками зелено-желтоватаго цвѣта. Отъ заднихъ угловъ переднеспинки, которые плотно прилегаютъ къ двувыемчатому основанію надкрылій, надкрылья склонены, съ правильно закругленными плечами; боковыя ихъ стороны нѣсколько сдавленныя тотчасъ за закругленными плечами, далѣе почти параллельныя и у вершины широко закругленныя. Бороздчатость надкрылій очень тонкая и глубокая. Ноги достаточно крѣпкія и толстые. Длина съ хоботомъ, 6, шир. 2,5 мм.

Закавказье: рѣка Араксъ, пость Буруланъ (4. VI. 1911, К. А. Сатунинъ! Колл. Семенова-Тянъ-Шанскаго).

*Mylocerus viridiaureus*, sp. n., и *M. Jacobsoni*, sp. n.

1(2). Вся верхняя, какъ и нижня сторона въ густыхъ маленькихъ, почти круглыхъ и ярко-зелено-металлическихъ чешуйкахъ. ♂. Хоботъ короткій, совсѣмъ квадратный, плоскій, со срединнымъ тонкимъ килькомъ, тонко пунктированный; лобъ съ удлиненной, глубокой ямкой. Профильная линія лба и хобота замѣтно выгнутая и въ мѣстѣ перехода лба въ хоботъ надломленная. Глаза большіе, круглые, сильно выпуклые; разстояніе между центрами ихъ равное ширинѣ переднеспинки по срединѣ. Голова большая, темя сильно выпуклое, шея короткая, параллельно-сторонняя. Усики удивительно длинные и тонкіе; стержень ихъ сильно выгнутый, длиной въ 2 мм.; всѣ членики вмѣстѣ съ булавою 5 мм., итого общая длина усиковъ 7 мм., тогда какъ длина тѣла вмѣстѣ съ хоботомъ всего лишь 5 мм. Первый членикъ усиковъ самый длинный, въ  $1\frac{1}{2}$  раза длиннѣе 2-го, остальные пять равные между собою, по длини равные  $\frac{3}{4}$  длины 2-го. Булава тонкая, состоящая изъ трехъ члениковъ; первые два затемненные, послѣдній заостренный и свѣтлый; стержень усиковъ и его членики темновато-красноватые. Переднеспинка квадратная, съ переднимъ краемъ нѣсколько округленнымъ; задній край ея прямо обрѣзанный; боковыя стороны слабо расширенно-закругленныя, съ наибольшою шириной по срединѣ; поверхность ея плоская, очень тонко пунктированная. Щитокъ маленький, треугольный, на вершинѣ острый, въ густыхъ зеленоватыхъ чешуйкахъ. Надкрылья съ основаніемъ равнымъ основанію переднеспинки, съ прямоугольно-закругленными плечами, параллельно-стороннія, глубоко точечно-бороздчатыя; ямки бороздокъ представляющіяся въ видѣ непрерывной цѣпочки. Ноги очень длинныя, тонкія, черныя, достаточно густо покрытыя зелеными чешуйками. Всѣ бедра передъ вершиною глубоко, широко и округленно вырѣзанныя, съ очень маленькими зубчиками на концѣ расширенной части бедра. Тарзы всѣхъ ногъ красноватыя, въ особенности третій членикъ ихъ и коготокъ. — ♀ совсѣмъ схожая съ ♂, имѣеть усики также очень длинные: стержень тоже 2 мм., членики усиковъ съ булавою въ 4 мм. Надкрылья съ основаніемъ равнымъ основанію переднеспинки, съ прямоугольно широко-закругленными плечами, откуда боковыя стороны до  $2\frac{2}{3}$  длины надкрылій, считая отъ основанія, постепенно прямолинейно расширяющіяся и имѣющія здѣсь наибольшую ширину, далѣе постепенно закругленно суживающіяся и на вершинѣ широко закругляющіяся. ♂ дл. вмѣстѣ съ хоботомъ 5, шир. 2 мм.; ♀ дл. 6,5, шир. 3,2 мм.

Уссури: Иманъ (12. VI. 1899, А. И. Кирилловъ); Уссурійская жел. дор., ст. Вяземская (А. И. Кирилловъ).

*M. viridiaureus* (Reitter), sp. n.

2 (1). Весьма схожъ съ предыдущимъ видомъ, но имѣть очень короткіе усики. Вся верхняя, какъ и нижняя сторона въ маленькихъ, почти круглыхъ зелено-металлическихъ чешуйкахъ. Хоботъ очень короткій, почти вдвое короче своей ширины у основанія, параллельно-сторонній, съ глубокимъ и широкимъ продольнымъ вдавленіемъ. Лобъ глубоко вдавленный. Глаза значительно меньшіе, сильно выпуклые. Темя плоское, голова меньшая; шея много длиннѣе, бока ея параллельно-сторонніе. Усики очень маленькие, чуть не вдвое тоньше чѣмъ у предыдущаго вида, свѣтло-желтые, только послѣдніе два вершинные ихъ членика и булава затемненные; общая длина усиковъ 3 мм., 1-ый членикъ въ  $1\frac{1}{4}$  раза длиннѣе 2-го, остальные пять равной длины, вдвое короче 2-го. Переднеспинка поперечная, вдвое шире своей длины; передній край ея прямо обрѣзанный, задній въ  $1\frac{1}{2}$  раза шире передняго. Боковыя стороны въ задней половинѣ параллельно-стороннія, отсюда постепенно закругленно-суживающіяся къ переднему краю. Поверхность переднеспинки очень тонко пунктированная, въ профиль слабо выпуклая. Щитокъ треугольно - заостренный, очень большой, оголенно-темный. Надкрылья съ основаніемъ равнымъ основанію переднеспинки, съ прямоугольно и широко закругленными плечами, съ боковыми краями параллельно-сторонними, передъ вершиной закругленно-суженныя; глубоко точечно-бороздчатыя; ямки бороздокъ представляющія непрерывную цѣпочку; промежутки надкрылій съ рядомъ очень короткихъ, едва различимыхъ, нѣсколько оттопыренныхъ щетинокъ. Ноги болѣе короткія и болѣе крѣпкія, красновато-бурыя. Голени у вершины слабо округленно-вырѣзанныя; маленькие зубцы на вершинахъ расширенныхъ частей голеней отсутствуютъ.— ♀ совсѣмъ схожа съ ♂, только надкрылья отъ правильно закругленныхъ плечъ постепенно, по прямой линіи, расширяющіяся до  $\frac{2}{3}$  отъ основанія надкрылій, имѣя здѣсь наибольшую ширину и правильно закругленно суживаясь на вершинѣ, широко закругленныя. ♂ дл. вмѣстѣ съ хоботомъ 6, шир. 2 мм.; ♀ дл. 6,5, шир. 4 мм.

Амуръ: Малый Хинганъ, рѣка Листвянная, притокъ рѣки Хинганъ (VI. 1911, Н. Е. Радкевичъ!); Приморская обл.: полуостровъ Сидеми (VI. 1901, Г. Л. Суворовъ!); Южно-Уссурійскій край: село Спасское, Одарковскій заводъ (18—20. VI. 1911, А. И. Черскій!).

M. jacobsoni, sp. n.

*Mylocerinus seistanicus*, sp. n.

♂. Хоботъ кпереди замѣтно суживающійся, при чѣмъ длина его равна ширинѣ основанія, съ яснымъ срединнымъ килемъ; поверхность его тонко пунктированная; одѣтая маленькими круглыми зеленоватыми чешуйками. Лобъ плоскій, профильная линія лба и хобота прямая. Глаза большіе, круглые, слабо выпуклые. Усики крѣпкіе, длинные, густо

покрыты зеленоватыми чешуйками; первый членикъ ихъ въ  $1\frac{1}{2}$  раза длиннѣе 2-го; остальные равной длины, вдвое короче 2-го; булава свѣтлая. Переднеспинка почти квадратная, цилиндрической формы; передній край ея прямо обрѣзанный, задній сильно двувыемчатый; поверхность ея плоская, тонко пунктированная, густо одѣтая зеленоватыми чешуйками. Щитокъ кнопковидной формы, густо покрытый чешуйками. Надкрылья цилиндрической формы, очень узкія, глубоко точечно-бороздчатыя; поверхность ихъ въ густыхъ зеленыхъ чешуйкахъ; второй промежутокъ надкрылій почти вдвое шире остальныхъ, бѣловато-зеленоватый, у вершины сливающійся съ шестымъ того же цвѣта, остальные боковые промежутки той же окраски. Въ общемъ этотъ новый видъ очень схожъ съ *M. cylindricollis* Fst. ♂ дл. вмѣстѣ съ хоботомъ 5,5, шир. 2 мм.

Вост. Персія: Сеистанъ, Нейзаръ (20—31. V. 1898, Н. А. Зарудный! Колл. Семенова-Тянъ-Шанскаго).

*Mylocerinus bampurensis*, sp. n.

Схожъ съ предыдущимъ видомъ, только щитокъ у *M. bampurensis* треугольный, на вершинѣ закругленный, и ряды бѣловатыхъ волосковъ на промежуткахъ надкрылій нѣсколько оттопыренные, между тѣмъ какъ у предыдущаго вида они совсѣмъ приглаженные. ♂ дл. вмѣстѣ съ хоботомъ 5,5, шир. 2 мм.

Юго-вост. Персія: окрестности города Бампур (12. IV. 1901, Н. А. Зарудный! Колл. Семенова-Тянъ-Шанскаго).

*Ptochus suvorovi* (Reitter in litt.), sp. n., и *Pt. kozlovi*, sp. n.

1 (2). Хоботъ сильно суженный кпереди, съ тонкимъ, но яснымъ килькомъ; поверхность его плоская; по длини равный своему основанию, тонко пунктированный, въ оттопыренныхъ волоскахъ, замѣтно выгнутый, въ маленькихъ бѣловатыхъ чешуйкахъ. Лобъ плоскій, сильно пунктированный, въ длинныхъ отогнутыхъ назадъ стоячихъ волоскахъ. Профильная линія лба и хобота нѣсколько надломленная. Глаза большіе, круглые, слабо выпуклые. Усики крѣпкие, длинные, съ первымъ членикомъ въ  $1\frac{1}{2}$  раза болѣе длиннымъ, чѣмъ 2-ой; остальные членики одинаковой длины, нѣсколько короче 2-го. Булава темная, вершина ея свѣтлая. Переднеспинка поперечная, достаточно сильно закругленно-расширенная, съ наибольшою шириной по срединѣ; передній край ея прямо обрѣзанный, задній сильно двувыемчатый; основаніе надкрылій по ширинѣ равное ширинѣ заднаго края переднеспинки; поверхность ея грубо и часто пунктированная, со срединной бѣлой расплывчатой полосою; бока ея въ бѣлыхъ чешуйкахъ, остальная поверхность коричневая, въ достаточно длинныхъ и густыхъ оттопыренныхъ впередъ щетинкахъ. Надкрылья овально-

вытянутыя, тонко, но очень ясно пунктированныя, коричневато- пятнистая, съ бѣлыми боками и вершинною частью. Поверхность надкрылій въ очень длинныхъ, сильно оттопыренныхъ и отогнутыхъ назадъ черноватыхъ щетинкахъ.— ♀ имѣеть переднеспинку еще болѣе поперечную, сильно закругленно-расширенную. Надкрылья еще болѣе расширенно-закругленные, съ наибольшею шириной на  $\frac{2}{3}$  длины надкрылій, считая отъ основанія. Поверхность надкрылій слабо пятнистая или однообразно сѣрая. Щетинистость повсюду такая же, какъ у самца. ♂ длина вмѣстѣ съ хоботомъ 5, шир. 2,2 мм.; ♀ дл. 6,5, шир. 3,5 мм.

Сѣв. Монголія: урочище Баипъ-баратэ (12. VI. 1909, эксп. П. К. Козлова! Колл. Семенова-Тянъ-Шанскаго).

*Ptochus suvorovi* (Reitter in litt.), sp. n.

2 (1). Хоботъ, лобъ, темя, глаза и усики такие же, какъ и у предыдущаго вида. Верхняя сторона ярко-зеленаго цвета. ♂. Переднеспинка поперечная, замѣтно въ передней половинѣ суженная кпереди, въ задней половинѣ боковая стороны ея сильно расширенно-закругленные; передній край прямо обрѣзанный, задній сильно двувыемчатый; задніе углы переднеспинки заходящіе на боковыя закругленныя части надкрылій. Все остальное такое же, какъ и у предыдущаго вида; различіе только въ переднеспинкѣ и въ окраскѣ наськомаго. ♂ дл. 5,5, шир. 2,2 мм.; ♀ дл. 6,5, шир. 3 мм.

Алашань: оазисъ Дынъ-юанъ-инъ (17—28. VI. 1908, эксп. П. К. Козлова! Колл. Семенова-Тянъ-Шанскаго).

*Ptochus kozlovi*, sp. n.

*Phyllobius jacobsoni*, sp. n.

♂. Вся верхняя сторона черная, голая, безъ чешуекъ и волосковъ. Хоботъ короткій, толстый, почти квадратный, тонко пунктированный; поверхность его по всей длине вдавленная, образующая острыя краевыя ребра. Усики достаточно крѣпкие, короткіе; основаніе стержня ихъ красноватое, вершина темная, членики красные, булава черная; всѣ членики очень короткіе, почти поперечные; 1-ый въ  $1\frac{1}{2}$  раза длиннѣе 2-го, остальные поперечные. Глаза маленькие, круглые, достаточно выпуклые. Лобъ плоскій, темя достаточно выпуклое, въ такомъ же пунктирѣ какъ и хоботъ. Переднеспинка поперечная, съ длиною равной своему основанію, съ наибольшею шириной по срединѣ, сильно расширенно-закругленная, въ передней половинѣ сильно суженная; передній и задній края ея прямо обрѣзанные; задній край въ  $1\frac{1}{2}$  раза шире передняго; поверхность ея достаточно выпуклая, очень тонко и часто пунктированная, въ такомъ же пунктирѣ какъ хоботъ, голова и темя, съ очень крѣпкимъ и острымъ килемъ; поверхность ея какъ-бы шагреневая. Щитокъ достаточно большой, черный, на

вершинѣ заостренный, очень тонко и часто пунктированный. Надкрылья вдвое шире основанія переднеспинки; длина ихъ вдвое больше ширины; съ правильно закругленными прямоугольными плечами; боковая стороны тотчасъ за плечами нѣсколько сдавленная, далѣе, слабо расширяясь, остающіяся почти параллельными, на  $\frac{2}{3}$  отъ основанія постепенно закругляющіяся и на вершинѣ широко закругленная. Поверхность надкрылій черно-блестящаго цвѣта, въ правильномъ, глубокомъ и частомъ пунктирѣ. Ноги тонкія, черныя, только лапки и вершины всѣхъ бедеръ и голеней красноватыя. ♂ дл. вмѣстѣ съ хоботомъ 4, шир.  $1\frac{1}{2}$  мм.

Енисейская губернія: Иликъ (А. Г. Якобсонъ!).

*Phyllobius kuldzhanus*, sp. n.

♂. Верхняя и нижняя стороны черныя. Хоботъ толстый, квадратный, тонко пунктированный. Усики крѣпкіе, короткіе, свѣтлые, только вершина стержня и булава темныя; первый членикъ нѣсколько длиннѣе второго, остальные поперечные. Глаза круглые, достаточно большие, сильно выпуклые; въ профиль поверхность переднеспинки, темени, лба и хобота представляющая правильную кривую линію, нигдѣ не надломленную. Лобъ, темя и переднеспинка въ очень тонкомъ и частомъ пунктире. Переднеспинка съ длиною равной основанію, сильно закругленно-расширенная, съ наибольшою шириной на  $\frac{1}{3}$  отъ основанія, къ переднему краю сильно суженная; передній и задній края ея прямо обрѣзанные. Надкрылья у ♂ совсѣмъ цилиндрическія, у ♀ едва расширенныя, ясно, глубоко и часто точечно-бороздчатыя, въ очень тонкихъ и рѣдкихъ прилегающихъ волоскахъ. Ноги достаточно крѣпкія, темно-красноватыя. ♂ и ♀ дл. вмѣстѣ съ хоботомъ 5, шир. 2 мм.

Кульджа (на высотѣ 5.000 ф., 14. VI. 1913, Е. Шестоперовъ!).

*Phyllobius davydovi*, sp. n.

♂. Хоботъ короткій, параллельно-сторонній; длина его равная половинѣ ширины основанія; съ широкимъ срединнымъ вдавленіемъ, начинающимся у лба и оканчивающимся на самой вершинѣ. Усики длинные, тонкіе, красноватые; стержень ихъ длинный, сильно выгнутый; первый членикъ по длини равенъ второму, третій вдвое менѣе второго, остальные поперечные; булава темная. Глаза большіе, круглые, сильно выпуклые. Голова небольшая, тонко пунктированная; щеки являющіяся продолженіемъ шеи, которая очень длинна и параллестороння. Переднеспинка поперечная, съ длиною равной ширинѣ основанія, закругленно-расширенная, съ наибольшою шириной на  $\frac{1}{3}$  отъ основанія, сильно выпуклая; передній и задній края ея прямо обрѣзанные; передній широко ошнурованъ; поверхность въ густыхъ ланцетовидныхъ золотистыхъ чешуйкахъ. Надкрылья съ очень большими

правильно закругленными плечами, съ боковыми сторонами параллельными, затѣмъ сильно расширяющіяся, съ наибольшею шириной на  $\frac{2}{3}$  длины, считая отъ основанія, далѣе постепенно суживающіяся къ вершинѣ и на вершинѣ широко закругленныя; тонко точечно-бороздчатыя, въ густыхъ ланцетовидныхъ чешуйкахъ золотистаго цвѣта. Ноги очень длинныя, крѣпкія; голени и лапки красноватыя; бедра темныя, на переднихъ ногахъ очень толстыя, съ большимъ острымъ зубцомъ на вершинѣ, на среднихъ и заднихъ съ зубьями менѣе развитыми. Дл. вмѣстѣ съ хоботомъ 6, шир. 2,5 мм.

Черноморская губернія: Гагры, рѣка Бзыбь (17. V. 1911, С. Давыдовъ!).

*Piazomias semenovi*, sp. n.

♂. Верхняя и нижняя стороны въ очень густыхъ и маленькихъ круглыхъ чешуйкахъ зеленовато- или золотисто-розового цвѣта. Хоботъ короткій, вдвое короче своего основанія, кпереди сильно суженный съ ясною продольною бороздою. Профильная линія лба и хобота представляющаяся замѣтно выгнутой. Усики достаточно крѣпкие, короткіе; стержень и первый членикъ въ зеленоватыхъ чешуйкахъ остальные и булава темные; 2-ой членикъ самый маленький, вдвое короче первого, 3-й замѣтно длиннѣе 2-го, остальные поперечные, постепенно расширяющіяся къ булавѣ; булава темная, вершина ея свѣтлая. Переднеспинка поперечная, шаровидная, съ сильно расширенными боковыми сторонами, съ переднимъ и заднимъ краями прямо обрѣзанными; ширина передняго края ея немного уже ширины задняго. Надкрылья овально-вытянутыя, очень тонко, но ясно растянуто-пунктированныя; ямки бороздокъ, сливаясь, образуютъ сплошную бороздчатую линію. Ноги крѣпкія, достаточно длинныя, въ особенности очень длинная передняя пара съ толстыми булавовидными бедрами. Съ внутренней стороны всѣ голени снабженныя рядомъ бѣловато-золотистыхъ щетинокъ.— ♀ имѣеть переднеспинку менѣе поперечно-расширенную, съ надкрыльями болѣе широко овальными, съ остро-закругленной вершиною. ♂ дл. вмѣстѣ съ хоботомъ 6, шир. 2,5 мм.; ♀ дл. 6,5, шир. 3 мм.

Вѣрненскій уѣздъ: ущелье Сюгатинское, рѣка Чиликъ (28. VI. 1907, А. Г. Якобсонъ! и В. Е. Недзвѣцкій!).

*Piazomias redikorzevi*, sp. n.

♂. Вся верхняя, какъ и нижняя сторона въ сплошныхъ, маленькихъ и круглыхъ молочно-зеленоватаго цвѣта чешуйкахъ. Хоботъ сильно суженный кпереди, плоскій, съ тонкою срединою бороздою, въ  $1\frac{1}{2}$  раза длиннѣе своей ширины у основанія. Лобъ давленный; профильная линія лба и хобота почти прямая. Усики короткіе, крѣпкие; стержень, 1-ый и 2-ой членики ихъ покрыты чешуйками, остальные темные; булава до половины темная, вершина ея свѣтлая; 1-ый

членикъ въ  $1\frac{1}{2}$  раза длиннѣе 2-го, 2-ой и 3-ій одинаковой длины, остальные поперечные. Глаза большіе, круглые, сильно выпуклые. Щитокъ совсѣмъ не различимый. Переднеспинка поперечная, сильно расширенно-зашаровидно вздутая, съ боковыми сторонами сильно закругленными, съ наибольшою шириной по срединѣ; передний и задний края ея прямо обрѣзанные, сильно ошнурованные. Надкрылья овально-вытянутыя, глубоко и растянуто точечно-бороздчатыя. Ноги крѣпкія, длинные, въ особенности передняя пара, съ очень толстыми булавовидными бедрами; всѣ голени на двухъ третяхъ отъ вершины съ внутренней стороны съ рѣдкимъ рядомъ оттопыренныхъ длинныхъ черныхъ щетинокъ. — ♀ имѣеть переднеспинку слабо выпуклую со значительно меныше закругленными боковыми сторонами, съ надкрыльями овально-растянутыми, съ наибольшою шириной по срединѣ, съ остро-закругленной вершиной; ноги менѣе крѣпкія, болѣе короткія; переднія бедра значительно болѣе тонкія. ♂ дл. вмѣстѣ съ хоботомъ 8, шир.  $2\frac{1}{2}$  мм.; ♀ дл. 8, шир. 3 мм.

Семирѣчье: Ала-куль (VI. 1905, А. А. Матисенъ!).

*Piazomias baeskmanni*, sp. n.

♂. Вся верхняя, какъ и нижняя сторона въ густыхъ и круглыхъ бѣловато-розовыхъ чешуйкахъ. Хоботъ замѣтно суженный кпереди, почти квадратный, съ тонкимъ короткимъ срединнымъ килемъ. Лобъ замѣтно выпуклый; профильная линія лба и хобота представляющая замѣтно выпуклую кривую. Усики короткіе, достаточно крѣпкіе, въ бѣлыхъ чешуйкахъ; 1-ый членикъ ихъ почти вдвое длиннѣе 2-го, 2-ой и 3-ій равной длины, остальные поперечные; булава темная. Глаза круглые, большіе, достаточно выпуклые. Щитокъ неразличимый. Переднеспинка сильно закругленно-расширенная, съ наибольшою шириной по срединѣ, достаточно выпуклая; передній край ея прямо обрѣзанный, задній слабо округленно-вырѣзанный; оба очень сильно и глубоко ошнурованные. Надкрылья сильно овально-вытянутыя, очень тонко растянуто - пунктированныя, линейно - пятнистые. Ноги крѣпкія и длинные, въ особенности передняя пара, съ толстыми булавовидными голенями; голени всѣхъ паръ на половинѣ отъ вершины съ рядомъ очень рѣдкихъ тонкихъ щетинокъ. — ♀ имѣеть переднеспинку слабѣе расширенно-закругленную, съ наибольшою шириной по срединѣ, съ надкрыльями такими же, какъ и у ♂, но болѣе широкими. ♂ дл. вмѣстѣ съ хоботомъ 10, шир. 3,5 мм.; ♀ дл. 10, шир. 4 мм.

Сыръ-Дарьинская обл.: Муюнъ-кумъ (17. VII. 1907, Ю. И. Бекманъ!).

*Piazomias bucharicus*, sp. n.

♂. Хоботъ едва суженный кпереди, почти квадратный, плоскій, тонко, но ясно и очень часто пунктированный, съ глубокою средин-

ною бороздой, пролегающей по всему лбу и хоботу до места прикрепления усиковъ. Усики короткие, крѣпкие; стержень и членики ихъ темно-красноватые, булава темная; первый членикъ по длини равный второму, остальные поперечные. Глаза большіе, круглые, сильно выпуклые. Переднеспинка поперечная; длина ея въ  $1\frac{1}{2}$  раза меньше ширины основанія; достаточно выпуклая, расширенно-закругленная, съ наибольшею шириной на  $\frac{1}{3}$  отъ основанія; передній и задній края ея прямо обрѣзанные и сильно ошнурованные; поверхность ея покрыта частыми отдельными бугорками, сверху гладко срѣзанными, съ широкою вдавленною ямкой. Щитокъ не различимый. Надкрылья овально-расширенные, съ наибольшею шириной по срединѣ, глубоко точечно-бороздчатыя, въ сплошныхъ очень маленькихъ круглыхъ чешуйкахъ коричневатаго цвета. Ноги длинныя, крѣпкія, передняя пара особенно длинная, съ выгнутыми внутрь у вершины голенями; переднія голени съ внутренней стороны съ рядомъ небольшихъ, но очень толстыхъ щетинокъ.—♀ совсѣмъ схожа съ ♂, но имѣеть болѣе короткія переднія ноги, съ прямыми вершинами переднихъ голеней; надкрылья широко овальные съ заостренною вершиной. ♂ дл. вмѣстѣ съ хоботомъ 6, шир.  $2\frac{1}{2}$  мм.; ♀ дл. 7, шир.  $3\frac{1}{2}$  мм.

Горная Бухара: гора Санджаръ-кичинъ-майданъ (1. VII. 1911, А. К. Гольбекъ! Колл. Семенова-Тянъ-Шанскаго).

*Piazomias kozlovi*, sp. n.

♂. Хоботъ сильно суженный кпереди, по длини равный своему основанию, съ глубокою срединною бороздою, почти плоскій; въ частыхъ маленькихъ и круглыхъ, но не сплошныхъ, бѣловато-розоватыхъ чешуйкахъ; темя сильно выпуклое. Усики достаточно крѣпкие, темно-красные; булава темная; первый членикъ ихъ замѣтно длиннѣе второго, третій по длини равный второму, остальные поперечные. Глаза большіе, круглые, сильно выпуклые. Переднеспинка сильно выпуклая, правильно закругленно-расширенная, съ наибольшею шириной по срединѣ, съ переднимъ и заднимъ краями прямо обрѣзанными; по поверхность ея съ двумя спинными широкими, выгнутыми наружу розовато-бѣлыми полосами; срединная часть и боковыя стороны въ темныхъ и болѣе мелкихъ круглыхъ чешуйкахъ. Щитокъ неразличимый. Надкрылья овально-вытянутыя, ясно и часто растянуто-пунктированныя; третій промежутокъ надкрылій въ довольно густыхъ розовато-бѣлыхъ чешуйкахъ, почти на вершинѣ ихъ соединяющійся съ краевымъ промежуткомъ, густо покрытымъ бѣловатыми чешуйками; пятый промежутокъ прерывающійся на  $\frac{2}{3}$  отъ основанія, седьмой почти соединяющійся съ третьимъ; остальные почти совсѣмъ голые, съ очень тонкими, едва различимыми короткими прилегающими,

щими волосками. Ноги достаточно крѣпкія и длинныя, съ очень длинною переднею парой, съ булавовидно-расширенными бедрами; переднія голени прямыя, постепенно расширяющіяся къ вершинѣ; на двухъ третяхъ отъ вершины, съ внутренней стороны съ рядомъ крѣпкихъ и острыхъ шипиковъ; среднія и заднія голени у самой вершины, съ внутренней стороны, съ рядомъ короткихъ щетинокъ; всѣ ноги густо одѣтыя чешуйками. Дл. вмѣстѣ съ хоботомъ 6, шир. 2 мм.

Ганьсу: хребетъ Тэтунскій, долина Сининъ-хе (29. VII. 1908, эксп. П. К. Козлова! Колл. Семенова - Тянъ - Шанскаго).

*Piazomias tibetanus*, sp. n.

♂. Хоботъ почти параллельно-сторонній, въ 1½ раза длиннѣе ширины основанія, съ очень глубокой срединной бороздою, пролегающею по срединѣ лба и хобота до мѣста прикрепленія усиковъ; профильная линія лба и хобота замѣтно выпуклая; темя сильно вздутое. Усики крѣпкіе, красноватые; первый членикъ ихъ въ 1½ раза длиннѣе второго; начиная съ третьяго всѣ членики поперечные. Глаза круглые, небольшіе, слабо выпуклые. Переднеспинка очень длинная, въ 1½ раза длиннѣе ширины основанія, закругленно-расширенная, съ наибольшею шириной на ¼ отъ основанія, кпереди замѣтно суженная, съ переднимъ и заднимъ краями прямо обрѣзанными; задній край ея въ 1¼ раза шире передняго; сильно выпуклая поверхность ея въ очень маленькихъ круглыхъ чешуйкахъ, достаточно густыхъ, розовато-блѣлаго цвѣта. Надкрылья овально-вытянутыя, достаточно выпуклые, тонко точечно-бороздчатыя, въ такихъ же чешуйкахъ какъ и переднеспинка; вершинная часть надкрылій въ очень рѣдкихъ оттопыренныхъ волоскахъ. Ноги очень длинныя и крѣпкія, всѣ темно-красныя, въ особенности необычно длинна передняя пара, съ бедрами булавовидно расширенными, съ передними голенями очень длинными, сильно выгнутыми передъ вершиною наружу. Дл. вмѣстѣ съ хоботомъ 7, шир. 2½ мм.

Бассейнъ Голубой рѣки: рѣка Кундуръ-чю (13200', V. 1901, эксп. П. К. Козлова! Колл. Семенова - Тянъ - Шанскаго).

*Piazomias kamicus*, sp. n.

♂. Хоботъ параллельно-сторонній, въ 1½ раза длиннѣе ширины основанія; профильная линія лба и хобота сильно выгнутая. Усики крѣпкіе, толстые, почти совсѣмъ черные, съ булавою на вершинѣ свѣтлою; первый членикъ ихъ вдвое длиннѣе второго, третій равенъ по длини второму, остальные поперечные. Глаза небольшіе, круглые, нѣсколько выпуклые. Переднеспинка шаровидной формы, со срединной тонкой бороздой; боковыя стороны ея сильно закругленно-расши-

ренные, передний и задний края прямо обрѣзанные; передний край съ замѣтною перетяжкой; ширина задняго въ  $1\frac{1}{2}$  раза больше ширины передняго. Вся поверхность переднеспинки въ сплошныхъ маленькихъ круглыхъ зеленовато-золотистыхъ чешуйкахъ. Надкрылья овально-вытянутыя, очень ясно, глубоко и растянуто точечно-бороздчатыя; на третьей бороздкѣ надкрылій два продольныхъ вдавленія: одно на срединѣ надкрылій, другое передъ вершиною. Надкрылья въ такихъ же чешуйкахъ, какъ и на переднеспинкѣ; предвершинная часть стороны надкрылій сильно поджатыя внутрь и образуюшія съ поверхностью ихъ ребро, передъ вершиною пропадающее. Ноги очень крѣпкія, толстые, длинныя, въ особенности длинна передняя пара, съ очень сильно булавовидно-расширенными бедрами и съ голенями, на половинѣ отъ вершины сильно выгнутыми внутрь. Всѣ ноги густо покрытыя достаточно длинными бѣловатыми волосками и такими же чешуйками, какими покрыты и надкрылья. ♂ дл. вмѣстѣ съ хоботомъ 9,5, шир. 3,5 мм.

Тибеть: Камъ, бассейнъ Голубой рѣки, рѣка Дза-чю (V. 1901, эксп. П. К. Козлова! Колл. Семенова-Тянъ-Шанскаго).

*Peronaspis*, gen. n.

Этотъ новый родъ очень близокъ къ роду *Corigetus* Desv., но отличается отъ него слѣдующими признаками. У *Corigetus* основаніе надкрылій всегда сильно двувыемчатое; къ нему плотно прилегаетъ переднеспинка, имѣя также двувыемчато-вырѣзанное основаніе; переднеспинка всегда конически-суженная кпереди; щитокъ треугольный, нормально развитой. У *Peronaspis* основаніе надкрылій прямое, съ прямоугольно-закругленными плечами, съ боковыми сторонами параллельными, съ основаніемъ гораздо шире основанія надкрылій; переднеспинка сильно закругленно-расширенная, съ наибольшою шириной на  $\frac{1}{3}$  отъ основанія, къ переднему краю гораздо сильнѣе суженная, чѣмъ къ заднему; щитокъ сильно выпуклый, почти кнопковидной формы.

*Peronaspis bucharica*, sp. n.

Вся верхняя сторона тѣла въ сплошныхъ очень маленькихъ зеленовато-молочного цвѣта круглыхъ чешуйкахъ. Хоботъ сильно суженный кпереди, съ рѣтугіа на вершинѣ въ видѣ большихъ крѣпкихъ и очень острыхъ зубцовъ, вершина которыхъ состоитъ изъ двухъ зубьевъ: внутренняго, приподнятаго кверху и нѣсколько въ сторону, и наружнаго, направленнаго въ сторону. Усики очень длинные, толстые, крѣпкіе; стержень ихъ очень длинный, сильно расширенный къ вершинѣ и на самой вершинѣ выгнутый наружу; первый чле-

никъ очень длинный, вдвое длиннѣе второго, остальные поперечные. Стержень и членики одѣтые зеленовато-металлическими чешуйками; булава темно-красная. Глаза круглые, большіе, почти совсѣмъ плоскіе. Переднеспинка съ длиною почти равною ширинѣ основанія; боковыя стороны ея въ задней половинѣ закругленно-расширенныя, съ наибольшою шириной на  $\frac{1}{3}$  отъ основанія; въ передней половинѣ сильно суженная; передній край ея округленно выступающій впередъ, задній прямо обрѣзанный. Надкрылья съ прямымъ основаніемъ, равнымъ основанію переднеспинки, съ прямоугольно и правильно закругленными плечами; боковыя стороны до средины слабо расширяющіяся и имѣющія здѣсь наибольшую ширину, далѣе быстро суживающіяся къ вершинѣ и на вершинѣ достаточно широко закругленныя. Надкрылья очень тонко, глубоко и часто точечно-бороздчатыя. Щитокъ кнопковидной формы, въ густыхъ чешуйкахъ. Ноги крѣпкія, толстые, густо покрыты зеленоватыми чешуйками; лапки красноватыя, коготки черные. ♂ дл. 7, шир. 3 мм.

Горная Бухара: Кара-булакъ (14. V. 1911, А. К. Гольбекъ! Колл. Семенова-Тянъ-Шанскаго).

#### *Pseudalophus*, gen. n.

Существенное отличіе новаго рода *Pseudalophus* отъ *Alophus* Sch. состоитъ въ томъ, что этотъ новый родъ имѣеть боковыя стороны надкрылій сильно поджатыми внутрь, при чемъ поверхность ихъ почти совсѣмъ голая.

#### *Pseudalophus tibetanus*, sp. n.

♂. Хоботъ постепенно суживающійся до середины, далѣе также постепенно расширяющійся къ вершинѣ, плоскій, въ тонкомъ и частомъ пунктирѣ и густыхъ коричневатыхъ прилегающихъ волоскахъ. Усики достаточно крѣпкіе, темно-красные; стержень прямой, сильно расширяющійся къ вершинѣ; первый членикъ ихъ замѣтно длиннѣе второго, остальные поперечные; булава на вершинѣ свѣтлая. Усиковыя ямки достигающія передняго края глазъ, очень глубокія, почти голыя, постепенно суживающіяся къ мѣсту прикрепленія усиковъ. Глаза довольно большіе, круглые, совсѣмъ плоскіе. Переднеспинка поперечная, очень слабо выпуклая, широко и правильно закругленно-расширенная, передъ вершиною сильно суженная, съ переднимъ и заднимъ краями прямо обрѣзанными, у передняго края очень широко перетянутая; ширина передняго края ея въ  $1\frac{1}{2}$  раза уже ширины задняго; съ достаточно развитой срединной бороздкою; очень часто и тонко пунктированная, въ густыхъ коричневатыхъ прилегающихъ волоскахъ. Щитокъ большой, имѣющій видъ равносторонняго треугольника, густо покрытый прилегающими бѣлыми волосками. Над-

крылья съ основаниемъ равнымъ основанию переднеспинки и прямоугольными, правильно закругленными плечами, съ боковыми сторонами параллельными, передъ вершиною суживающимися и на вершинѣ широко закругленными; въ очень густыхъ и очень длинныхъ прилегающихъ волоскахъ; растянуто точечно-бороздчатыя, съ двумя большими бѣлыми пятнами на срединѣ и двумя на предвершинныхъ мозоляхъ, окруженными голымъ широкимъ кольцомъ. Боковые стороны надкрылій сильно подтянутыя внутрь и почти совсѣмъ голыя. Нижняя сторона тѣла красноватая, въ тонкихъ и рѣдкихъ прилегающихъ волоскахъ. Ноги крѣпкія, толстые, красныя, въ достаточно густыхъ прилегающихъ волоскахъ. — ♀ совсѣмъ схожа съ ♂, только надкрылья съ боковыми сторонами сильно закругленно-расширенными. Рѣдко встречаются экземпляры съ отсутствующими пятнами. ♂ дл. вмѣстѣ съ хоботомъ 11—14, шир. 4—5 мм.; ♀ дл. 12—14, шир. 5—6 мм.

Бассейнъ Голубой рѣки: рѣка Кундуручь-чю (13.200', V. 1901, эксп. П. К. Козлова! Колл. Семенова-Тянъ-Шанскаго).

### *Adosomus grigorievi*, sp. n.

♂. Хоботъ параллельно-сторонній, съ широкимъ и плоскимъ срединнымъ килемъ; на лбу, въ его основаніи, глубокая большая ямка; на поверхности киля, въ мѣстѣ прикрепленія усиковъ, широкое и глубокое продольное вдавленіе; сама поверхность килевой возвышенности голая, въ рѣдкомъ, но достаточно грубомъ пунктирѣ. Вдоль килевой возвышенности, по обѣимъ сторонамъ ея, глубокія и широкія борозды, ограниченные снаружи боковыми ребрами хобота; дно этихъ вдавленій въ густыхъ прилегающихъ волоскахъ. Усики очень крѣпкіе и толстые, темные; булава свѣтлая; первый членикъ въ 1½ раза длиннѣе второго, остальные поперечные. Глаза узкояйцевидной формы, большие, почти совсѣмъ плоскіе. Лобъ и плоское темя почти совсѣмъ голые, грубо и рѣдко пунктированные. Переднеспинка поперечная, съ длиною равною своему основанію конически суживающаяся кпереди; поверхность ея въ очень большихъ и частыхъ плоскихъ бугоркахъ, съ короткимъ удлинненнымъ килькомъ; передній край сильно двувыемчатый, задній прямо обрѣзанный; ширина передняго въ 1½ раза уже ширины задняго. Поверхность переднеспинки съ двумя широкими желтыми полосами: одной спинной, суживающейся кпереди и передъ переднимъ краемъ нѣсколько выгнутой внутрь, и другой боковою, сильно выгнутой вверхъ и по срединѣ сливающейся со спинной полосою. Боковые стороны переднеспинки такъ же грубо гранулированныя, какъ и верхняя сторона. Надкрылья съ основаниемъ едва болѣшимъ основанія переднеспинки, съ очень маленькими прямоугольно-закругленными плечами; боковые стороны ихъ вполнѣ параллель-

нья, на вершинѣ широко и правильно закругленныя, гранулированныя такъ же, какъ и переднеспинка, по всей своей поверхности; съ желтыми продольными пятнами, а боковыми сторонами почти совсѣмъ желтыми. Низъ тѣла сплошь въ желтоватыхъ маленькихъ прилегающихъ волоскахъ, съ очень большими и частыми голыми черными пятнами. Ноги крѣпкія и толстыя, въ такихъ же волоскахъ, какъ и низъ тѣла; бедра и голени не испещренныя. ♂ дл. вмѣстѣ съ хоботомъ 20, шир. 7 мм.

Южная Алашань; оазисъ Дынъ-юань-инъ (19. IV. 1909, эксп. П. К. Козлова! Колл. Семенова-Тянъ-Шанскаго).

Названъ этотъ новый видъ въ память покойнаго секретаря Имп. Русскаго Географическаго Общества, А. В. Григорьева.

*Phytonotus zarudnianus*, sp. n.

♂. Хоботъ сильно выгнутый, тонкій, черный, цилиндрической формы, кпереди до мѣста прикрепленія усиковъ расширяющійся, далѣе до самой вершины боковыя его стороны параллельныя; со срединнымъ тонкимъ килемъ; по длини равный длини переднеспинки и головы, взятыхъ вмѣстѣ. Усики очень тонкіе и длинные, красноватые; булава ихъ темная, вершина ея свѣтлая; первый членникъ вдвое длиннѣе второго, остальные поперечные. Глаза круглые, слабо выпуклые, достаточно большие; разстояніе на лбу между глазами вдвое менѣе ширины хобота на вершинѣ. Переднеспинка поперечная, съ длиною въ  $1\frac{1}{2}$  раза меньшею ширины основанія; отъ самаго передняго края, прямо обрѣзанного, боковыя стороны ея сильно закругленно-расширенныя, съ наибольшою шириной на  $\frac{2}{3}$  отъ основанія, далѣе суживающіяся къ основанію по едва выгнутой внутрь прямой линіи; поверхность ея слабо выпуклая, въ очень густыхъ маленькихъ удлиненныхъ и нѣсколько расколотыхъ чешуйкахъ; задній край прямо обрѣзанный, въ  $1\frac{1}{2}$  раза шире передняго. Надкрылья съ основаніемъ равнымъ основанію переднеспинки; отъ основанія передній край косо срѣзанный, съ тупоугольно закругленными плечами и параллельными боковыми сторонами; широко закругленныя на вершинѣ. Бороздчатость надкрылій не различима, поверхность ихъ въ такихъ-же густыхъ чешуйкахъ, какъ и поверхность переднеспинки; въ задней половинѣ въ рѣдкихъ и длинныхъ, нѣсколько оттопыренныхъ щетинкахъ. Ноги крѣпкія, толстыя, въ густыхъ длинныхъ прилегающихъ сѣровато-блѣлыхъ волоскахъ. Коготки и вершинный членникъ лапокъ красноватые. ♂ дл. вмѣстѣ съ хоботомъ 6, шир.  $2\frac{1}{2}$  мм.

Западная Персія (31. III. 1904, Н. А. Зарудный! Колл. Семенова-Тянъ-Шанскаго).

*Phytonotus semenovi*, sp. n.

♂. Хоботъ короткій, толстый, слабо выгнутый, въ половину длины переднеспинки, густо покрытый золотистыми волосками. Лобъ

плоский. Усики короткие, тонкие, красноватые; булава ихъ темная; первый членикъ очень толстый, булавовидный, второй тонкий, въ  $\frac{2}{3}$  длины первого, остальные поперечные. Глаза овальные, достаточно большіе, плоскіе. Переднеспинка поперечная, сильно расширенно-закругленная, съ наибольшею шириной по срединѣ; въ задней половинѣ прямолинейно суженная, съ переднимъ и заднимъ краями прямо обрѣзанными, въ густыхъ оттопыренныхъ волоскахъ, съ золотистыми малень-кими чешуйками, до половины расколотыми, со срединной бѣлой поло-скою. Бока переднеспинки въ густыхъ и длинныхъ золотисто-жел-тыхъ прилегающихъ волоскахъ. Надкрылья съ основаниемъ равнымъ основанию переднеспинки, съ правильно закругленными плечами; боко-выя стороны ихъ параллельныя, поверхность въ бѣловатыхъ малень-кихъ расколотыхъ чешуйкахъ; бока, начиная со средины, и вершин-ная часть въ коричневатыхъ чешуйкахъ; задняя половина покрытая рядами рѣдкихъ, бѣлыхъ длинныхъ и нѣсколько оттопыренныхъ ще-тинокъ. Ноги крѣпкія, толстые, красноватыя, не густо покрытыя бѣло-ватыми волосками. ♂ дл. вмѣстѣ съ хоботомъ 5, шир. 2 мм.

Западная Персія (25. III. 1904, Н. А. Зарудный! Колл. Се-менова - Тянъ-Шанскаго).

*Taenophthalmus bucharicus*, n. sp.

♂. Хоботъ параллельно-сторонній, съ широкою и глубокою сре-динною бороздой, начинающейся на лбу и оканчивающейся у мѣста прикрепленія усиковъ; вдвое длиннѣе ширины основанія, на вершинѣ съ большою треугольною вырѣзкой, густо покрытый маленькими круглыми чешуйками желтовато-бѣловатаго цвѣта. Профильная линія лба и хобота едва выпуклая. Усики короткие, крѣпкіе; стержень ихъ тонкій у основанія, къ вершинѣ булавовидный; всѣ членики попереч-ные, начиная съ первого, постепенно уменьшающіеся въ длину и ши-рину, снабженные каждый съ внутренней стороны шиповидными ще-тинками, очень острыми и длинными; булава большая, веретенообраз-ная. Глаза большіе, круглые, сильно выпуклые. Переднеспинка попер-ечная, слабо выпуклая, сильно поперечно расширенная, съ наиболь-шею шириной по срединѣ; боковыя стороны ея по срединѣ пра-вильно закругленныя, къ основаніямъ сходящіяся прямолинейно; пе-редній и задній края прямо обрѣзанные; ширина передняго края въ  $1\frac{1}{4}$  раза уже задняго. Поверхность переднеспинки изрытая глубокими и широкими ямками, съ неясною срединною бороздою; поверхность ея въ густыхъ круглыхъ и маленькихъ чешуйкахъ. Щитокъ большой, округленный, вдавленный и густо покрытый бѣлыми волосками. Над-крылья цилиндрической формы, съ основаниемъ равнымъ основанию переднеспинки, продольно-ребристыя, при чемъ черезъ одно ребра болѣе развитыя, покрытыя такими-же чешуйками, какъ и переднеспинка.

Ноги очень крѣпкія и толстые, покрытыя густыми чешуйками и бѣлыми волосками, нѣсколько оттопыренными. ♂ дл. вмѣстѣ съ хоботомъ 11, шир. 4 мм.; ♀ дл. 12,5, шир. 5 мм.

Хребетъ Петра Великаго: гора Ходжа-барку (7. VII. 1911, А. К. Гольбекъ! Колл. Семенова-Тянъ-Шанскаго).

*Taenophthalmus semenovi*, n. sp.

♂. Хоботъ параллельно-сторонній, съ широкимъ и глубокимъ срединнымъ вдавленіемъ, простирающимся ото лба до мѣста прикрѣплія усиковъ, вдвое длиннѣе ширины основанія; поверхность его покрыта маленькими круглыми чешуйками песочного цвѣта; лобъ сильно вдавленый. Усики короткіе, крѣпкіе; стержень ихъ тонкій у основанія, постепенно булавовидно расширяющійся къ вершинѣ; всѣ членики поперечные; первый въ 1 $\frac{1}{2}$  раза длиннѣе второго; начиная со второго членики постепенно расширяющіеся къ вершинѣ, но сохраняющіе одну длину; у основанія булавы членикъ самый широкій; снабженные каждый съ наружной стороны одною длинною и крѣпкою щетинкой на своей вершинѣ и двумя съ внутренней стороны. Глаза большіе, круглые, слабо выпуклые; глазные вѣки сильно приподнятыя. Переднеспинка поперечная, едва длиннѣе ширины основанія, сильно закругленно-расширенная, съ наибольшою шириной по срединѣ; передній край ея нѣсколько округленно выступающій впередъ, задній прямо обрѣзанный; къ переднему боковыя стороны сильнѣе суживаются, чѣмъ къ заднему; основаніе въ 1 $\frac{1}{2}$  раза шире ширины передняго края; поверхность переднеспинки глубоко морщинисто-изрытая, въ такихъ же чешуйкахъ, какъ и хоботъ. Надкрылья съ основаніемъ равнымъ основанію переднеспинки, съ широко и правильно закругленными плечами, съ боковыми сторонами параллельными, съ тремя сильно развитыми ребрами: плечевымъ и двумя спинными; промежутки между ними съ двойнымъ рядомъ глубокихъ ямокъ; поверхность ихъ въ такихъ же песочныхъ чешуйкахъ, какъ и поверхность хобота. Ноги крѣпкія и толстые, густо покрытыя чешуйками; бедра съ внутренней стороны въ длинныхъ бѣлыхъ волоскахъ, нѣсколько оттопыренныхъ; всѣ голени съ внутренней стороны съ рядомъ длинныхъ шиловидныхъ щетинокъ. ♂ дл. вмѣстѣ съ хоботомъ 11, шир. 6 мм.

Сѣв. Персія: между Имамъ-гуляръ и Гучанъ (16. II. 1898, Н. А. Зарудный! Колл. Семенова-Тянъ-Шанскаго).

*Taenophthalmus carinatus*, sp. n.

♂. Хоботъ расширяющійся кпереди, съ широкимъ срединнымъ вдавленіемъ, простирающимся ото лба до мѣста прикрѣплія усиковъ; въ 1 $\frac{1}{4}$  раза длиннѣе ширины основанія, съ глубокими поперечными вдавленіями, отдѣляющими лобъ отъ хобота; поверхность его

плоская, морщинисто изрытая ямками, въ круглыхъ маленькихъ чешуйкахъ песочного цвета. Лобъ плоскій, въ рѣдкомъ и тонкомъ пунктирѣ, густо одѣтый чешуйками. Усики крѣпкіе, толстые, короткіе, черные; вершинная часть стержня булавовидная; всѣ членики поперечные; первый едва длиннѣе второго, длина послѣдняго равная длине остальныхъ; вершины этихъ члениковъ съ наружной и внутренней сторонъ снабженныя острыми и длинными черными щетинками. Глаза большіе, круглые, довольно выпуклые; глазные вѣки сильно развитыя. Переднеспинка поперечная, съ длиною едва болѣе ширины основанія, расширенно-закругленная, съ наибольшою шириной по срединѣ; съ переднимъ и заднимъ краями прямо обрѣзанными; сильно бугорчато-морщинистая, съ тонкою срединною бороздою; боковыя стороны ея отъ срединнаго расширѣнія сильно суживающіяся къ переднему краю, чѣмъ къ заднему; передній край въ  $1\frac{1}{2}$  раза уже задняго; задній сильно ошнурованный. Щитокъ треугольный, большой, въ густыхъ чешуйкахъ. Надкрылья съ основаніемъ равнымъ основанію переднеспинки, съ правильно закругленными плечами, съ боковыми сторонами параллельными, въ слабо развитыхъ ребрахъ; промежутки между швомъ, двумя спинными ребрами и плечевымъ ребромъ въ двойномъ рядѣ глубокихъ поперечныхъ ямокъ. Вся поверхность надкрылій одѣтая такими-же чешуйками, какъ и переднеспинка. Низъ тѣла въ густыхъ желтоватыхъ прилегающихъ волоскахъ. Ноги очень крѣпкія, толстые, въ густыхъ чешуйкахъ; всѣ голени съ внутренней стороны съ рядомъ длинныхъ черныхъ оттопыренныхъ щетинокъ. — ♀ совсѣмъ схожа съ ♂, только надкрылья замѣтно расширенно-вздутыя, съ наибольшей шириной по срединѣ. ♂ дл. вмѣстѣ съ хоботомъ 12—14,5, шир. 5—6,5 мм.; ♀ дл. 13,5, шир. 6,5 мм.

Вѣренскій уѣздъ: озеро Кара-куль (4. VI. 1907, В. Е. Недзвѣцкій!).

*Pseudotaenophthalmus*. gen. n.

Существенное различие между *Taenophthalmus* и *Pseudotaenophthalmus*, gen. n., заключается въ слѣдующемъ: всѣ виды *Taenophthalmus* имѣютъ надкрылья съ болѣе или менѣе развитыми ребрами и первый членикъ ихъ усиковъ цилиндрическій; новый родъ *Pseudotaenophthalmus* не имѣть на надкрыльяхъ реберъ, и первый членикъ усиковъ у него поперечный, сильно расширяющійся къ вершинѣ.

*Pseudotaenophthalmus hohlbbecki*, sp. n.

♂. Хоботъ параллельно-сторонній, съ широкимъ и глубокимъ срединнымъ вдавленіемъ, начинающимся на лбу и кончающимся у места прикрепленія усиковъ; вдвое длиннѣе ширины основанія, плоскій; профильная линія лба и хобота прямая. Усики короткіе, очень

крѣпкіе и толстые, темные; стержень ихъ очень короткій, къ вершинѣ сильно расширяющійся; членики поперечные, при чемъ длина и ширина ихъ уменьшаются по мѣрѣ приближенія къ вершинѣ. Глаза большіе, круглые, сильно выпуклые. Переднеспинка продольная; длина ея замѣтно болѣе ширины основанія; плоская, достаточно расширен-нозакругленная, съ наибольшою шириной по срединѣ; передній край ея едва округленно-обрѣзанный, задній прямой. Поверхность ея очень тонко и рѣдко пунктированная, въ скудныхъ маленькихъ круглыхъ чешуйкахъ. Надкрылья цилиндрической формы, съ основаніемъ равнымъ основанію переднеспинки, на вершинѣ широко и правильно закругленные; ребристость ихъ едва различимая; продольно-пятнистая, при чемъ пятна состоять изъ сплошныхъ маленькихъ и круглыхъ чешуекъ бѣлаго цвѣта. Ноги крѣпкія и толстыя, въ рѣдкихъ бѣлыхъ тонкихъ волоскахъ. Низъ тѣла черный, въ очень рѣдкихъ бѣлыхъ прилегающихъ волоскахъ; вершинный сегментъ брюшка по срединѣ, на самой вершинѣ, съ большимъ срединнымъ вдавленіемъ. — ♀ совсѣмъ схожа съ ♂, но имѣетъ переднеспинку болѣе расширенно-закругленную, надкрылья съ боковыми сторонами расширенно-закругленными, съ наибольшою шириной по срединѣ, на вершинѣ остро закругленные; вершинный брюшной сегментъ ея безъ вдавленія. ♂ дл. вмѣстѣ съ хоботомъ 12, шир. 4 мм.; ♀ дл. 11—14, шир. 5—5,5 мм.

Горная Бухара: гора Санджаръ-кичинъ-майданъ (1. VI. 1911, А. К. Гольбекъ! Колл. Семенова-Тянъ-Шанскаго).

*Pseudotaenophthalmus persicus*, sp. n.

♂. Хоботъ параллельно-сторонній, почти квадратный, съ широ-кою продольною бороздою, простирающейся ото лба до мѣста при-крепленія усиковъ; поверхность его тонко пунктированная, въ рѣдкихъ маленькихъ круглыхъ чешуйкахъ. Лобъ плоскій; профильная линія лба и хобота прямая. Усики крѣпкіе, короткіе, темные; стержень ихъ красноватый, къ вершинѣ сильно расширяющійся; первый членикъ въ 1 $\frac{1}{2}$  раза длиннѣе второго; со второго остальные поперечные. Глаза круглые, небольшіе, достаточно выпуклые. Переднеспинка про-дольная, во всю длину достаточно сильно закругленно-расширенная, длиной въ 1 $\frac{1}{4}$  раза болѣе ширины основанія, въ довольно густыхъ маленькихъ и круглыхъ чешуйкахъ темно-золотистаго цвѣта; перед-ній и задній края прямо обрѣзанные. Надкрылья цилиндрической формы, съ основаніемъ равнымъ основанію переднеспинки, глубоко точечно-бороздчатыя; поверхность ихъ въ сплошныхъ круглыхъ и маленькихъ чешуйкахъ темно-золотистаго цвѣта. Ноги крѣпкія, тол-стые, достаточно густо покрытыя чешуйками; переднія бедра сильно

булавовидно расширенный. Низъ тѣла въ сплошныхъ достаточно длинныхъ прилегающихъ бѣловатыхъ волоскахъ. ♂ дл. 9, шир. 3,5 мм.  
Зап. Персія (14. IV. 1903, Н. А. Зарудный! Колл. Семенова-Тянъ-Шанскаго).

### *Buctiscus tsherskii*, sp. n.

Этотъ новый видъ ясно отличимъ отъ *B. congener* Jekei по пунктиру переднеспинки: у *congener* онъ тонокъ и рѣдокъ, отчего переднеспинка представляется металлически-блестящею; у *tsherskii* пунктиръ сплошной, такой какъ у *rugosus* Gebl.; глубокія точки расположены одна возлѣ другой. Надкрылья у *congener* и у *tsherskii* пунктированы одинаково, достаточно тонко, у *rugosus* же очень грубо и часто. Въ этомъ и заключаются существенные отличія этихъ трехъ видовъ. ♂ дл. вмѣстѣ съ хоботомъ 8, шир. 3,2 мм.

Приморская область, Южно-Уссурійскій уѣздъ: село Спасское, Одарковскій заводъ (VI. 1911, А. И. Черскій!).

### *Rhynchites kozlovi*, sp. n.

♂. Хоботъ въ 1 $\frac{1}{2}$  раза длиннѣе переднеспинки, до мѣста прикрепленія усиковъ нѣсколько суженный, далѣе сильно расширяющійся и у вершины вмѣстѣ съ ртегугіа имѣющій ширину, вдвое меньшую разстоянія между центрами глазъ, со срединнымъ острымъ килемъ, доходящимъ до мѣста прикрепленія усиковъ, и двумя боковыми кильками; далѣе киль пропадаетъ, и поверхность хобота на вершинѣ съ двумя широкими и короткими продольными вдавленіями; сама поверхность хобота грубо морщинисто-пунктированная, въ оттопыренныхъ длинныхъ волоскахъ. Лобъ плоскій, хоботъ достаточно выгнутый; профильная линія лба и хобота представляющая надломленную кривую. Глаза достаточно большіе, круглые, слабо выпуклые. Голова небольшая; шея длинная, постепенно расширяющаяся къ основанію переднеспинки. Переднеспинка расширенная, шаровидной формы, у передняго края сильно стянутая, съ наибольшою шириной на  $\frac{1}{3}$  отъ основанія; передній край ея въ 1 $\frac{1}{2}$  раза уже задняго; грубо морщинисто-пунктированная, со срединнымъ вдавленіемъ, въ очень длинныхъ бѣловатыхъ оттопыренныхъ волоскахъ. Острые, достаточно длинные шипы, расположенные на нижней половинѣ передняго края внизу, направлены почти прямо впередъ, такъ что сверху этихъ шиповъ не видно. *Rh. auratus* Scop., который болѣе всего схожъ съ описываемымъ видомъ, имѣетъ шипы много большіе, расположенные на верхней половинѣ передняго края переднеспинки и направленные въ стороны. Щитокъ большой, широкій, на вершинѣ закругленный, вдавленный. Надкрылья почти квадратныя, едва удлиненные, съ основаниемъ почти вдвое болѣшимъ основанія переднеспинки, съши-

роко прямоугольно-закругленными плечами; боковыя стороны ихъ параллельно-стороннія, на вершинѣ правильно закругленныя во всю ширину, очень грубо бороздчатыя, въ основной половинѣ почти морщинистыя; предъ основаніемъ надкрылья замѣтно поперечно вдавленныя, въ достаточно густыхъ и длинныхъ бѣловатыхъ оттопыренныхъ волоскахъ. Ноги достаточно крѣпкія и толстыя. Вся нижняя и верхняя сторона металлически-золотисто-малиноваго цвѣта. ♂ дл. вмѣстѣ съ хоботомъ 8, шир. 3 мм.

Алашань: Алашанскій хребетъ, ущелье Дзосто (17. V. 1908, эксп. П. К. Козлова! Колл. Семенова-Тянъ-Шанскаго).

*Astaeops amurensis*, sp. n.

Этотъ новый видъ легко узнается по сравненію со стариннымъ видомъ *A. smaragdula* Fabr.

1 (2) Верхній покровъ въ густыхъ прилегающихъ волосахъ грязно-табачнаго цвѣта. Переднеспинка у передняго и задняго краевъ сильно перетянутая. Въ профиль переднеспинка и почти треть надкрылій, считая отъ основанія, въ ясныхъ стоячихъ волосахъ. ♂ дл. 9, шир. 2,8 мм. *A. smaragdula* Fabr.

2 (1) Верхній покровъ въ очень густыхъ прилегающихъ волосахъ зелено-желтоватаго цвѣта. Переднеспинка у передняго и задняго краевъ гораздо сильнѣе перетянутая. Въ профиль переднеспинка и надкрылья совсѣмъ безъ волосковъ. ♂ дл. 8, шир. 2,5 мм.

*A. amurensis*, sp. n.

*Astaeops smaragdula* Fabr. имѣеть широкое распространеніе: начиная отъ Урала чрезъ всю западную и среднюю Сибирь, Забайкальскую и Амурскую области, Южно-Уссурійскій край и кончая Приморскою областью. *A. amurensis* Suv. распространенъ отъ средняго Амура, гдѣ Амуръ пересѣкаетъ Малый Хинганъ (ст. Пашково, ст. Радде), по Южно-Уссурійскому краю и Приморской области.