

CAROLI A LINNÉ  
SYSTEMA  
NATURÆ,

TOM. I. PARS II.

---

EDITIO DUODECIMA REFORMATA.

12

---

HOLMIAE,

IMPENSIS DIRECT. LAUR. SALVII, 1767.

## CLAS-SIS V.

## INSECTA.

*In his tam parvis, atque tam nullis,  
Quæ ratio? quanta vis!  
Quam inextricabilis perfectio!*

PLIN. XI: 2.

**ANIMALCULA** polypoda, *Spiracalis* lateralibus respirantia, *Cunte* ossea cataphracta; *Antennis* mobilibus sensoriis capitis instruuntur.

**CORPUS** horum dividitur in *Caput*, *Truncum*, *Abdomen*, *Artus*:

**CAPUT** plerisque distinctum, instruitur Oculis, Antennis, saepeiusque Ore; destitutum Cerebro, Naribus, Auribus.

*Oculi* plerisque bini, absque palpebris, simplices aut compositi, quibus vident colorcs.

*Antennæ* binæ, articulatae, sensu nobis ignoto, sunt setaceæ, filiformes, moniliformes, clavatae, capitatae, fffiles, pectinatae, barbatæ, corpore breviores, longiores, mediocres.

*Palpi* articulati, ori affixi, plerisque quatuor s. sex: articulis 2, 4, 3.

*Os* plerisque sub capite, quibusdam in pectore; *Rostro*, *Labio*, *Maxillis* transversis, *Dentibus*, *Lingua*, *Palato*; nonnullis os nullum.

*Stemmata* verticis puncta tria elevata nitida.

**TRUNCUS**, inter Caput & Abdomen, pedatus, Thorace supra Dorso, postice Scutello, subtus Pectore Sternoque.

**ABDOMEN** Ventriculo, Intestinis, Visceribusque fœtum, incisuris 5, annulatum, *Spiraculis* porosis lateribus pertusum, supra Tergo, subtus Ventre, postice Ano terminatum.

**ARTUS** sunt **Cauda**, **Pedes**, plurimisque **Ale**:

**Cauda** abdomen terminans, est vel solitaria s. *bicornis*; simplex s. armata *Forcipe*, *Furca*, *Seta*, **Chela** s. *Agnus* simplici s. complicito, lævi s. ferrato.

**Pedes** Trunci Femoribus, *Tibiis*, Plantæ *Tarsis*, Digitis *Unghibus*; Manus (**Chela**) nonnullis, simplex Pollice mobili; Posteriores pro usu *cursorii*, *saltatorii*, *natatorii*.

**Ale** duæ s. quatuor, sunt vel *planæ*, *plicatiles*, *erectæ*, *patentes*, *incumbentes*, *deflexæ* s. *reversæ*, *dentatae*, *caudatae*, *reticulatae*, *maculis*, *fasciis*, *strigis*, *lineis*, *punctis* pictæ s. *stigmatibus* notatae, *ocellis* ornatae, idque vel in *primoribus* vel *secundariis*, tam in *pagina superiore*, quam *inferiore*.

**Elytra** (alæ superiores) crustacea bina, saepius mobilia, *truncata*, *spinosa*, *serrata*: *scabra*, *striata*, *porcata*, *sulcata*, *punctata*, tegentia alas inferiores. **Hemelytra** media quasi alas inter & clytra.

**Halteres** sub alis dipterorum ex petiolo capitati.

**SEXUS** *Mas* & *Femina* generant Perfecta.

**Neutra** nonnullis societate fœderatis.

**METAMORPHOSIS** plurimis triplex, mutanda structura, exutis ovi tunicis, una post alteram.

**Ovum** sub minima mole vesicaria excluditur.

**LARVA** (*Eruca*) succosa, mollior, major, aptera, sterilis, tardior, apoda saepè, saepèque polypoda, vorax alimento proprio.

**PUPA** (*Nympha*) siccior, coarctata, durior, *nuda* s. *folliculata*, saepè absque ore, quæ vel *Pedata* 1. 2. 3. vel *Apoda* 4. 5.

1. *Completa* omnibus partibus agilis. (Aranea, Acarus, Oniscus.)
2. *Semicompleta* solis alarum rudimentis. (Gryllus, Cicada, Cimex, Libellula, Ephemera.)
3. *Incompleta* alis pedibusque immobilis. (Apis, Formica, Tipula.)
4. *Obtecta* thorace abdomeque distincto corticata: (Lepidoptera) eaque vel *nuda*, vel *folliculata*.

5. **Cœar-**

---

*Verbositas*, *præsentis* seculi calamitas artis Insectorum, ut pauciloquium *Venium*

5. *Coarctata* intra globum. (Musca, Oestrus.)

IMAGO revelata, declarata; perfecta generans, agilis, antennis instruta.

triplex itaque structura & cognitio ejusdem animalis.

HÆC *Muta*, nisi alio proprio instrumento sonora; *Surda*, stridorem ætheris licet percipient; *Piura* ubique plantarum speciebus, sed ob patentiorum sibi regionem in orbe pauciora: *Tropicæ*, *Arctica* & hodie ignota *Antarctica*; singula demum *Minima* annua, exceptis aquaticis, sed universa maximæ molis animantia, effectuque pariter maxima, sed magis occulto magisque disperso, ideoque minus coercend.; totidem etenim sunt Naturæ anni ministræ, propriis negotiis peragendis præfixi, quot maniis sufficient, proportionem inter plantas servando, erronea, superflua, mortua, putrida consumendo, aliis demum, imprimis avibus, in alimentum cedendo.

HABITANT insectæ in iis tantum plantis, c quibus visitant (non in quibus), occurunt, unde saepius nomina *Trivialia* optima, ut ars cum *Politia naturæ* combinetur; aliis alia numeribus præfixa præparant, purgant, destruant necessaria.

ENTOMOLOGI præstantiores figuris, proprietatibus, attributis inclaruere.

Veteres *Mouffet*, *Aldrovandus*, *Fonstonus*.

Metamorphosii *Gœdart*, *Meriana*, *Albinus*, *Frisch*, *Ræsel*, *Wilkes*, *Ammiral*, *Harris*.

Philosophi *Swammerdam*, *Reaumur*, *De Geer*, *Bonnet*.

Iconographi *Clerck*(\*), *Hæfftner*, *Brailæus*, *Robert*, *Petiver*, *Schæffer*.

Descriptores *Rajus*, *Fauna svecica* (edit. 2. *Holm.* 1761. oct.)  
*Museum Reginæ*, *Holm.* 1764.

Monographi *Lister*, *Schæffer*, *Clerck*.

Systematici *Systema naturæ*, *Poda*, *Sultze*, *Geoffroa*, *Scopoli*, *Gronovius*.

## M m 2

## OR.

(\*) Clerckij icones insectorum, pulcherrimum opus, quo etiamnum vidit ovis literatus. Acad. Reg. Scient. Holmensi hoc ab incertu vindicavit.

Descriptiones specierum dedi in *Fauna svecica*, Amoenit. academ. Æ Mæsto Regine.

198. COCCINELLA. *Antennæ subclavatæ, truncatæ.**Palpi clava semicordata.**Corpus hemisphæricum, thorace elytrisque marginatis, Abdomine plano.**\* Coleoptris rubris flavis: Punctis nigris maculatis.**marginalis.* 1. *C. coleoptris flavis immaculatis margine nigro, thoracis margine punctis duobus albis.**Habitat in America. Brunnich.**Corpus medium, nigrum. Elytra flava, summo margine nigra. Thoracis margines laterales cum puncto uniuerso & punctis duobus capitis altis. Br.**surinamensis.* 2. *C. coleoptris rubris immaculatis, thorace capiteque nigri.* Amœn. acad. 6. p. 393. n. 12. \**Habitat Surinami.**sanguinea.* 3. *C. coleoptris sanguineis immaculatis, thorace maculis nigris.* Amœn. acad. 6. p. 393. n. 11. \**Habitat Surinami.**impunctata.* 4. *C. coleoptris rubris: puncto nullo.**Habitat in Europa.**Minor. Elytra rubra, immaculata. Thorax ruber disco medio fuscescente. Subtus nigra. Pedes antice ferruginei.**annulata.* 5. *C. coleoptris rubris macula subannulari nigra.**Habitat in Germania. D. Schreber.**Meia, nigra. Thorax marginibus lateralibus pallidis. Elytra sanguinea in Medio fascia nigra, posterius fascia alia quæ non tangit marginem exteriorem, sed exterius connectitur cum priore fascia.**unipunctata.* 6. *C. coleoptris flavescentibus: puncto communi nigro.**Faun. Svec. 470. \***Habitat in Europa.*

7. C.

*Coccinellæ Larvae Aphides consumunt, coque plantas à Phthiriasi hac purgant.*

2-punctata-7. C. coleoptris rubris: punctis nigris duobus. Fn. svec. ta.

471. \* Scop. garn. 234.

Pet. gaz. 34. t. 21. f. 4.

Merian. inf. 69. t. 136.

Raj. inf. 86. n. 2.

List. loqu. 383. n. 8.

Bradl. natur. t. 27. f. 4.

Reaum. inf. 3. t. 31. f. 16.

Frisch. inf. 9. p. 33. t. 16. f. 4.

Habitat in Europæ Alnetis.

Puncta duo in medio coleoptrorum.

3-punctata-8. C. coleoptris rubris: punctis nigris tribus. Fn. svec. ta.

472. \*

Habitat in Europa.

Puncta duo ad apicem coleoptrorum.

4-punctata-9. C. coleoptris flavis: punctis nigris quatuor.

Habitat in Germania. D. Schreber.

Media. Thorax flavus punctis 4 nigris. Elytra flava: punctis in media 2, ad singulum marginem singula, ita ut omnia 4 puncta in medio transversim posita sint. Subtus nigra, pedibus flavis.

hebræa. 10. C. coleoptris luteis: maculis nigris sex longitudinalibus difformibus. Fn. svec. 473. \*

Habitat in Europa.

5-punctata-11. C. coleoptris sanguineis; punctis nigris quinque. Fn. svec. ta.

474. \*

Habitat in Pruno spinosa.

Elytra sanguinea sunt.

6-punctata-12. C. coleoptris fulvis: punctis nigris sex.

Habitat in Europa: Svecia.

Media. Thorax pallidus maculis 5 subfuscis. Elytra fulva punctis 3 nigris, transversim positis in medio.

Margo exterior. elytrorum flavidus.

trifascia- 13. C. coleoptris rubris: fasciis nigris tribus. Fn. svec. ta.

475. \*

Habitat in Lapponia.

hierogly- 14. C. coleoptris luteis: maculis duabus nigris longitudinalibus sinuatis. Fn. svec. 476. \*

Habi-

*Habitat in Svecia.*

*Affinis 10-pustulata.*

7-puncta- 15. *C. coleoptris rubris: punctis nigris septem.* *Faun.*

*ta.*

*Svec. 477. \* Scop. garn. 235.*

*Frisch. inf. 4. p. 1. t. 1. f. 4.*

*Pet. gaz. 33. t. 24. f. 3.*

*Gœd. inf. 2. p. 58. t. 18.*

*Raj. inf. 86. n. 1.*

*Merian. eur. 24. f. II.*

*Alb. inf. 61. f. C.*

*Rœf. inf. 2. scar. 3. p. 7. t. 2.*

*Reaum. inf. 3. t. 31. f. 18.*

*Bradl. nat. t. 27. f. 4.*

*- Hammir. inf. t. 14.*

*Sultz. inf. t. 3. f. 13.*

*Habitat in Europæ agris & plantis.*

9-puncta- 16. *C. coleoptris rubris: punctis nigris novem.* *Faun*

*ta.*

*Svec. 478. \* Scop. carn. 236.*

*Udm. diff. 14. Coccinella nigra, elytris rubris, pun-*

*ctis novem nigris.*

*Habitat in Europæ Juniperetis.*

10-pun- 17. *C. coleoptris fulvis: punctis nigris decem.* *Fa. svec.*

*etata.*

*479. \* Scop. carn. 237.*

*Habitat in Europa.*

11-pun- 18. *C. coleoptris rubris: punctis nigris undecim.* *Faun.*

*etata.*

*Svec. 480. \* Strom. act. nigr. 3. p. 388. t. 6. f. 2.*

*Merian. europ. 168.*

*Habitat in Europa.*

12-pun- 19. *C. coleoptris flavis: punctis nigris sex: extimo linea-*

*etata.*

*ri repando.*

*Habitat in Europa.*

*Minuta. Thorax flavus punctis maculisque duabus ni-*

*gris: Elytra flava; Puncta 5 nigra, præter exte-*

*riorem, quasi ex 4 punctis connatum, lineare, re-*

*pandum, ad marginem exteriorem inter primum 5*

*ultimum punctum. Sutura longitudinalis nigra. Sub-*

*tus nigra, tibialis flavis.*

P p

20. C.

---

*Species diversas coniunctas vidi, ut bipunctatam cum sexpunctata.*

- 13-pun- 20. C. coleoptris luteis: punctis nigris tredecim. *Faun.*  
**Etata.** *svec. 481.* *Scop. carn. 238.*  
*Reum. inf. 3 t. 31. f. 19.*  
*Habitat in Europæ Armoracia.*
- 14-pun- 21. C. coleoptris flavis: punctis nigris quatuordecim:  
**Etata.** quib' sdam contig' is. *Fn. svec. 482.\* Scop. carn. 243.*  
*Fisch. inf. 9. t. 17. f. 4, 5.*  
*Habitat in Europa.*
- 16 pun- 22. C. coleoptris flavis: punctis nigris tredecim: tribus  
**Etata.** infimis connexis. *Fn. svec. 483.\* Scop. carn. 240.*  
*Habitat in Europa.*
- ocellata. 23 C. coleoptris luteis: punctis nigris quindecim. *Faun.*  
*svec. 484.\**  
*Gadd sat. 26. Coccinella elytris flavo-luteis, punctis*  
*15 nigris ocello flavo cinctis.*  
*Merian. inf. 48. f. 5.*  
*Sulz. inf. t. 13. f. 14.*  
*Schaeff. ic. t. 1. f. 2.*  
*elem. t. 47. f. 1.*  
*Habitat in Europa.*  
*Hæc reliquis major.*
- 18-pun- 24. C. coleoptris flavis: punctis nigris octodecim: ulti-  
**Etata.** mo arcuato.  
*Habitat in Europa.*  
*Majuscula. Thorax lateribus flavus. Elytra flava*  
*punctis oblongiusculis, nigris, 9, quorum ultimum*  
*bamosum; sutura communis nigra. Subtus nigra.*
- 19-pun- 25. C. coleoptris flavis, punctis nigris novendecim. *Fn.*  
**Etata.** *svec. 485.\**  
*Habitat in Europa.*
- 22-pun- 26. C. coleoptris flavis: punctis nigris viginti duobus.  
**Etata.** *Fn. svec. 486.\* Geoffr. paris. 329. n. 17.*  
*Habitat in Europa.*  
*Thorax punctatus est.*
- 23-pun- 27. C. coleoptris rubris: punctis nigris viginti quinque.  
**Etata.** *Habitat in Germania. D. Schreber.*  
*Parva. Thorax ruber punctis 3 nigris. Elytra rubea:*  
*puncta 3 nigra; dein 4; tum 3; ultimo pun-*  
*ctum*

*ctum transversum ex duobus connatum; accedit pun-  
ctum scutellare commune; puncta omnia rotunda,  
distincta; Subtus etiam ruffa una cum pedibus.*

- 24-pun- 28. C. coleoptris rubris: punctis nigris viginti quatuor.  
Etata. *Faun. svec. 487. \* Geoffr. paris. I. p. 326. n. II.*  
*Scop. carn. 239.*  
*Habitat in Europa.*

- 25-pun- 29. C. coleoptris rubris: punctis nigris viginti quinque.  
Etata. *Fn. svec. 488. \**  
*Habitat in Europa.*  
*Puncta quadrata passim coalita.*

- conglo- 30. C. coleoptris rubris: punctis nigris plurimis subcon-  
bata. tiguis. *Fn. svec. 489. \* Geoffr. paris. 325. n. 12.*  
*Raj. inf. 87. n. 5.*  
*Frisch. inf. 9. p. 34. t. 17. f. 6.*  
*Habitat in Europa.*

- conglo- 31. C. coleoptris flavescentibus: punctis nigris plurimis  
merata. contiguis. *Fn. svec. 490. \**  
*Raj. inf. 87. n. 5.*  
*List. loqu. 383. n. 9.*  
*Frisch. inf. 9. t. 17. f. 4, 5.*  
*Habitat in Europa.*

\* \* *Coleoptris rubris flavisue: albo maculatis.*

- guttato- 32. C. coleoptris rubris: punctis albis quatuordecim, ni-  
punctata. gris tribus *Fn. svec. 491. \**  
*Habitat in Europa.*  
*Similis 10-pustulatae; an solo sexu differens?*

- 10-gutta- 33. C. coleoptris luteis: punctis albis decem.  
ta: *Habitat in Svecia. Fabricius.*  
*Minor. Puncta in singulo elytro 5, scilicet 2, 2, 1.*

- 14-gutta- 34. C. coleoptris rufis: punctis quatuordecim albis. *Fn.*  
ta. *svec. 492. \* Geoffr. paris. I. p. 327. n. 13. Scop.*  
*carn. 248.*  
*List. loqu. 383. n. 10.*  
*Raj. inf. 86. n. 3.*  
*Habitat in Europæ Salicibus.*

*Color testaceo-luteus. Elytra punctis 7, scilicet 1, 3, 2, 1. Thoracis laterā lunula alba. Caput nigrum, fronte testacea. Pedes testacci.*

16-gutta- 35. *C. coleoptris luteis: punctis albis sedecim.* Faun. svec. ta.

493. S. & D. carn. 249.

*Habitat in Europa.*

18-gutta- 36. *C. coleoptris rubris: punctis albis sedecim: duobus primis lunatis.* Faun. svec. 494. \*

*Habitat in Svecia.*

20-gutta- 37. *C. coleoptris rubris: punctis albis viginti.* Faun. ta.

svec. 495.

*Habitat in Europa.*

oblongo- 38. *C. coleoptris rubris: lineis punctisque albis.* Faun. guttata.

svec. 496.

*Habitat in Europa.*

oblitera- 39. *C. coleoptris flavis: punctis quatuor rufis: anticis obsoletis.* Fn. svec. 497. \*

*Habitat in Europa.*

\* \* \* *Coleoptris nigris: rubro maculatis.*

impustu- 40. *C. coleoptris nigris puncto nullo.*

lata. *Habitat in Germania.* D. Schreber.

*Statura C. 4-pustulata, tota atra nitida. Thoracis margo anticus & latera, in quibus punctum nigrum, flava.*

Cacti. 41. *C. coleoptris atris: maculis rubris duabus.* †

*Gron. zool. 609. Coccinella coleoptris marginatis nitidis atris, macula solitaria subrotunda utrinque.*

*Mer. surin. p. 2. t. 2. f. summa.*

*Pet. gaz. t. I. f. 5. Scarabæolus hemisphæricus cochineifer.*

*Sloan. jam. 2. t. 237. f. 31-33. ♂ t. 9. f. 13.*

*Habitat in America.*

*Similis C. bipustulata, etiam ab domine rubro, sed macula elytrorum longe major, simplicissima.* Gr.

42. C.

---

*Species maculis nonnumquam variant, unde incautis plures numerantur, nisi rationem thoracis habeant.*

- 2-pustu- 42. C. coleoptris nigris: punctis rubris duobus, abdomi-  
lata. ne fanguineo. *Fn. svec.* 4, S. \*  
*Frisch. inf.* 9. p. 34. t. 16. f. 6.  
*Raj. inf.* 2. scar. 3. p. 10. t. 3.  
*Geffr. paris.* 334. n. 26.  
*Habitat in Europæ Sorbis; in America septentriona-*  
*li. Kalm.*  
*Singulum punctum e tribus componitur.*
- 4-pustu- 43. C. coleoptris nigris: punctis rubris quatuor: interio-  
lata. ribus longioribus. *Fn. svec.* 499. \* *Scop. carn.* 244.  
*Habitat in Europæ Urticis, Rubis.*
- 6-pustu- 44. C. coleoptris nigris, punctis rubris sex. *Fn. svec.*  
lata. 500. \* *Geffr. paris.* 331. n. 20. *Scop. carn.* 245.  
*Raj. inf.* 87. n. 4.  
*Habitat in Europa.*
- 10-pustu- 45. C. coleoptris nigris: punctis fulvis decem. *Fn. svec.*  
lata. 501. \*  
*List. logia.* 383. n. 9:  
*Frisch. inf.* 9. t. 17. f. 4, 5.  
*Raj. inf.* 87. n. 15.  
*Habitat in Europa.*
- 14-pustu- 46. C. coleoptris nigris: punctis flavis quatuordecim. *Fn.*  
lata. *svec.* 502. \* *Geffr. paris.* 330. n. 18. *Scop. carn.*  
246.  
*Uddm. diff.* 15. Coccinella coleoptris nigris, maculis  
decem pallide flavis.  
*Pod. inf.* 26. Coccinella 14 maculata.  
*Habitat in Europa; in floribus Centaureæ Scabiosæ*  
*frequens.*  
*Maculae aliis flavæ, aliis fulvæ, aliis rubræ.*
- 16-pustu- 47. C. coleoptris nigris, punctis fulvis sedecim. *Faun.*  
lata. *svec.* 503.  
*Habitat in Europa.*
- \* \* \* \* *Coleoptris nigris albo flavove maculatis.*
- pantheri- 48. C. coleoptris nigris: punctis flavis octo. *Fn. svec.*  
na. 504. \*  
*Habitat in Europa.*

tigrina. 49. *C. coleoptris nigris: punctis albidis viginti, Faun. svec. 505. \**  
*Uddm. diff. 11. Coccinella coleoptris nigris, punctis viginti albis.*  
*Habitat in Europa.*

199. CHRYSOMELA. *Antennæ moniliformes, extorlum crassiores.*

*Thorax, nec elytra, marginatus.*

\* *Corpore ovato.*

gigantea. 1. *C. ovata nigra, coleoptris punctis fulvis numerosissimis.*

*Syst. nat. 10. p. 368. Coccinella gigantea.*

*Sultz. inf. t. 3. f. 15.*

*Habitat in India. De Geer.*

*Magnitudo Scarabæi stercorearum; Corpus nigrum, ovatum. Thorax marginatus, emarginatus. Antennæ clavatae ab que Palpis coccinellæ propriis. Elytra valde convexa, marginata, adspersa punctis numerosissimis, rufo-fulvis, in maculas saepe confluentibus.*

gibbosa. 2. *C. ovata nigra, elytris testaceis nigro punctatis: fascia media posticaque nigris. Amœn. acad. 6. p. 393. n. 13. \**

*Gron. zooph. 606. t. 14. f. 5. Coccinella.*

*Habitat Surinami.*

5 punctata. 3. *C. ovata, elytris nigris: punctis quinque rubris.*

*Gron. zooph. 613. t. 16. f. 7. Coccinella coleoptris nigris punctato-impressis: maculis decem rubris. \**

*Habitat in America.*

*Thorax, Abdomen, Alæque nigra. Elytra punctis magnis quinque: 2, 2, 1.*

göttin- 4. *C. ovata atra, pedibus violaceis. Faun. svec. 506. \**

*Rox. inf. 2 scar. 3. t. 5.*

*Habitat in Europa.*

5. C.

---

Chrysomelæ Larvæ consumunt folia, relictis saepe eorum vasis, pulpâ contentæ.

*castanea.* 41. *C. ovalis fuscata*, elytris margine exteriore castaneo.

*Amen. scad. 6. p. 394. n. 15.*

*Habitat Surinami.*

*analis.* 42. *C. ovata atra*, elytris fuscis margine exteriore testaceo.

*Habitat in Europa; ad Hammarby. J. C. Fabricius.*

*Corpus totum atrum, minus C. marginatae. Caput*

*& Thorax polita. Elytra fuscata margine exteriore  
testaceo. Antennæ vix basi ferrugineaæ.*

*coccinea.* 43. *C. ovata*, thorace emarginato sanguineo macula nigra, elytris sanguineis: maculis duabus nigris. *Fus.*

*svcc. 532. \**

*Uddm. diff. 13. Coccinella coleoptris rubris, macu-  
lis 4 nigris.*

*Habitat in Europa.*

*philadel-* 44. *C. ovata viridis*, elytris flavis: punctis virescentibus phica. oblongisculis, antennis peditusque ferrugincis.

*Habitat in Pensylvania. C. De Gcer.*

*3-macu-* 45. *C. ovata nigra*, elytris flavis: maculis tribus oblongis nigris: intermedia suturæ communis.

*Habitat in America calidore.*

*Corpus nigrum, minutum, forma Coccionellæ. Elytra  
pallide flava margine vix nigro: macula singulis ob-  
longa; intermedia communis suturam occupans ni-  
gra, reliquis aequalis.*

*america-* 46. *C. ovata viridi-aenea*, elytris lineis quinque rubris, na. alis sanguineis.

*Sultz. inf. t. 3. f. 16*

*Habitat in Barbaria, lecta inter Cocos officinarum.*

*Corpus totum aeneum, cæruleo-virescens, aeneum, ovale;  
subitus totum piceo-aeneum. Caput, Thorax & Elytra  
nigro viridi-cæruleo-lescentia. Elytron singulum pi-  
ctum lineis 5 longitudinalibus non punctatis, a basi ad  
apicem elytri exaratis; harum interior recta a basi  
ad apicem excurrit; at tertia & quarta basi  
connexa.*

*lineola.* 47. *C. ovata flava*, coleoptris punctis undecim lineisque duabus nigris.

*Habitat in America. Brunniche.*