

Ph. Zaitzev.

Zwei neue sibirische Dytisciden (*Coleoptera*).

I. *Coelambus reitteri*, sp. n.

♂ ♀. Ovalis, niger, nitidulus, haud pubescens. Supra pallide testaceus, vertice ad oculos, prothoracis basi angustissime infuscatus vittisque elytrorum quattuor sat latis in dimidio posteriore plus minusve confluentibus, nigris, quarum vitta externa medio minime vel haud interrupta, marginem basalem fere attingens, vittae internae antrorum medium superantes, tertia nonnunquam abbreviata; rarissime vittis omnibus tenuioribus valde abbreviatis, fere ut in *caspio*. Subtus niger, antennis, palpis apice infuseatis pedibusque testaceis. Caput sat dense ac forte, in occipite crebrius punctatum; frons utrinque foveâ et ad internam oculorum marginem impressione semicirculari angustissimâ instructa. Prothorax antrorum fortiter angustatum, lateribus parum rotundatis, angulis posticis subrectis obtusiuseulis, superficie fortius quam caput punctata. Elytra apice obtusata, sat fortiter dense punctulata, punctis majoribus in quattuor series longitudinales (suturalem, duas discoidales, humeralem) ordinatis, juxta scutellum atque apice fortius et irregulariter punctata. Superficies subtus minus nitida, metasterno glabro, coxae posticae punctis fortiter impressis adspersis; abdomen plus minusve alutaceum segmento primo secundoque crebre, ultimo minus fortiter et sparsim, ceteris ad latera subtiliter punctatis, omnibus indistincte ferrugineo-marginatis. Processus prosternalis postice carinatus.

♂. Tarsorum anticorum intermediorumque articuli basales tres modice dilatati.

Long. 3,5—4 mm., lat. 2 mm.

Sibirien: Gouv. Irkutsk (Fluss Maltinka beim Dorfe Malta, VI. 07 einige Stücke gesammelt von D. Smirnov), Nördl. Mongolei (Leder)¹⁾.

Die neue Art ist mit *caspicus* W enck. verwandt, aber von demselben durch Folgendes specifisch abweichend: Körper etwas kleiner,

¹⁾ Ich habe ein Stück mit dieser Patriaangabe von Herrn Edm. Reitter als *C. caspius* erhalten.

die Seiten des Halsschildes nach vorn viel mehr convergirend, Punktierung der Flügeldecken deutlicher, die Punkte in der Nähe des Schildchens grösser (obwohl nicht so stark als bei *confluens*), die schwarzen Linien auf den Flügeldecken breiter, nach vorn mehr ausgedehnt, nach hinten fast immer zusammenfliessend. Unterseite kräftiger punktiert, besonders auf dem Analsternit.

Von *confluens* Fabr. ist unsere Art durch die hinten gerundeten Flügeldecken, den ovalen Körper u. a. verschieden.

2. *Hydroporus (Deronectes) formaster*, sp. n.

♂. Ovalis, angustulus, nitidiusculus, parum pubescens (postrorsum distinctius), supra testaceus, prothorace utrinque ad basin signaturā transversali obliquā, elytris suturā, lineā suturali angustissimā (nonnunquam in puneta numerosa translucentia diffluxā) vittisque sex longitudinalibus latiusculis, basin attingentibus, in itinere suo haud confluentibus, postice conjunctis, externis earum interruptis, nigris; subtus opacus, niger, epipleuris, antennis, palpis pedibusque testaceis, antennarum palporumque articulis ultimis ad apicem, tarsis tibiarum posteriorum summa apice denigratis, abdominis segmento anali rufescente. Caput alutaceum, utrinque ad oculos impressione punctato et prope orbitam canalieulā sat profundā instructum. Prothorax antrorsum haud valde, postrorsum nihilo angustatus, lateribus vix rotundatis, tenuiter sed distinete marginatis, marginibus nitidis; alutaceus atque disperse punctulatus, ad marginem interiorem punctis majoribus nonnunquam in seriem duplicatam ordinatis, angulis anticis prominulis, acutis, posticis obtusatis subrectis, basi utrinque juxta processum scutellarem bisinuatus. Elytra apice sine denticulo, microscopice reticulata, areolis rotundulis, praeterea sat dense punctulata, punctorum impressorum seriebus tribus subobsoletis; epipleuris minus marginatis. Subtus alutaceus. Processus prosternalis postice longus atque angustulus, carinulatus. Laciniae metasterni angustissimae, lingulatae. Pedes crassiusculae, tibiis nitidis, una serie punctorum majorum instructis, tarsorum anteriorum atque posteriorum articulis tribus valde dilatatis, unguiculis longis, aequalibus

Long. 5—5 $\frac{3}{4}$ mm., lat. 2 $\frac{1}{2}$ —2 $\frac{3}{4}$ mm.

Sibirien (im Süden des Gouv. Irkutsk): Fluss Sagan-Char, 15. VII. 1873. Drei Stücke, von Herrn Hartung gesammelt.

Diese neue Art erinnert etwas durch seinen Habitus an einige grosse *Coelambus*-Arten. Nach den Bestimmungstabellen Seidlitz's steht sie in der Nähe des *D. griseostriatus* Deg., aber durch die glänzendere Oberseite, die wenig nach vorn convergirenden Seiten des Halsschildes, den einfarbig rotgelben Kopf und besonders durch die (nur sechs) nicht zusammenfliessenden breiten Längsbinden auf den Flügeldecken ganz verschieden.