

**Genus Taphrocerus Solier**

1. *Taphrocerus tenuis* Kirsch. — Décrit comme *Brachys tenuis* Kirsch, l. c. p. 351. (E typo.)

**Genus Brachys Solier**

1. *Brachys carinicornis* Kirsch. — C'est la seule véritable espèce de ce genre, décrite par Kirsch, l. c. p. 352. (E typo.)

\*

On doit changer quelques noms:

*Leiopleura tristicula* n. n. — Syn.: *Leiopleura tristis* Kerr. Mém. Soc. Ent. Belg. 1897, p. 142 (nom préoccupé par Kirsch: *Leiopleura (Brachys) tristis* Kirsch, Berl. Entom. Zeitschr. XVII. 1873, p. 355).

*Taphrocerus Fisherellus* n. n. — Syn.: *Taphrocerus tenuis* Fisher, nom. préoccupé par Kirsch: *Taphrocerus (Brachys) tenuis*, Berl. Entom. Zeitschr. XVII. 1873, p. 351.

Ing. C. Jar. Sekera:

**DVĚ DALŠÍ NOVÉ ODRŮDY JUDOLIA SEXMACULATA L.  
Z VYS. TATER. (COL. CERAMB.)**

**Judolia sexmaculata L. a. matliarensis n.**

Fascia prima nigra elythrorum in quinque maculas divisa: una macula suturali communi, utrinque una discali unaque laterali. Fascia secunda ad suturam interrupta, tertia indivisa. — Patria: Montes Vys. Tatry, Slovakia.

První černá páska na krovkách je rozdělena na 5 skvrn, a to jednu společnou na švu, dále po jedné laterální a jedné diskální skvrně. Druhá páska je na švu rozdělena, třetí normální.

Tato nová odrůda je velmi podobná a. *infrequens* Heyr., ale druhá páska na švu je rozdělena.

Jeden kus chytil můj přítel pan RNST Jiří Čepelák v Matliarech ve Vysokých Tatrách.

**Judolia sexmaculata L. a. Heyrovskýana n.**

Fascia prima nigra elythrorum in sex maculas divisa: utrinque una macula suturali, una discali unaque laterali. Fascia secunda tertiaque indivisa. — Patria: Montes Vys. Tatry, Slovakia.

Jako a. *carpathica* Heyr., ale druhá páska není na švu rozdělena.

Jeden kus chytil jsem rovněž v Matliarech ve Vysokých Tatrách. — Věnuji tuto novou odrůdu k počtě pana Dr. L. Heyrovského, našeho zasloužilého znalce tesaříků.