

РУССКОЕ ЭНТОМОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ

ОСНОВАННОЕ

Д. К. Глазуновым, П. Р. Кокуевым, П. Я. Кузнецовым, А. П. Семеновым-Тянь-Шанским, Т. С. Чичериним, П. П. Ширяевым и А. П. Яковлевым

ОРГАН

Русского Энтомологического Общества

ПОД РЕДАКЦИЕЙ

П. Я. Кузнецова

REVUE RUSSE D'ENTOMOLOGIE

FONDÉE PAR

D. Glazunov, A. Jakovlev, N. Kokuev, N. Kusnetzov, A. Semenov-Tian-Shanskij,
N. Shirjaev et T. Tshitsherin

PUBLIÉE PAR

la Société Entomologique de Russie

RÉDACTEUR

N. J. Kusnetzov

T. XX

1926, № 1—2



ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ НАУЧНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ (ГЛАВНАУКА)

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МОСКВА 1926 ЛЕНИНГРАД

V. Barovskij.

De genere novo Coccinellidarum (Coleoptera).

В. Баровский.

Новый род семейства Coccinellidae (Coleoptera).

Aaages, ¹ gen. n. Coccinellidarum.

Corpus breviter ovale, parum convexum. Antennae satis longae, clava compacta, articulo paenultimo inter vicinos curto latissimoque. Palporum maxillarium articulus ultimus fortiter oblique truncatus. Pronotum transversum, longitudine duplo latius, elytris multo angustius, antrorsum magis angustatum, margine antico et postico bisinuato, angulis anticis fere acutis, posticis rotundatis (utrinque) marginatis, marginibus lateralibus arcuatis, late marginatis, ad angulos posticos foveola rotunda sat profunda ornatum. Elytra ad humeros pronoto latiora, ad finem secundi suturae trientis latissima, dorso arcuatim convexa, epipleuris concavis utrinque marginatis, sparsim punctatis. Prosternum convexum, tumulo minusculo ad marginem anticum medio sito praeditum, antice marginatum. Mesosternum quoque antice marginatum, medio leniter sinuatum. Sternitum abdominale primum lineis femoralibus bene expressis, dimidio angulatis, obliquis, parte inferiore subrectilinea, parte exteriori arcuata, metasternum tamen non attingentibus. Tibiae posteriores quattuor bicalcaratae. Tarsi unguiculis vix ante medium (0,4) dente acuto armatis. Intima genitalium pars, a cl. Th. Dobrzhanskij edocta, praesertim in ♂ valde peculiariter constructa et inter genera affinia distinctissima. Genus quoad signa exteriora inter genera *Adaliam* Müls. et *Coccinellam* L. quasi intermedium.

A. prior, sp. n.

Breviter ovalis, niger, parum punctatus, elytris pallido-flavis, singulis non solum externe, sed etiam sutura nigro-marginatis, 3-nigro maculatis, maculisque in linea recta medio utriusque elytri longitudi-

¹ Ἀααγγής, ἐς — infragilis (cf. Коссович, И. Русско-греческий словарь 1848, I, стр. 1).

naliter dispositis, fere aequalibus, nonnihil transversis. Caput nigrum, fronte utrinque macula juxtaorbitali flava excepta, crebre punctatum interspatiis punctorum rugosiusculis, labro picescenti. Pronotum transversum, longitudine duplo latius, nigrum, angulis anticis lae, duabus maculis medio in linea recta ab oculis ducta dispositis flavis, sat crebre punctatum, interspatiis punctorum subtiliter rugulosis. Epimera meso- et metasterni atque pars dimidia postica mesepisternorum eburneo-albida. Metasternum transversum rugulosum. Pedes griseo-pilosi, nigri, femoribus anticis in partem ad tibiam spectante eburneo-albidis, nigromarginatis, tarsis picescentibus. Coxis anticis in ♀ antice maculis duabus lituratis ornatis; tarsis articulo ultimo in mare subdilato. Proepisternis extus eburneo-albidis, antice externe et postice tenuiter nigrocinctis. Elytra pallide-flava, nigromarginata, sat dense punctata, callis humeralibus exceptis, ubi fere laevibus, 6-maculata, maculis 1, 1, 1, positis: 1-a ad humerum, 2-a extremitati medio contra mediam partem suturae sita, 3-a antepicali, omnibus magnitudine aequali, quodam modo angulosis.

Patria: ♂ jugum montium Burchan-Budda, Nomochun, 12—14.000', V. 1900, exped. P. Kozlov!; ♀: Mongolia mer.-or.: montes Alashan, 20. VI. 1873, N. Przewalski!

Описываемый новый род является как бы промежуточным между родами *Adalia* Muls. и *Coccinella* L., по строению же внутренних половых органов, особенно у ♂, является совершенно исключительным. От видов, принадлежащих к соседним родам, описываемый вид с первого взгляда отличается расположением пятен и рисунка на надкрыльях: каждое надкрылье окаймлено узкой черной полоской не только с наружного, но и с внутреннего края, т.-е. со стороны шва, и имеет три черных же почти круглых пятна, лежащих друг за другом по длине надкрылья и отделенных друг от друга интервалами немного большими, чем сами пятна; подобная комбинация рисунка не встречается ни у одного вида близких к описываемому родов.