

**Familia: Coccinellidae** – katicabogarak

■ **Subcoccinella vigintiquatuorpunctata** – lucernaböde

*jell:* 3-4 mm, majdnem kerek, alapszíne téglavörös v. vörösbarna, mindkét szárnyfedőn 12 fekete folt (ill. változatok), a fej a tapogatók és a csápok vörösek,

*életm.:* L1-4, bivoltin, imágó telet, tavaszi rajzás: IV-V., peterakás: levél fonákra

*elt.:* Európa, Kis-Ázsia, Észak-Afrika

*tápn:* polifág: lucerna, vörös here, cukor- és takarmányrépa, kerti szegfű, burgonya stb.

*kár:* lárva és imágó: hámozgatás főleg a szártetőző leveleken, a rügyet, bimbót és a virágot is megrágja.



**Familia: Nitidulidae** – fénybogarak

■ **Meligethes aeneus** – repce-fénybogár

*jell:* 1,5-2,7 mm, a test oldalvonalai párhuzamosak hátul csaknem derékszögben záródnak, színe sötétzöld v. kék, az 1. láb sötétbarna

*életm.:* univoltin, imágó telet, bimbóba petézik

*elt.:* Európa, Észak-Afrika, Szibéria, Észak-Amerika

*tápn:* repce, mustár, keresztvirágú gyomok

*kár:* lárva: virágpont fogyaszt; imágó: virágpont fogyaszt és a bimbóba berágja magát (peterakás)

**Familia: Chryptophagidae** – penészbogarak

■ **Atomaria linearis** – törpe répabogár

*jell:* 1,2-1,5 mm, hosszúkas, lapos barnászörös, lesimuló szürke szőrökkel

*életm.:* imágó telet, talajba petézik, nagyon mélyen bábozódik, univoltin

*elt.:* Európa kivéve Dél-Európa, Nyugat-Ázsia

*tápn:* polifág, cukor- és takarmányrépa, retek, paraj

*kár:* lárva: gyökereket rág; imágó: talajfelszín közeli növényi részeket és leveleket rág.