

CAROLI LINNÆI

EQUITIS DE STELLA POLARI,

ARCHIATRI REGII, MED. & BOTAN. PROFESS. UPSAL.;

ACAD. UPSAL. HOLMENS. PETROPOL. BEROL. IMPER.

LOND. MONSPEL. TOLOS. FLORENT. SOC.

SYSTEMA  
NATURÆ

PER

REGNA TRĪA NATURÆ,

SECUNDUM

CLASSES, ORDINES,  
GENERA, SPECIES,

CUM

CHARACTERIBUS, DIFFERENTIIS.  
SYNONYMIS, LOCIS.

TOMUS I.

---

EDITIO DECIMA, REFORMATA.

*Cum Privilegio S:æ R:æ M:tis Sveciæ.*

---

HOLMIÆ,

IMPENSIS DIRECT. LAURENTII SALVII,

1758.

S:Æ R:Æ M:TIS SUMMÆ FIDEI VIRO  
*CELSISSIMO ILLUSTRISSIMO* *que*  
*COMITI*

**D:NO CAR. G. TESSIN,**

REGIS REGNIQUE SVIOGOTHICI SENATORI,  
REGIÆ CANCELLARIÆ PRÆSIDI,  
AD AULAM REGIARUM CELSITUDINUM SUMMO  
MARESCHALLO,  
EDUCATIONI SERENISS. PRINCIPIS GUSTAVI PRÆFECTO,  
CANCELLARIO ACADEMIÆ ABOENSIS,  
ORDINIS S:Æ R:Æ MAJEST. SERAPHINORUM EQUITI AURATO  
ET COMMENDATORI, EQUITI AURATO DE AQUILA NIGRA,  
NEC NON OMNIUM S:Æ R:Æ MAJEST. SVECICÆ  
ORDINUM CANCELLARIO

*SACRUM.*

**C**um quivis auctor speret se apud posteros gratiam  
habere & posse secum duratura nomina educere,  
AUCTORI meæ fortunæ Libellum decimò nunc offero ;  
ILLE me, peregrinum in patria, reducem excepit ;  
ILLE mihi Stipendium ab Ordinibus regni expetiit ;  
ILLE mihi spartam Medici classici procuravit ;  
ILLE mihi Munus, quo fungor, conciliavit ;  
ILLE mihi Titulum, quo distinguor, paravit ;  
ILLE me ad Sereniss. Reges introduxit ;

*ILLE* meas errare boves ut cernis & ipsum  
ludere quæ vellem calamo permisit agresti ;

quare

*cana prius gelido desint absinthia ponto  
quam immemor vivam*

**TANTI MÆCENATIS**

Upsaliæ 1757, .  
d. 24 Maji.

*Cultor devotissimus*  
C. LINNÆUS.

*Habitat in India. De Geer.*

- Thorax immaculatus. Elytra latissima, margine undique etiam suturæ longitudinalis nigra. Linea longitudinalis nigra per medium singuli elytri. Linea inter præcedentes longitudinales nigra utrasque combinat. Femina habet lineas dimidiatas transversales tres.
- jamai- 13. *C. luteo-ænea*, elytris immaculatis excavato-punctatis.  
censis. *Sloan. jam. 2. p. 208. t. 233. f. 27. 28.*  
*Habitat in America.*
- cyanea. 14. *C. cyaneo-ænea*, elytris immaculatis excavato-punctatis.  
*Pet. gaz. t. 57. f. 6.*  
*Habitat in Brasilia.*
- inæqua- 15. *C. ferrugineo-ænea*, elytris macula flava subovata di-  
lis. sci: *Mus. petrop. 650. n. 130.*  
*Habitat in America. Rolander.*  
*Elytrorum superficies inæqualis est.*
- lateralis. 16. *C. fusco-ænea*, elytris macula flava laterali.  
*Habitat in America. Rolander.*
- discoi- 17. *C. viridi-ænea*, elytris maculis duabus flavis disci.  
des. *Habitat in America. Rolander.*
- petiveria- 18. *C. nigra*, elytris maculis quatuor flavescentibus.  
na. *Pet. gaz. 7. t. 71. f. 1. Ast. angl. 271. p. 861.*  
*Habitat in Asia.*

**175. COCCINELLA.** *Antennæ* subclavatæ, truncatæ.  
*Palpi* clava semicordata.  
*Corpus* hemisphæricum, tho-  
race elytrisque marginatis,  
Abdomine plano.

• *Coleoptris rubris flavisque; Punctis nigris maculatis.*

- unipun- 1. *C. coleoptris* flavescentibus: puncto communi nigro.  
ctata. *Habitat in Europa.*
- 2-puncta- 2. *C. coleoptris* rubris: punctis nigris duobus. *Fr. succ.*  
ta. 388.

*Pet. gaz.* 34. t. 21. f. 4.

*Merian. inf.* 69. t. 136.

*Raj. inf.* 86. n. 2.

*Frisch. inf.* 9. p. 33. t. 16. f. 4.

*Habitat in Europæ Alnetis.*

*Puncta duo in medio coleoptrorum.*

*List. loqu.* 383. n. 8.

*Bradl. natur.* t. 27. f. 4.

*Reaum. inf.* 3. t. 31. f. 16.

3-puncta-3. C. coleoptris rubris: punctis nigris tribus.  
ta.

*Habitat in Europa.*

*Puncta duo ad apicem coleoptrorum.*

hebræa. 4. C. coleoptris luteis: maculis nigris sex longitudinalibus  
difformibus.

*Habitat in Europa.*

5-puncta-5. C. coleoptris sanguineis: punctis nigris quinque. *Fn.*  
ta.

*svec.* 392.

*Habitat in Pruno spinosa.*

*Elytra sanguinea sunt.*

trifascia-6. C. coleoptris rubris: fasciis nigris tribus. *Faun. svec.*  
ta.

390.

*Habitat in Lapponia.*

hieroglyphica. 7. C. coleoptris luteis: maculis duabus nigris longitudina-  
libus sinuatis.

*Habitat in Svecia.*

7-puncta-8. C. coleoptris rubris: punctis nigris septem. *Fn. svec.*  
ta.

391.

*Frisch. inf.* 4. p. 1. t. 1. f. 4.

*Raj. inf.* 86. n. 1.

*Pet. gaz.* 33. t. 21. f. 3.

*Merian. eur.* 24. f. 11.

*Gæd. inf.* 2. p. 58. t. 18.

*Alb. inf.* 61. f. C.

*Rœs. inf.* 2. scar. 3. p. 7. t. 2.

*Reaum. inf.* 3. t. 31. f. 18.

*Bradl. nat.* t. 27. f. 4.

*Habitat in Europæ agris & plantis.*

9-puncta-9. C. coleoptris rubris: punctis nigris novem.

ta.

*Uddm. diff.* 14. Coccinella nigra, elytris rubris, punctis novem nigris.

*Habitat in Europæ Juniperetis.*

10-punctata. 10. C. coleoptris fulvis: punctis nigris decem.

ta.

*Habitat in Europa.*

II. C.

Coecinellæ Larvæ Aphides consumunt, eoque plantas a Phthiriasi hac purgant.

- 11-pun- 11. *C. coleoptris rubris* : punctis nigris undecim. *Faun.*  
ctata. *svec.* 394.  
*Merian. europ.* 168.  
*Habitat in Europa.*
- 13-pun- 12. *C. coleoptris luteis* : punctis nigris tredecim. *Fm. svec.*  
ctata. 395.  
*Habitat in Europæ Armoracia.*
- 14-pun- 13. *C. coleoptris flavis* : punctis nigris quatuordecim : qui-  
ctata. busdam contiguis. *Fm. svec.* 396.  
*Habitat in Europa.*
- ocellata. 14. *C. coleoptris luteis* : punctis nigris quindecim. *Faun.*  
*svec.* 398.  
*Gadd sat.* 26. *Coccinella elytris flavo-luteis*, punctis  
15 nigris oculo flavo cinctis.  
*Merian. inf.* 48. f. 5.  
*Habitat in Europa.*  
*Hæc reliquis major.*
- 19-pun- 15. *C. coleoptris flavis* : punctis nigris novendecim.  
ctata. *Habitat in Europa.*
- 22-pun- 16. *C. coleoptris flavis* : punctis nigris viginti duobus.  
ctata. *Fm. svec.* 401.  
*Habitat in Europa.*  
*Thorax punctatus est.*
- 24-pun- 17. *C. coleoptris rubris* : punctis nigris viginti quatuor.  
ctata. *Fm. svec.* 402.  
*Habitat in Europa.*
- 25-pun- 18. *C. coleoptris rubris* : punctis nigris viginti quinque.  
ctata. *Habitat in Europa.*
- conglom- 19. *C. coleoptris rubris* : punctis nigris plurimis subcon-  
bata. tiguis. *Fm. svec.* 403.  
*Frisch. inf.* 9. p. 34. t. 17. f. 6.  
*Habitat in Europa.*
- conglom- 20. *C. coleoptris flavescens* : punctis nigris plurimis  
merata. contiguis. *Fm. svec.* 404.  
*Raj. inf.* 87. n. 15. *List. loqu.* 383. n. 9.  
*Frisch. inf.* 9. t. 17. f. 4. 5.  
*Habitat in Europa.*

\* \* *Coleoptris rubris flavisve: albo maculatis.*

- guttato-  
punctata. 21. *C. coleoptris rubris*: punctis albis quatuordecim, nigris tribus.  
*Habitat in Europa.*
- 14-gut-  
tata. 22. *C. coleoptris rubris*: punctis quatuordecim albis. *Fn. svec. 397.*  
*List. loqu. 383. n. 10.*  
*Habitat in Europæ Salicibus.*
- 16-gut-  
tata. 23. *C. coleoptris rubris*: punctis albis sedecim. *Fn. svec. 399.*  
*Habitat in Europa.*
- 18-gut-  
tata. 24. *C. coleoptris rubris*: punctis albis sedecim: duobus primis lunatis.  
*Habitat in Svecia.*
- 20-gut-  
tata. 25. *C. coleoptris rubris*: punctis albis viginti. *Fn. svec. 400.*  
*Habitat in Europa.*
- oblongo-  
guttata. 26. *C. coleoptris rubris*, lineis punctisque albis. *Fn. svec. 389.*  
*Habitat in Europa.*
- oblitera-  
ta. 27. *C. coleoptris flavis*: punctis quatuor rufis: anticis obsoletis.  
*Habitat in Europa.*
- \* \* \* *Coleoptris nigris: rubro maculatis.*
- 2-pustu-  
lata. 28. *C. coleoptris nigris*: punctis rubris duobus, abdomine sanguineo. *Fn. svec. 409.*  
*Frisch. inf. 9. p. 34. t. 16. f. 6.*  
*Rœs. inf. 2. scar. 3. p. 10. t. 3.*  
*Habitat in Europæ Sorbis; in America septentrionali.*  
*Kalm.*  
*Singulum punctum e tribus componitur.*
- 4-pustu-  
lata. 29. *C. coleoptris nigris*: punctis rubris quatuor: interioribus longioribus. *Fn. svec. 408.*  
*Habitat in Europæ Urticis, Rubis.*
- 6-pustu-  
lata. 30. *C. coleoptris nigris*, punctis rubris sex. *Fn. svec. 407.*  
*Raj. inf. 87. n. 4.*  
*Habitat in Europa.*

10-pustu-31. *C. coleoptris nigris*: punctis fulvis decem. *Fn. suec.* 404.  
lata. *Frisch. inf.* 9. t. 17. f. 4. 5. *List. loq.* 383. n. 9.  
*Raj. inf.* 87. n. 15.  
*Habitat in Europa.*

14-pustu-32. *C. coleoptris nigris*: punctis rubris quatuordecim. *Fn.*  
lata. *suec.* 406.  
*Uddm. diff.* 15. *Coccinella coleoptris nigris*, maculis  
decem pallide flavis.  
*Habitat in Europa.*  
*Maculae aliis flavæ, aliis fulvæ, aliis rubræ.*

16-pustu-33. *C. coleoptris nigris*, punctis fulvis sedecim.  
lata. *Habitat in Europa.*

gigantea. 34. *C. coleoptris nigris*: punctis fulvis numerosissimis.  
*Habitat in India. De Geer.*  
*Gigas in hac gente, & Scarabæo stercorario par, media*  
*inter Coccinellas & Chrysomelas. Corpus nigrum o-*  
*vatum. Thorax marginatus & emarginatus. An-*  
*tennæ clavatæ. Elytra valde convexa marginata,*  
*punctis, in maculas sæpe confluentibus, numerosissi-*  
*mis, rufo-fulvis adpersa.*

• • • • *Coleoptris nigris albo flavove maculatis.*

pantheri-35. *C. coleoptris nigris*: punctis flavis octo.  
na. *Habitat in Europa.*

tigrina. 36. *C. coleoptris nigris*: punctis albidis viginti. *Fn. suec.*  
405.  
*Uddm. diff.* 11. *Coccinella coleoptris nigris*, punctis  
viginti albis.  
*Habitat in Europa.*

176. CHRYSOMELA. *Antennæ* moniliformes, ex-  
trorsum crassiores.

*Thorax*, nec elytra, margi-  
natus.

• *Corpore ovato.*

göttin-1. *C. ovata atra*, pedibus violaceis.  
gensis. *Roes. inf.* 2. scar. 3. t. 5.  
*Habitat in Germania. P. Forskåhl.*