



CAROLI LINNÆI,

*EQUIT. ASTR. DE STELLA POLARI;
ARCHIATR. REG. MED. & BOTAN. PROFESS. UPSAL. ET AL.*

FAUNA SVECICA

SISTENS
Animalia SVECIAE Regni:
MAMMALIA, AVES, AMPHIBIA,
PISCES, INSECTA, VERMES.

DISTRIBUTA

PER

CLASSES & ORDINES,
GENERA & SPECIES,

CUM

DIFFERENTIIS SPECIERUM,
SYNONYMIS AUCTORUM,
NOMINIBUS INCOLARUM,
LOCIS NATALIUM,
DESCRIPTIONIBUS INSECTORUM.

EDITIO ALTERA, AUCTIOR.

Cum Privilegio S. R. M:titis Sveciae & S. R. M:titis Polonie ac Electoris Saxon.

STOCKHOLMIÆ,
Sumtu & Literis Direct. LAURENTII SALVII,

1761.

DESCR. admodum similis est primæ. Est enim dimidio minor, colore griseus, punctis inæqualibus nigris adspersa & inde nebulosa. *Clypeus* lunam refert, antice minime emarginatus, totus levus, nec maculatus, sed pallidus. *Elytra* rugosa punctis excavatis striata, striis curvis & flexuosis. *Corpus* nigrum, totum clypeo & elytris absconditum. *Antennæ* nigræ, filiformi-clavatae; margo coleoptrorum, in hac, proeminet ut in præcedenti.

469. CASSIDA *nobilis* grisea, elytris linea cærulea nitidissima.
Habitat in Hortis.

DESCR. Capitis clypeus integer. *Antennæ* subclavatae, nigræ, basi pallide. *Corpus* supra pallide griseum, subtus nigrum. Linea cærulea nitidissima in singulo elytro juxta suturam longitudinalem, quæ evanescit cum vita.

Coccinella.

470. COCCINELLA *unipunctata*, coleoptris flavescentibus:
puncto communi nigro.

Habitat in Plantis.

DESCR. Corpus nigrum cum capite & thorace. *Elytra* pallida cum puncto communi in medio suturæ. *Antennæ* nigræ. *Thoracis* margines laterales latefentes. *Magnitudo* dupla pediculi. *Pedes* ferruginei.

471. COCCINELLA *bipunctata* coleoptris rubris: punctis nigris duobus. Fn. 388.

Merian. europ. 3. p. 58. t. 35. f. infima. s. p. 69. t. 136.

List. loqu. p. 383. n. 8. Scarabæus alter niger exiguus, pennarum crustis miniatulis, in quibus mediis duæ tantum maculæ nigræ.

Raj. inf. p. 86. n. 2. Scarabæus hæmisphæricus minor; elytris e flavo rubentibus, singulis maculis s. punctis nigris media parte notatis.

Petiv. gaz. p. 34. t. 21. f. 4. Coccionella anglica bimaculata s. minor rubra.

Bradl. natur. t. 27. f. 4.

Frisch. germ. 9. p. 33. t. 16. f. 4. Coccinella secundæ magnitudinis, punctis coleoptrorum duobus.

Habitat in *Alno*, ubi aphides devorat Larva.

DESCR. Abdomen, antennæ, pedes & omnia terram spectantia, nigra. Thorax niger macula lateralí alba: puncta duo alba minima ad basin Thoracis & totidem similia ad antennarum insertionem. *Elytra* rubra puncto, in utriusque medio, nigro.

472. COCCINELLA *tripunctata* coleoptris rubris: punctis nigris tribus.

Habitat in Plantis.

154 INSECTA COLEOPTERA. COCCINELLA.

DESCR. *Corpus* præcedente paulo minus. *Thorax* ater macula alba ad utrumque latus. *Elytra* rubra cum puncto communi versus basin & solitariis versus apicem. *Caput* superius punctis duobus minimis albis.

473. COCCINELLA *bebraea* coleoptris luteis: maculis nigris sex longitudinalibus..

Habitat apud nos rarius.

DESCR. *Corpus* plerisque nostratis majus. *Caput* nigrum punctis duobus albis. *Thorax* niger, albido variegatus. *Elytra* lutea, margine nigra, pecta lineis nigris tribus, longitudinalibus, latiusculis, quarum extima longior ad basin incurvata, in punctum definens majusculum.

474. COCCINELLA *quinquepunctata* coleoptris sanguineis: punctis nigris quinque. Fn. 392.

Habitat in agris inter segetes, & in Pruno spinosa.

DESCR. Magnitudo minor, in singulo elytro (excepta macula basalis nigro-alba,) duo puncta, quorum quod in medio majus, quod versus apicem minus. *Thorax* niger, utrinque albus. *Frons* duobus punctis albis.

475. COCCINELLA *trifasciata* coleoptris rubris: fasciis nigris tribus. Fn. 390.

Raj. inf. 87. n. 9. Scarabæus hæmisphæricus minor, elytris ex albo liventibus: lineolis nigris in medio dorso pectis.

Habitat in Lapponia desertis.

DESCR. *Thorax* niger lateribus albis: puncta duo alba ad antenarum exortum. *Elytra* rubra lineis tribus transversis latiusculis obtusis nigris, quarum quæ pectori proxima ambo elytra conjungit; duæ autem reliquæ posteriores ad marginem interiorem elytrorum non extenduntur, hinc abruptæ in medio dorso.

476. COCCINELLA *bieroglyphica* coleoptris luteis: maculis nigris duabus longitudinalibus sinuatis.

Habitat rarius apud nos.

DESCR. maxime affinis est Cocc: decempustulata.

477. COCCINELLA *septempunctata* coleoptris rubris: punctis septem nigris.

Hollar. inf. t. 7. f. 8.

Alb. inf. t. 61. f. C.

Gæd. belg. 2. p. 58. t. 18.

List. gæd. p. 268. f. 112.

mut. t. 17. f. 2.

Mer. europ. 2. p. 24. t. 11. f. p. 76. t. 149.

INSECTA COLEOPTERA. COCCINELLA. 155

Petiv gaz. p. 93. t. 21. f. 3. *Cochinella anglica vulgatissima* s. *rubra*, septem nigris maculis punctata.

Raj. inf. 86 n. 1. *Scarabæus subrotundus* s. *hæmisphæricus* rubens major vulgatissimus.

Frisch. germ. 4 p. 1. t. 1. f. 4. *Coccionella major.*

Suecic Åkerthöns, Nyckelpiga, Jungfru Mariæ Höna.

Habitat in sepibus & agris vulgatissima, aphides devastans.

DESCR. Caput nigrum: fronte punctis duobus albis. Thorax niger, utrinque ad latera albus. Elytra rubra, in singulo puncta tria nigra æqualiter remota; at ad basin elytrorum punctum utraque elytra conjungens nigrum antice album. Antennæ minimæ, clavatæ. Animal subitus atrum. Larva cinerea: maculis nigris & albis adspersa. Puppa lutea, maculis nigris & quasi deusta, ano adfixa.

478. *COCCINELLA novempunctata coleoptris rubris: punctis nigris novem.*

Habitat in Plantis.

DESCR. Caput punctis duobus albis in fronte. Thorax niger maculis solitariis lateralibus albis. Elytra singula punctis nigris duorum parium, & communis baseos nigra, antice alba.

479. *COCCINELLA decempunctata coleoptris fulvis: punctis nigris decem.*

Habitat in Plantis.

DESCR. Caput nigrum macula alba frontis tridentata. Thorax maculis quatuor albidis. Elytra fulva margine exteriore flavo, notata puncto nigro ad basin, tribusque transversum positis in medio, & minimo ad apicem elytri. Pedes pallidi.

480. *COCCINELLA undecimpunctata coleoptris rubris: punctis nigris undecim.* Fn. 394.

Aet. upf. 1736. p. 18. n. 2. *Coccinella punctis undecim.*

Habitat in sepibus.

DESCR. Inter minimas hujus generis species hæc est. Puncta in singulo elytro quinque parva, sextum majus est tenui extendens ad utrumque elytron. Thorax niger punctis duobus albis.

481. *COCCINELLA tredecimpunctata coleoptris luteis: punctis nigris tredecim.* Fn. 395.

Aet. upf. 1736. p. 18. n. 3. *Coccinella punctis duodecim.* Habitat in Armoracia.

DESCR. Corpus magnitudine inter maximas & minimas medium. Thorax niger lateribus utrinque albus cum puncto nigro. Elytra lutea: puncta in singulis sex nigra, quorum duo in medio elytri fere contigua; unicum punctum nigrum ad basin elytri connectit utramque crux, adeoque impar est. Abdomen ad latera luteum. Antennæ & os at Tibia luteæ. Femora nigra.

156 INSECTA COLEOPTERA. COCCINELLA.

482. COCCINELLA *quatuordecimpunctata* coleoptris flavis: punctis nigris quatuordecim: quibusdam contiguis. *Fn.* 396.

Habitat in *Scania*. *D. Leche.*

DESCR. est inter parvas sui generis. *Elytra flava*, quorum in singulo puncta duo paria oblonga, distincta sutura longitudinali nigra, cum qua una in singuli elytri medio connata quadrangularis, dein alia connata cum opposita in formam trianguli: punctum terminale elytri etiam adnexum suturæ longitudinali. *Thorax* a tergo postice tectus macula magna nigra anterius tetaloba!

483. COCCINELLA *sedecimpunctata* coleoptris flavis: punctis nigris sedecim: tribus infimis connexis.

Habitat *Calmariæ*. *Ad. Modeer.*

DESCR. Minor est reliquis nostratis. *Thorax* flavus: punctis 3 utrinque connexis. *Elytra flava*: punctis 5 longitudinaliter prope suturam dorsalem disposita, rotunda; & 5 intra marginem inferiorem; quorum omnia, excepto primo, connexa. Sed dubium utrum haec puncta connexa sint numeranda tria aut quatuor. *Femora* nigra. *Tibiae* flavae.

484. COCCINELLA *ocellata* coleoptris luteis: punctis quindecim nigris ocellatis. *Fn.* 398.

Habitat in *Horto Academicō rarius*.

DESCR. Est inter majusculas sui generis. *Caput* nigrum punctis duobus in fronte. *Thorax* niger, utrinque albus, puncto nigro, ut in plerisque; in singulo *Elytro* anterius punctum 1, dein 3, iterum tria, postice nullum. his duplicatis (in binis scil. elytris) faciunt 14, adde unicum nigrum utruinque elytron tangens ad basin elytrorum; puncta omnia nigra annulo albo. *Abdomen* & pedes nigri; in aliis ad apicem in singulo elytro lineola longitudinalis nigra.

485. COCCINELLA *novendecimpunctata* coleoptris flavis: punctis nigris novendecim.

Habitat in *Plantis*.

DESCR. Corpus parvum. *Thorax* flavus punctis 6 nigris, quorum due posteriora. *Elytra flava*, singula punctis 9 nigris, & uno communis ad basin. *Pedes* flavi.

486. COCCINELLA *22-punctata* coleoptris flavis: punctis nigris viginti duobus. *Fn.* 401.

Habitat in *sepibus*.

DESCR. Inter species minores numerari potest. *Elytra* singula flava punctis novem nigris distantibus, praeter duo vix conspicua obsoleta. *Thorax* notatur maculis septem, quarum infima reliquis major, duas autem primæ, ad antennas, minimæ. *Subtus* inspecta observatur margo coleopterorum prominens cum puncto nigro in medio utrinque. *Abdomen*, ut in reliquis, nigrum est.

487. COCCINELLA *24-punctata* coleoptris rubris: punctis nigris viginti quatuor. *Fn.* 402.

Habitat in *Scania* D. Leche.

DESCR. Inter minimas nostras numeranda. In singulo *Elytro* puncta duo distincta; deinde 4, quorum intermedia coalita; tum 3 coalita omnia, hinc quasi fascia; demum 2 puncta minora distincta.

488. COCCINELLA *25-punctata* coleoptris rubris: punctis nigris vigintiquinque.

Habitat in Plantis.

DESCR. Thorax ruber punto uno nigro. *Elytra* punctis nigris 22, praeter primum commune. *Antennæ & pedes* rubri.

489. COCCINELLA *conglobata* coleoptris rubris: punctis nigris plurimis subcontiguis.

Coccinella coleopteris rubris; punctis plurimis nigris, quibusdam connexis sutura longitudinali nigra. *Fn.* 403.

Frisch. germ. 9. p. 34. t. 17. f. 6.

Habitat in arboribus.

DESCR. Thorax antice ruber, postice niger. *Elytra* rubra, maculis s. punctis plurimis (16.), quadratis, atris, connatis inter se cum margine interiore coleopterorum nigro; differt itaque paucis a sequente. *LARVA* hujus hispida est.

490. COCCINELLA *conglomerata* coleoptris flavescentibus: punctis nigris plurimis contiguis.

Coccinella coleoptris flavescentibus, punctis plurimis nigris, omnibus connexis sutura longitudinali nigra. *Fn.* 402.

Raj. inf. 87. n. 5. *Scarabæus hemisphæricus* flavus, maculis nigris variæ figuræ.

List. logu. 383. n. 9. *Scarabæus luteus*, nigris maculis distinctus.

Frisch. germ. 9. t. 17. f. 4. 5.

Habitat in sepibus.

DESCR. Præcedenti magnitudine & facie simillima; sed thorax, qui niger, ad latera majoribus albis maculis, & antice macula majori alba, & in medio versus elytron albus, includens maculam duobus tribusque punctis nigris notatam. *Elytra* singula rubra notantur cruce, cujus radix (versus caudam) emarginato-bifida; maculæ hic fere nullæ distinctæ, sed omnes in crucem hanc coalitæ.

491. COCCINELLA *guttato-punctata* coleoptris rubris: punctis albis quatuordecim, nigris tribus.

Habitat passim, licet rario.

Simillima Coccion, decempustulata, ut nesciam num sola sexus intercedat differentia.

492. COCCINELLA *quatuordecimpunctata* coleoptris rubris: punctis albis quatuordecim. *Fn.* 397.

Lit. loqu. 383..n. 10. Scarabæus subrufus, cui in humeris pinnæ maculatæ, inque singulis alarum thecis septem maculæ albæ sunt.

Act. upf. 1736. p. 18. n. 5. Coccionella punctis quatuordecim.

Habitat in nemoribus & hortis.

DESCR. Magnitudo ad medias accedit. Thorax ruber lineola alba longitudinali in medio, et macula utrinque alba. Elytron singulum notatur VII punctis, eo ordine a thorace versus caudam numerando puncta, ut 1, 3, 2, 1.

493. COCCINELLA *sedecimguttata* coleoptris luteis: punctis albis sedecim. *Fn.* 399.

Habitat in *Lapponia Lulenfi sylvatica*.

DESCR. Thorax luteus maculis 5 flavis, absque ulla linea intermedia. Elytron singulum luteum notatum punctis octo, a thorace numerando 2, 3, 2, 1. Caput flavum.

494. COCCINELLA *octodecim guttata* coleoptris rubris: punctis albis sedecim: duobus primis lunatis.

Habitat rarius apud nos.

495. COCCINELLA *vigintiguttata* coleoptris rubris: punctis albis viginti. *Fn.* 400.

Habitat in arvis.

DESCR. Magnitudine & facie cum precedentibus duabus convenit. Thorax ruber ad marginem lateralem utrinque lineola arcuata alba notatus, inter has lineolas a tergo duo puncta alba minora superiora, & duo alba alia inferiora s. elytris propiora paulloque majora: in singulo Elytro, quod rubrum est, puncta decem sunt alba, quorum duo in medio tere contigua.

496. COCCINELLA *oblongo-guttata* coleoptris rubris: lineis punctisque albis. *Fn.* 389.

It. øland. 148. Coccionella coleoptris rubris: lineis quatuor albis longitudinalibus.

Habitat in sepibus.

DESCR. Reliquis omnibus, hujus generis, nostris paullo major. Elytra & thorax rubra, latera thoracis utrinque alba: singulum Elytron notatur duabus lineolis longitudinalibus albis, quarum interior puncto albido aucta est, vel in medio interrupto, duobus punctis oblongis constans.

497. COCCINELLA *obliterata* coleoptris flavis: punctis quatuor rufis: anticis obsoletis.

Habitat passim, minus frequens.

498. COCCINELLA *bipustulata* coleopteris nigris, punctis rubris duobus, abdomine sanguineo. *Fn.* 409.

Frisch. germ. 9. p. 34. t. 16. f. 6. Coccinella media nigra, punctis duobus rubris dorsalibus.

Habitat in *Sorbo*, mense septembri, Fahlunæ & alibi.

DESCR. Est magnitudine mediocris, antecedenti simillima, ambitu fere orbiculata, tota nigra, nitida, margine prominulo. *Thorax* absque maculis. *Elytron* singulum in medio fert maculam s. punctum latum sanguineum, saepe ex tribus punctis conflatum. *Abdomen* inferius rufescit. alias tota subtus nigra. *tergum* sub elytris etiam sanguineum. *Pupa* hispida est.

499. COCCINELLA *quadripustulata* coleopteris nigris: punctis rubris quatuor: interioribus longioribus. *Fn.* 408.

Habitat in *Urtica* majore, *Rubo* aliisque.

DESCR. Inter minores est, ovata, nitida, atra. *Caput* atrum, *Thorax* ater cum pari punctorum excavatorum a tergo. *Elytra* nigra, singula juxta basin ad marginem exteriorem macula minore rubra cum puncto ferrugineo, & alia minore, in medio elytri, versus marginem interiorem, itidem rubra. *Anus* ruber est.

500. COCCINELLA *sexpustulata* coleopteris nigris: punctis rubris sex. *Fn.* 407.

Raj. inf. p. 87. n. 4. *Scarabæus hemisphæricus minor*, elytris nigris rubris maculis pictis.

Habitat in arboribus sat rara.

DESCR. *Thorax* totus niger. *Elytra* atra, nitida, singula tribus punctis sanguineis, quorum quod thoraci proximum majus est; ultimum punctum versus ipsum apicem elytri situm, at intermedium proprius margini interiori, quam exteriori collocatum; varietatem absque tertia macula apud D. de Geer vidi.

501. COCCINELLA *decempustulata* coleoptris nigris: punctis fulvis decem.

Habitat in pascuis.

502. COCCINELLA *quatuordecim pustulata* coleopteris nigris: punctis flavis quatuordecim.

Habitat in floribus Centaureæ Scabiosæ frequens.

DESCR. Est inter minores species numeranda. *Elytra* nigra cum tribus paribus punctorum rubrorum & ultimo adhuc impari. *Thorax* nigricatus cum puncto utrinque rubro.

503. COCCINELLA *sedecimpustulata* coleoptris nigris: punctis fulvis sedecim.

Habitat rarius apud nos.

504. COCCINELLA *pantherina* coleoptris nigris: punctis flavis octo.

Habitat passim.

505.

505. COCCINELLA *tigrina* coleopteris nigris: punctis albidis viginti. *Fn.* 405. *Uddm. diff. II.*
Habitat in *Scania* & *Smolandia*.

DESCR. Capitis frons alba. Thorax niger, utrinque albus puncto nigro. Elytra nigra punctis nigris: ad basin 1, dein 3, tum 3, demum 2, ultimo 1.

Chrysomela.

506. CHRYSOMELA *gættingensis* ovata nigra, pedibus violaceis.

Habitat in *Scania*.

DESCR. Corpus magnitudinis mediæ, nigrum vel atro-violaceum absque punctis conspicuis. palmarum pedum & infimus antennarum articulus ferruginea.

507. CHRYSOMELA *Tanaceti* ovata atra punctata, antennis pedibusque nigris.

Chrysomela atra; punctis excavatis contiguis. *Fn.* 413. *It. goth.* 270.

Habitat in *Tanaceto* in insula Gotlandiæ versus austrum *Helligholmen* dicta, copiose, ut & ad fodinas lapideas *Burswiken*, tarde admodum incedens.

DESCR. Est e majoribus hujus generis. Tota atra, minime nitida. Thorax & Elytra punctis minutissimis confertissimis excavata. Elytra latis flexilia, mollia & obtusa sunt. Antennæ undecim articulis. Margo elytrorum prominens.

508. CHRYSOMELA *haemorrhoidalis* ovata nigra nitida, antennis basi flavescentibus, aro rubro.

Chrysomela nigra glabra; antennarum basi subflava. *Fn.* 414.

Habitat in *Roslagia*. de Geer. in *Scania*. D. Leche.

DESCR. Media, punctis nec contiguis, nec striatis; in elytris color dein parum ad cæruleum vergit.

509. CHRYSOMELA *Graminis* ovata viridis nitida, antennis pedibusque concoloribus.

Chrysomela viridi-cærulea. *Fn.* 419.

Aet. upf. 1736. p. 17. n. 1. Chrysomela viridi-cærulea nitida.

Habitat copiose in *Gramine* pratorum primo vere juxta urbem *Hernosand* Angermanniaæ 1732. & Drotningholm. 1753.

DESCR.