


F A V N A  
INSECTORVM  
FRIDRICHSDALINA,

S I V E  
METHODICA DESCRIPTIO INSECTORVM  
AGRI FRIDRICHSDALENSIS,

C V M  
CHARACTERIBVS GENERICIS  
ET SPECIFICIS,  
NOMINIBVS TRIVIALIBVS,  
LOCIS NATALIBVS,  
ICONIBVS ALLEGATIS,  
NOVISQVE PLVRIBVS SPECIEBVS  
ADDITIS.



---

HAFNIAE ET LIPSIAE,  
IN OFFICINA LIBRARIA IO. FRID. GLEDITSCHII  
CICCCCLXIV.

(1764)

38. *SILPHA fabulosa* fusca: elytris lineis eleuatis tribus vtrinque dentatis: thorace subemarginato.  
In arenoso.
39. *SILPHA obscura* elytris punctatis: lineis eleuatis tribus: clypeo truncato.  
In quisquiliis.
40. *SILPHA grossa* nigra: elytris confertim punctatis: lineis eleuatis tribus: thorace emarginato.  
In quisquiliis.
41. *SILPHA aestuia* testacea tomentosa: thorace emarginato: oculis nigris.  
In floribus.
42. \* *SILPHA contusa* nigra: elytris sulcatis, contusis.  
In semita.

## 5. CASSIDA.

Antennae subfiliformes, extrorsum crassiores.  
Elytra marginata.  
Caput sub thoracis clypeo plano reconditum.

43. *CASSIDA viridis* viridis.  
*Frisch.* inf. 13. t. 29.  
*Reaum.* inf. 3. t. 18.  
*Roes.* inf. 2. scar. 3. t. 6.  
In plantis.

44. *CASSIDA nebulosa* pallide nebulosa.  
In plantis.
45. *CASSIDA nobilis* grisea, elytris linea caerulea nitidissima.  
In hortis.

## 6. COCCINELLA.

Antennae subclauatae, truncatae.  
Palpi clava semicordata.  
Corpus hemisphaericum, thorace elytrisque marginatis,  
abdomine piano.

## 6 COLEOPTERA. COCCINELLA.

46. COCCINELLA *bipunctata* coleoptris rubris: punctis nigris duobus.

Frisch. inf. 9. t. 16. f. 4.

Reaum. inf. 3. t. 31. f. 16.

In alno.

47. COCCINELLA *quinquepunctata* coleoptris sanguineis: punctis nigris quinque.

In segete.

48. COCCINELLA *hieroglyphica* coleoptris luteis: maculis nigris duabus longitudinalibus sinuatis.

In frutice.

49. COCCINELLA *septempunctata* coleoptris rubris: punctis septem nigris.

Frisch. inf. 4. t. 1. f. 4.

Reaum. inf. 3. t. 31. f. 18.

Roef. inf. 2. scar. 3. t. 2.

In agris.

50.\* COCCINELLA *octo-punctata* coleoptris rubris: punctis nigris octo.

In nemore.

51. COCCINELLA *decempunctata* coleoptris fuluis: punctis nigris decem.

In plantis.

52. COCCINELLA *vndecimpunctata* coleoptris rubris: punctis nigris vndecim.

In sepibus.

53. COCCINELLA *tredecimpunctata* coleoptris luteis: punctis nigris tredecim.

In armoracia.

54. COCCINELLA *quatuordecimpunctata* coleoptris flavis: punctis nigris quatuordecim: quibusdam contiguis.

In campo.

55. COCCINELLA *24-punctata* coleoptris rubris: punctis nigris viginti quatuor.

In gramine.

56. COCCINELLA *conglomerata* coleoptris flauescentibus: punctis nigris plurimis contiguis.

Frisch.

*Frisch. inf. 9. t. 17. f. 4, 5.*  
In sepibus.

57. COCCINELLA *quatuordecimguttata* coleoptris rubris punctis albis quatuordecim.  
In nemore.

58. COCCINELLA *sexpustulata* coleoptris nigris: punctis rubris sex.  
In arbore.

59. COCCINELLA *pantherina* coleoptris nigris: punctis flavis octo.  
Passim.

## 7. CHRYSOMELA.

Antennae moniliformes extrorsum crassiores.  
Thorax, non elytra, marginatus

60. CHRYSOMELA *goettingensis* ouata nigra: pedibus violaceis.

*Roes. inf. 2. scar. 3. t. 5.*  
In pratis.

61. CHRYSOMELA *graminis* ouata viridis nitida: antennis pedibusque concoloribus.  
In gramine.

62. CHRYSOMELA *aenea* ouata viridis nitida: abdome postice ferrugineo.  
In alno.

63. CHRYSOMELA *Alni* ouata violacea: elytris punctis excavatis sparsis.  
In alno.

64. CHRYSOMELA *bemaptera* ouata violacea: alis rubris.  
In nemore.

65. CHRYSOMELA *padi* ouata nigra: elytris apice liuidis.  
In pruno pado.

66. CHRYSOMELA *betulae* ouata violacea: elytris punctis excavatis striatis.  
In betula.

67. CHRYSOMELA *armoraciae* ouata nigra nitidissima subcaerulescens: subtus atra.  
In armoracia.