

---

**BULLETIN**

DE LA

**Société d'Histoire Naturelle**  
**de l'Afrique du Nord**

---

**SÉANCE DU 10 FÉVRIER 1923****au Laboratoire de Botanique de la Faculté des Sciences.**

---

**Présidence de M. le Dr SERGENT, Président**

---

Le procès-verbal de la séance précédente est lu et adopté.

**Distinction honorifique.** — Le Président félicite, au nom de la Société, M. CHEVREUX, nommé membre honoraire de la Société Entomologique de France, et M. NICOLAS, nommé Chevalier du Mérite Agricole.

**Admissions.** — M. HILBERT, vétérinaire sanitaire, rue de l'Artillerie, Oran.

M. le Dr BRÉGEAT, Santé maritime, Oran.

M. SAUREL, avoué, rue Belleville, Oran.

M. J. DOBRENN, chirurgien-dentiste, 7, boulevard Seguin, Oran.

M. Pierre BERTHAULT, commissaire du Crédit Foncier de France, à Alger.

Mlle LAZARD, étudiante à la Faculté des Sciences, Alger.

Mlle DALLOZ, étudiante à la Faculté des Sciences, Alger.

Mlle FERRÈRE, préparatrice à la Faculté de Médecine, Alger.

M. MÉLIS, chargé de cours à la Faculté de Médecine, Alger.

M. Paul OLIVIER, propriétaire-viticulteur, Haouch-el-Bey, Rouïba.

M. Georges CHAMP, étudiant à la Faculté des Sciences, 23, rue Henri-Martin, Alger.

**Changement d'adresse.** — M. le Dr SICARD, à Saint-Vivien, par Vélignes (Dordogne).



## Coccinellides nouveaux de l'Afrique du Nord

par le D<sup>r</sup> SICARD

---

*Thea thurifera* spec. nov.

En ovale large, peu convexe, glabre et luisante en dessus. Tête jaune, à ponctuation bien marquée, simple, peu serrée; inclinée; front trois fois aussi large que le diamètre transversal d'un œil; épistome profondément échancré en demi-cercle avec les côtés avancés; labre long, arrondi en avant. Palpes et antennes concolores; yeux noirs, légèrement verticaux, arrondis en dedans, recouverts légèrement par le prothorax à leur partie postérieure. Antennes atteignant les trois-quarts de la longueur du prothorax, à articles plus longs que larges, les trois derniers formant une massue peu et graduellement dilatée.

Corselet transversal, échancré au bord antérieur, finement relevé au bord latéral en gouttière étroite et translucide; angles antérieurs légèrement sinués en dehors, le bord antérieur laissant transparaître en noir la partie des yeux qu'il recouvre; angles postérieurs bien marqués, base sinuée, un peu avancée en face de l'écusson. Ponctuation simple assez dense, bien marquée.

Écusson triangulaire, jaune.

Elytres ovales, à bord latéral régulièrement arrondi, non sinué avant l'extrémité; angle huméral arrondi, calus huméral bien marqué, ponctuation semblable à celle du corselet; gouttière latérale étroite; d'un jaune paille, avec une très étroite bordure suturale, trois lignes transversales sinueuses et une tache suturale noire: la première ligne transversale commençant un peu après le milieu du bord latéral, transversalement dirigée sur le sixième externe de l'élytre, formant à ce niveau un angle aigu à sommet antérieur, puis se dirigeant vers la suture qu'elle n'atteint pas tout à fait; un peu dilatée en dedans; la deuxième ligne partant des deux tiers du bord externe et se dirigeant vers la suture en formant deux arcs de cercle à convexité antérieure, dilatée sur la suture en formant avec elle du côté opposé une tache commune triangulaire à sommet postérieur; la troisième ligne située aux cinq sixièmes du bord latéral et prolongée obliquement en avant et en dedans jusqu'à la moitié environ de la largeur de l'élytre à ce niveau. Ces lignes parfois très grêles et peu colorées dans leur milieu.

Épipleurès prolongées à peu près en se rétrécissant régulièrement jusqu'à l'extrémité apicale, très légèrement concaves, sans fossettes. Ailes enfumées.

Prosternum fortement rétréci à sa partie intercoxale qui est en gout-



tière limitée par deux carènes. Metasternum sillonné. Ventre de six arceaux.

Dessous jaune paille avec la moitié postérieure du metasternum, les hanches intermédiaires et l'extrême base des épisternes métathoraciques d'un noir brun foncé ( $\delta$  ?), cette couleur envahissant parfois tout le metasternum (sauf une légère bande antérieure en forme d'accent circonflexe) et la partie médiane du premier et du second arceau abdominal ( $\varphi$  ?).

Plaques abdominales en arc de cercle régulier en dedans, atteignant le bord postérieur du premier segment ventral, ouvertes en dehors.

Long. 0,0031 m. — 0,0036 m.

Cet insecte a été trouvé à Sgag (Aurès) sur *Jupinerus thurifera* par M. DE PEYERIMHOFF, qui a bien voulu m'en confier la description.

Cette espèce est voisine de *Thea bis-octo-notata* Muls. qui est répandue en Afrique des Iles du Cap-Vert et de l'Angola jusqu'à Aden et dans l'Inde occidentale. Elle en est bien distincte par sa taille un peu plus grande, son dessin bien différent, sa forme plus large et plus aplatie, par la couleur du dessous, entièrement jaune chez l'espèce équatoriale.

**Scymnus (Nephus) Peyerimhoffi** nov. spec.

Ovale oblong, couvert d'une pubescence grisâtre courte et assez peu dense. Tête d'un noir brun foncé avec le labre, les palpes et les antennes roux. Corselet de même couleur que la tête avec le bord antérieur étroitement plus clair, largement et peu profondément échancré, sans sinuosités postoculaires, bords latéraux rectilignes, base en ogive très large.

Ecusson noir.

Elytres d'un jaune paille entourés de noir, cette bordure égale à peu près au dixième de la largeur d'un étui, dilatée : 1° au bord antérieur, de façon à former avec la bordure de l'autre élytre une tache basale triangulaire commune, partant de l'épaule et étendue jusqu'au tiers de la longueur de la suture ; 2° au bord latéral, en forme de tache semicirculaire un peu avant le milieu ; 3° à l'extrémité, où elle forme une tache commune en croissant à concavité antérieure, couvrant tout l'apex élytral ; 4° à la suture, un peu après le milieu de la longueur, en forme d'accent circonflexe court et épais, prolongé en dehors jusqu'au milieu de la largeur. On peut aussi considérer les élytres comme noirs avec un dessin jaune paille formé d'une tache quadrangulaire oblique, étendue du calus au tiers de la suture qu'elle n'atteint pas, et d'une bande oblique préapicale, rétrécie au milieu et légèrement recourbée en avant à son extrémité suturale, réunie obliquement en avant et en dedans, par son extrémité latérale, à la tache antérieure.



Dessous d'un jaune brun, avec le métasternum légèrement rembruni. Ligne fémorale très courte, distincte seulement sur le tiers interne. Plaques abdominales et dessous du corps à ponctuation assez grosse et dense, non confluyente. Prosternum non caréné, régulièrement élargi en avant. Pieds roux.

Long. 0,002 m.

Algérie : Biskra ; Edough (VAULOGER) ; Kerrata (THÉRY) ; Tunisie : Gabès !

ab. *disjunctus* nov.

Dessin noir plus étendu. Elytres noirs à trois taches jaunes : une oblique à la base ; une deuxième irrégulièrement triangulaire aux deux tiers de la longueur, près du bord latéral ; la dernière arrondie juxtasuturale, un peu plus postérieure que la deuxième. Gabès !

Cette espèce est voisine de *Nephus pulchellus* ; elle est un peu plus grande ; elle s'en distingue, outre le dessin (la bande transversale foncée juxtasuturale étant, dans les exemplaires du *pulchellus*, à taches confluentes, dirigée d'arrière en avant et de dedans en dehors, en forme de V très élargi, tandis que chez *Peyerimhoffi* elle est dirigée d'avant en arrière en forme d'accent circonflexe ; chez ce dernier, la tache antérieure est aussi plus quadrangulaire, moins arrondie à ses extrémités, et la postérieure n'est pas lunulée), par la ponctuation du dessous moins serrée que chez *pulchellus*, et la ligne fémorale beaucoup plus courte.

*Scymnus (Pullus) impexus* Muls.

M. DE PEYERIMHOFF a capturé à Sgag (Aurès) un exemplaire de cette espèce. C'est un insecte septentrional qui se retrouve chez nous dans la région alpine. Sa capture en Algérie, d'où il n'avait pas été signalé, est extrêmement intéressante. Il vit sur les Conifères.

---

## Description d'une nouvelle espèce de *Falcidius* (Homoptère *Issidae*) du Maroc occidental

par Ernest DE BERGEVIN

---

*Falcidius marocanus* nov. spec.

De couleur testacé clair ; élytres transparents, surtout à l'emplacement de l'apophyse élytrale. Vertex (fig. 1), à bord antérieur nettement anguleux, trois fois aussi large que haut (largeur 0<sup>m/m</sup> 90, hauteur 0<sup>m/m</sup> 30), de la couleur foncière ; à la base, deux fossettes transversalement oblongues, surface légèrement évidée.