

Elymnias agondas vertenteni, subsp. n.

♂. Fore wing: a very feeble greenish subapical band, which by some specimens is indicated only by some scales; much nearer apex than in *melane*, for instance; the region beyond it a little paler. Hind wing: anal band reaching \pm vein 5, greenish blue, with a more or less developed orange-red tint; ocelli present or absent.

3 ♂ from Merauke in our collection; 3 ♂ and 1 ♀ in coll. E. J. Nieuwenhuis (Rotterdam); some ♂ from Toerai and Digoel also in our collection.

Although this species seems to be rather variable, I am describing this new race on account of the constancy of the given characteristics.

Note.—It may seem premature to describe the above-mentioned races on such a small number of specimens. I should not have done it, certainly, if many other species did not demonstrate the racial character of the South New Guinean representatives. Possibly not all the forms will prove to be good subspecies when a large number of examples will be available, especially in such variable species as are *Tenaris*, but I trust some of them will stand, if not all, as races or at least as forms worthy of a name.

XLVIII.—*Descriptions de Coccinellides appartenant à la Collection de M. Andrewes, de Londres*. Par le Dr. SICARD.

M. ANDREWES, de Londres, a bien voulu me confier, il y a déjà fort longtemps, l'examen d'un certain nombre de Coccinellides de l'Inde. Bien qu'un accident survenu à la boîte qui les contenait en ait détruit une partie, j'y ai trouvé quelques formes nouvelles dont je donne ci-dessous les descriptions.

Solanophila erinacea, sp. n.

Subhemisphærica, rubro-testacea, maculis duabus rotundatis suturalibus, vittisque tribus transversalibus in elytro singulo, intus abbreviatis, instructa; pube cinerea semierecta dense vestita. Subtus pedibusque rufis, metasterno nigro-maculato.

Long. 0.004 mm.

Nilgiri Hills.

Arrondie, convexe, d'un rouge roux, tachée de noir sur les élytres et couverte d'une pubescence grise mi-dressée et assez dense, surtout sur les élytres, mais ne masquant pas la couleur foncière. Tête rousse, avec les palpes et les antennes un peu plus clairs. Corselet en arc de cercle large et non sinué à la base, à côtés rectilignes, médiocrement convergents en avant, échancré carrément en avant, avec les angles antérieurs arrondis; d'un roux rougeâtre plus clair sur les côtés, luisant, à ponctuation extrêmement fine et assez clairsemée. Écusson petit, triangulaire, concolore. Elytres régulièrement arrondis, ayant avant le milieu leur plus grande largeur, à ponctuation double, plus grosse que celle du corselet, à pubescence mi-dressée et assez dense, grisâtre; d'un rouge roux avec deux taches suturales et trois courtes bandes noires. La première tache située juste en arrière de l'écusson, irrégulièrement arrondie, couvrant environ le cinquième de la largeur des élytres et un peu moins du quart de la longueur de la suture; la seconde tache suturale un peu plus grosse, en arrière du milieu, arrondie, couvrant à peu près le quart de la largeur et de la longueur des élytres; la première bande en forme de tache ovale, couvrant le calus en laissant le bord externe de l'élytre étroitement de la couleur foncière, touchant le bord antérieur par sa partie convexe et atteignant presque en dedans la première tache suturale dont la sépare une tache triangulaire à base antérieure située de chaque côté de l'écusson. Deuxième bande un peu en avant du milieu des élytres, transversale, dirigée un peu en avant et en dedans jusqu'aux quatre cinquièmes de la largeur des élytres, sa partie interne arrivant au niveau de l'intervalle qui sépare les deux taches communes, à peu près d'égale largeur, celle-ci couvrant un huitième du bord externe; la troisième bande en forme de tache transversalement ovale, à peu près de même longueur que la première, dirigée du niveau de la courbure postérieure des élytres vers la partie postérieure de la tache commune qu'elle n'atteint pas tout à fait.

Dessous roux avec une tache noire sur les côtés du métasternum; plaques abdominales petites, atteignant les trois quarts du segment, leur bord externe remontant en dedans de l'angle antérieur du premier arceau ventral. Ongles courts, épais à la base, leur partie interne plus large et plus courte que l'externe.

La pubescence mi-dressée de cette espèce la rend facilement reconnaissable.

Epilachna grayi, var. *zebra*, nov.

D'un rouge fauve comme le type. Corselet présentant

également une tache médiane noire. Taches des élytres réunies transversalement et formant trois bandes : la première étendue d'une épaule à l'autre, ondulée en arrière en forme d'accolade horizontale, enclosant à sa partie antérieure, de chaque côté de l'écusson, une tache semilunaire de la couleur du fond ; deuxième bande située vers le milieu de l'élytre, transversalement dirigée, rétrécie au milieu, ovalairement renflée à sa partie interne où elle s'unit largement par la partie postérieure de ce renflement à la partie antéro-externe d'une grosse tache suturale quadrangulaire ; troisième bande située au niveau de la courbure postérieure des élytres, oblique en dedans et en avant, unie en cet endroit à la partie postérieure de la tache suturale quadrangulaire.

Dessous roux avec le postpectus noir et la plus grande partie de l'abdomen d'un brun foncé.

Nilgiri Hills.

Stictobura rubroguttata, sp. n.

Hemisphærica, glabra, testacea. Elytris nigris, maculis duabus rubro-sanguineis ornatis. Pedibus testaceis.

Long. 0.006 mm. (vix).

Taille et forme des grandes espèces de *Stictobura* (*pallidoguttata*, *semipolita*, *trichroa*), et comme elles fortement gibbeuse, mais bien distincte par le dessin des élytres.

D'un testacé flave en dessus et en dessous, avec les palpes, les antennes et les pieds de même couleur. Elytres noirs avec la partie interne des épipleures testacée et deux taches d'un rouge de sang sur chacun : la première tache transversale, semblant formée d'une tache ovalaire unie à un point plus externe, étendue à peu près sur la moitié médiane de l'élytre en largeur et du huitième au tiers de la longueur ; la deuxième tache, semilunaire, à partie convexe postéro-interne également éloignée de la tache 1 et de l'angle postérieur des élytres, deux fois plus rapprochée de la suture que du bord externe, couvrant à peu près la moitié de la largeur de l'élytre à son niveau. Elytres à gouttière étroitement relevée, continue jusqu'à l'apex.

Ponctuation élytrale double, les gros points disposés par endroits en courtes séries longitudinales visibles surtout au niveau des taches claires.

Nilgiri Hills.