

Предварительные итоги изучения фауны жуков-стафилинид (Coleoptera: Staphylinidae) Ростовской области

Э.А. Хачиков

Preliminary results of the study of the rove beetles fauna (Coleoptera: Staphylinidae) of Rostov Province

E.A. Khachikov

Ростовское отделение Русского энтомологического общества, Александровский спуск, 59, Ростов-на-Дону
344030. E-mail: e_hachikov@mail.ru

Rostov branch of the Russian Entomological Society, Alexandrovsky spusk, 59, Rostov-on-Don 344030

Резюме. В работе приведен аннотированный список жуков-стафилинид Ростовской области (332 вид) с краткими данными по биологии. Из них 22 вида указываются впервые для Ростовской области: *Acrolocha pliginskii* Bernhauer, 1912, *Hapalaraea pygmaea* (Paykull, 1800), *Phloeostiba lapponica* (Zetterstedt, 1838), *Eusphalerum minutum* (Fabricius, 1792), *E. rufoscutellatum* (Eppelsheim, 1881), *Bledius frisius* Lohse, 1978, *B. gallicus* (Gravenhorst, 1806), *B. opacus* (Block, 1799), *B. pygmaeus* Erichson, 1839, *Anotylus rugosoides* Schülke, 2012, *A. plagiatus* (Rosenhauer, 1856), *Oxytelus migrator* Fauvel, 1904, *O. fulvipes* Erichson, 1839, *Stenus crassus* (Stephens, 1833), *S. solutus* Erichson, 1840, *Scopaeus gladifer* Binaghi, 1935, *S. pusillus* Kiesenwetter, 1843, *Bisnius cephalotes* (Gravenhorst, 1802), *Gabrius pilliger* Mulsant et Rey, 1876, *Quedius suramensis* Eppelsheim, 1880, *Leptacinus intermedius* Donisthorpe, 1936, *Xantholinus audrasi* Jarrige, 1949.

Ключевые слова. Coleoptera, Staphylinidae, аннотированный список, Ростовская область.

Abstract. An check-list of rove beetles of the Rostov Province of Russia (332 species) with brief information on biology is given. Twenty two species: *Acrolocha pliginskii* Bernhauer, 1912, *Hapalaraea pygmaea* (Paykull, 1800), *Phloeostiba lapponica* (Zetterstedt, 1838), *Eusphalerum minutum* (Fabricius, 1792), *E. rufoscutellatum* (Eppelsheim, 1881), *Bledius frisius* Lohse, 1978, *B. gallicus* (Gravenhorst, 1806), *B. opacus* (Block, 1799), *B. pygmaeus* Erichson, 1839, *Anotylus rugosoides* Schülke, 2012, *A. plagiatus* (Rosenhauer, 1856), *Oxytelus migrator* Fauvel, 1904, *O. fulvipes* Erichson, 1839, *Stenus crassus* (Stephens, 1833), *S. solutus* Erichson, 1840, *Scopaeus gladifer* Binaghi, 1935, *S. pusillus* Kiesenwetter, 1843, *Bisnius cephalotes* (Gravenhorst, 1802), *Gabrius pilliger* Mulsant et Rey, 1876, *Quedius suramensis* Eppelsheim, 1880, *Leptacinus intermedius* Donisthorpe, 1936, *Xantholinus audrasi* Jarrige, 1949 are recorded for Rostov Province for the first time:

Key words. Coleoptera, Staphylinidae, check-list, Rostov Province.

Введение

Данная работа основывается на многолетних авторских исследованиях жуков-стафилинид (Staphylinidae) Ростовской области. Начало изучения этого семейства на территории

Ростовской области обязано появлению работы Кизерицкого (1912), в которой были приведены 11 видов стафилинид. Современный этап изучения коротконадкрылых жуков был начат В.И. Ломакиным, итогом чего стала фаунистическая сводка, в которой приведено более 150 видов (Миноранский, Ломакин, 1978). Дальнейшие исследования были продолжены преимущественно автором данной статьи и некоторыми другими специалистами. Эти исследования уже частично опубликованы Э.А. Хачиковым с соавторами (см. разделы «Результаты» и «Литература»). Спорадичные данные по фауне стафилинид охраняемых территорий Ростовской области публиковались в региональных сборниках и недоступны широкому кругу читателей (Хачиков, 1997, 1998, 2006, 2008, 2012а; Арзанов и др., 2003, 2004, 2010, 2016; Гильденков, Хачиков, 2000; Миноранский, Тихонов, 2002; Полтавский, Хачиков, 2004; Пришутова, Арзанов, 2012). Многие виды позднее были переопределены автором и его коллегами; по многим группам сем. Staphylinidae собран новый материал, существенно дополняющий наши знания о региональной фауне этого семейства. В результате возникла необходимость обобщить накопившиеся литературные, а также новые неопубликованные данные в едином аннотированном списке.

Приведенный ниже список представляет собой наиболее полный каталог стафилинид Ростовской области на данный момент и включает 332 вида, из которых 22 приводятся впервые для этого региона. Некоторые подсемейства не представлены в списке вследствие их слабой изученности.

В литературе имеется также ряд указаний на виды из Ростовской области, которые не вошли в наш список: 1) *Philonthus fuscatus* Kraatz, 1859 (Арзанов и др., 2010) – здесь произошло ошибочное применение этого названия для экземпляра, в действительности относящегося к виду *P. fumarius* Gravenhorst, 1806; 2) *Bledius* aff. *tricornis* (Herbst, 1784) [Арзанов и др. (2004) как *B. graellsii* Fauvel, 1865]: данный материал нуждается в дополнительной проверке; первоначальное определение материала как *B. graellsii* Fauvel, 1865 мы считаем ошибочным. Внешне жуки схожи с *B. tricornis* (Herbst, 1784), но некоторые признаки генитального аппарата самцов обособляют их от *B. tricornis* и сближают с *B. graellsii*; 3) *B. denticollis* Fauvel, 1872; 4) *B. pallipes* Gravenhorst, 1806; 5) *Quedius unicolor* Kiesenwetter, 1847; 6) *Domene stilicina* (Erichson, 1840); 7) *Ochtheophilum fracticorne* (Paykull, 1800) (как *Cryptobium fracticorne* Payk.); 8) *Astenus nigromaculatus* (Motschulsky, 1858); 9) *Hypomedon bicolor* (Olivier, 1795); 10) *Ocyopus sericeicollis* Menetries, 1832 [как синоним *Ocyopus cupreus* Rossi, 1790 (Catalogue ..., 2015)]; 11) *Xantholinus atratus* Heer, 1839; 12) *X. longiventris* Heer, 1839; 13) *Bisnius fimetarius* (Gravenhorst, 1802) (как *Philonthus fimetarius* Gr.); 14) *B. longicollis* Bernhauer, 1908 [как синоним *Philonthus intrudens* Tottenham, 1949 (Catalogue ..., 2015)]; 15) *Drusilla canaliculata* Fabricius, 1787 (как *Astilbus canaliculatus* F.); 16) *Aleochara bipustulata* Linnaeus, 1760; 17) *A. curtula* (Goeze, 1777); 18) *A. haematoptera* Kraatz, 1858 [как синоним *A. ripicola* Mulsant et Rey, 1874 (Catalogue ..., 2015)]; 19) *Ilyobates nigricollis* Paykull, 1800 (Миноранский, Ломакин, 1978); 20) *Achenium caucasicum* Laporte, 1835; 21) *Stenus binotatus* Ljungh, 1804; 22) *S. palposus* Zetterstedt, 1838 (Кизерицкий, 1912). Материал по этим таксонам (с 3 по 22) из Ростовской области нам неизвестен, а достоверность его определения вызывает сомнение, что и заставило нас на данный момент воздержаться от его включения в предлагаемый список.

В целом представленный здесь аннотированный список еще не отражает всего разнообразия фауны стафилинид Ростовской области. В первую очередь это обусловлено тем, что практически не изучено подсем. Aleocharinae, которое предположительно составляет не менее трети видового состава данного семейства. Также нуждаются в существенном дополнении роды *Bledius* Leach, 1819 и *Stenus* Latreille, 1797. Поэтому данная работа является промежуточным итогом в изучении коротконадкрылых жуков Ростовской области.

Материал и методы

Большинство приведенного в статье материала по стафилинидам находится в личной коллекции автора, для экземпляров из других коллекций в списке указаны места их хранения. В списке представлены литературные источники, откуда взяты сведения, а при их отсутствии – приведены места сборов; также даны краткие сведения по биологии этих видов. Таксоны расположены согласно каталогу Л. Хермана (Herman, 2001), при составлении списка был использован также каталог палеарктических жесткокрылых (Catalogue ..., 2015). Изменения в систематике подсем. Paederinae, представленные в работе Шомана и Солодовникова (Schomann, Solodovnikov, 2016), в нашем списке не учтены вследствие отсутствия в ней сравнительного анализа такой важной для систематики стафилинид структуры, как эндофаллус, без учета которого, по нашему мнению, современные систематические построения в данном таксоне неполноценны. Более подробное обсуждение вышеупомянутой статьи выходит за рамки этой работы.

Ряд видов приводится в списке согласно определениям А. Занетти, М. Шульке, Л. Хроматки, А.Б. Рывкина и А.В. Шаврина. Виды, впервые приведенные для Ростовской области, обозначены в списке знаком (*).

Под словом «укрытия» в списке понимаются различные предметы (камни, бревна и т.п.), находящиеся на поверхности почвы. Сборы жуков-стафилинид проводили с мая по сентябрь, за исключением особо оговоренных случаев.

Используемые в статье сокращения: CSch. – личная коллекция М. Шульке (M. Schülke, Germany); РО – Ростовская область; ПЗ – прибрежная зона водоемов и водотоков.

Результаты

Аннотированный список жуков-стафилинид (Staphylinidae) Ростовской области

Семейство Staphylinidae

Подсемейство Piestinae

Род *Siagonium* Kirby et Spence, 1815

S. quadricorne Kirby et Spence, 1815

Хачиков, 2003.

Редок, под корой.

Подсемейство Proteininae

Триба Proteinini

Род *Proteinus* Latreille, 1797

Proteinus sp.

Хачиков, 2008.

Редок, в органических остатках растительного происхождения.

Подсемейство Omaliinae

Триба Anthophagini

Род *Anthobium* Leach, 1819

A. atrocephalum (Gyllenhal, 1827)

Миноранский, Ломакин, 1978 [как *Lathri-maeum atrocephalum* (Gyllenhal, 1827)]; Хачиков, 2008.

В подстилке. Спорадичен.

Род *Arpedium* Erichson, 1839

A. quadrum Gravenhorst, 1806

Хачиков, 1998; Арзанов и др, 2004.

Ранней весной, осенью. Редок, ПЗ.

Род *Lesteva* Latreille, 1797

***L. punctata* Erichson, 1839**

Арзанов и др., 2004 (как *Lesteva* sp.); Shavrin, 2014.

ПЗ, спорадичен.

Род *Olophrum* Erichson, 1839

***O. assimile* Paykull, 1800**

Хачиков, 1998, 2012а; Арзанов и др., 2016.

ПЗ, в подстилке. Обычен.

Триба Omaliini

Род *Acrolocha* Thomson, 1858

****A. pliginskii* Bernhauer, 1912**

Материал. 17 ♂, 22 ♀, РО, заповедник «Ростовский», о. Водный, конский навоз, 09.X.2017 (Э. Хачиков).

Спорадичен, копробионт, в условиях РО позднеосенний вид.

Род *Hapalaraea* Thomson, 1858

****H. pygmaea* (Paykull, 1800)**

Материал. 2 ♂, РО, станция Раздорская, 25.IV.2009 (Э. Хачиков) (определение А. Шаврина).

Редок, в гнилой соломе.

Род *Omalium* Gravenhorst, 1802

***O. littorale* Kraatz, 1857**

Хачиков, 1998; Арзанов и др., 2004, 2010.

Повсеместно, в подстилке.

***O. rivulare* (Paykull, 1789)**

Миноранский, Ломакин, 1978; Хачиков, 1998.

Повсеместно, в подстилке.

***O. caesum* Gravenhorst, 1806**

Хачиков, 1998.

Повсеместно, в подстилке.

Род *Phloeostiba* Thomson, 1858

****P. lapponica* (Zetterstedt, 1838)**

Материал. 1 ♂, РО, пос. Ефремово, Степановка, 20.VII.2000 (Э. Хачиков).

В РО редок, ксилофаг.

Род *Phyllodrepa* Thomson, 1859

***P. floralis* (Paykull, 1789)**

Хачиков, 1998.

Весной и осенью, спорадичен. В почве.

Род *Xylostromus* Heer, 1839

***X. concinnus* Marsham, 1802**

Хачиков, 1998, 2012а; Арзанов и др., 2004, 2016.

Редок, нидикол.

Триба Eusphalerini

Род *Eusphalerum* Kraatz, 1857

****E. minutum* (Fabricius, 1792)**

Материал: 1 ♂. РО, станция Раздорская, 20.VIII.1999 (Э. Хачиков).

Редок, антофил.

****E. rufoscutellatum* (Eppelsheim, 1881)**

Материал. РО: 1 ♂, 10.VI.1993 (Э. Хачиков), 2 ♂, Ростов-на-Дону, 20.V.1997 (Э. Хачиков); 1 ♂, Аксай, 13.V.1991 (Э. Хачиков); 1 ♂, пос. Красный Маныч, Веселовское водохранилище, 6.V.1989 (сборщик неизвестен) (определение А. Zanetti).

Весна. Спорадичен, антофил.

Подсемейство Oxytelinae

Триба Euphaniini

Род *Euphania* Fairmaire et Laboulbène, 1856

***E. pusanovi* Blinshtein, 1976**

Миноранский, Ломакин, 1978; Хачиков, 2003, 2012а, 2012б; Арзанов и др., 2016.

Спорадичен, ПЗ, галлобионт.

Триба Coprophilini

Род *Coprophilus* Latreille, 1829

***C. pennifer* (Motschulsky, 1845)**

Хачиков, 2008 [как *Elonium pennifer* (Motschulsky, 1845)], Хачиков, 2012а; Арзанов и др., 2016.

В РО спорадичен, весна, нидикол.

***C. pseudopiceus* Gildenkov, 2015**

Гильденков, Хачиков, 2017.
Нидикол (норы сурков), весна, спорадичен.

***C. schubertii* (Motschulsky, 1860)**

Хачиков, 2012б; Гильденков, 2015.
Нидикол, весна, спорадичен.

***C. solskyi* Bernhauer, 1908**

Гильденков, Хачиков, 2012 [как *Coprophilius rufipennis* (Reitter, 1894)]; Гильденков, Хачиков, 2017.

Очень редок, биология не изучена.

Триба Planeustomini

Род *Manda* Blackwelder, 1952

***M. mandibularis* (Gyllenhal, 1827)**

Хачиков, 1998 (как *Acrognathus mandibularis* Gyllenhal, 1827), 2012б; Гильденков, Хачиков, 2000, 2007; Арзанов и др., 2004.

ПЗ, спорадичен.

***M. tanaïtica* Gildenkov et Khachikov, 2007**

Гильденков, Хачиков, 2007; Хачиков, 2012б.
ПЗ, спорадичен.

Род *Planeustomus* Jacquelin du Val, 1857

***P. heydeni heydeni* Eppelsheim, 1884**

Хачиков, 1998, 2012б; Гильденков, Хачиков, 2000.

ПЗ, спорадичен.

***P. kahrii* (Kraatz, 1857)**

Хачиков, 2003, 2012а, 2012б; Арзанов и др., 2004, 2016.

ПЗ, спорадичен.

***P. palpalis* Erichson, 1839**

Хачиков, 2003, 2012а, 2012б; Арзанов и др., 2004.

ПЗ, спорадичен.

Триба Blediini

Род *Bledius* Leach, 1819

***B. atricapillus* Germar, 1825**

Миноранский, Ломакин, 1978.

ПЗ, обычен.

***B. debilis* Erichson, 1840**

Миноранский, Ломакин, 1978.
ПЗ, обычен.

***B. dissimilis* Erichson, 1840**

Миноранский, Ломакин, 1978.
ПЗ, обычен.

***B. erraticus* Erichson, 1839**

Миноранский, Ломакин, 1978.
ПЗ, обычен.

****B. frisius* Lohse, 1978**

Материал. 2 ♂, 1 ♀, РО, Цимлянский песчаный массив, 7.V.1990 (М. Набоженко) (определение М. Schülke, 2014).

Редок.

***B. furcatus* (Olivier, 1811)**

Арзанов и др., 2004, 2016; Хачиков, 2012а, 2012б.

ПЗ, обычен.

****B. gallicus* (Gravenhorst, 1806)**

Материал. 1 ♂, РО, Ростовский степной заповедник, 2.VI.1998 (Э. Хачиков); 1 ♂, этикетка такая же (CSch) (определение М. Schülke, 2014).

ПЗ, обычен.

****B. opacus* (Block, 1799)**

Материал. 1 ♀, РО, Шолоховский район, пос. Еланская, 6–12.IX.99; 1 ♂, этикетка такая же (CSch) (определение М. Schülke, 2014).

ПЗ, обычен.

***B. procerulus* Erichson, 1840**

Миноранский, Ломакин, 1978.

****B. pygmaeus* Erichson, 1839**

Материал. 1 ♂, 1 ♀, РО, станица Раздорская, 8.VII.2001 (А. Пономарев); 1 ♂, этикетка такая же (CSch) (определение М. Schülke, 2014).

ПЗ, редок.

***B. spectabilis* Kraatz, 1857**

Миноранский, Ломакин, 1978.
Массовый, ПЗ, альгофаг.

***B. tricornis* (Herbst, 1784)**

Миноранский, Ломакин, 1978; Арзанов и др., 2004, 2010, 2016; Хачиков, 2012а, 2012б. ПЗ, обычен.

***B. unicornis* (Germar, 1825)**

Миноранский, Ломакин, 1978; Арзанов и др., 2004, 2016; Хачиков, 2012а, 2012б. ПЗ, обычен.

***B. verres* Erichson, 1840**

Миноранский, Ломакин, 1978; Арзанов и др., 2004. ПЗ (песок), обычен.

Триба Thinobiini

Род *Aploderus* Stephens, 1833

***A. caesus* Erichson, 1839**

Хачиков, 1998, 2012а, 2012б; Гильденков, Хачиков, 2000; Арзанов и др., 2004, 2016. ПЗ, лето, спорадичен, местами многочисленен.

Род *Carpelimus* Leach, 1819

***C. aceus* Gildenkov, 1997**

Гильденков, Хачиков, 2000; Хачиков, 2012б. ПЗ, обычен.

***C. bilineatus* (Stephens, 1832)**

Миноранский, Ломакин, 1978 (как *Trogophloeus bilineatus* Steph.); Гильденков, Хачиков, 2000; Хачиков, 2012б. ПЗ, обычен.

***C. corticinus* (Gravenhorst, 1806)**

Миноранский, Ломакин, 1978 (как *Trogophloeus corticinus* Grav.); Гильденков, Хачиков, 2000; Арзанов и др., 2003, 2010, 2016; Хачиков, 2012а. Обычен, ПЗ, альгофаг.

***C. elongatulus* (Erichson, 1839)**

Миноранский, Ломакин, 1978 (как *Trogophloeus elongatulus* Er.). ПЗ, обычен.

***C. erichsoni* (Sharp, 1871)**

Гильденков, Хачиков, 2000.

ПЗ, обычен.

***C. exiguus* (Erichson, 1839)**

Миноранский, Ломакин, 1978 (как *Trogophloeus exiguus* Er.); Гильденков, Хачиков, 2000; Арзанов и др., 2003, 2010. Июнь–сентябрь, обычен, ПЗ, альгофаг.

***C. fuliginosus* (Gravenhorst, 1802).**

Гильденков, Хачиков, 2000; Хачиков, 2012б. ПЗ, альгофаг, обычен.

***C. foveolatus* (Sahlberg, 1832)**

Миноранский, Ломакин, 1978 (как *Trogophloeus foveolatus* C. Sahlb.); Гильденков, Хачиков, 2000; Арзанов и др., 2016; Хачиков, 2012а. Обычен, ПЗ, альгофаг.

***C. gracilis* (Mannerheim, 1830)**

Миноранский, Ломакин, 1978 (как *Trogophloeus gracilis* Mannh.). ПЗ, обычен.

***C. gusarovi* Gildenkov, 1997**

Гильденков, Хачиков, 2000; Арзанов и др., 2004; Хачиков, 2012б. ПЗ, обычен.

***C. halophilus* (Kiesenwetter, 1844)**

Миноранский, Ломакин, 1978 (как *Trogophloeus halophilus* Kiesw.); Гильденков, Хачиков, 2000; Арзанов и др., 2004, 2016; Хачиков, 2012а. Обычен, ПЗ, альгофаг.

***C. lindrothi lindrothi* Palm, 1943**

Гильденков, Хачиков, 2000; Арзанов и др., 2004. Обычен, ПЗ, альгофаг.

***C. manchuricus subtilicornis* (Roubal, 1946)**

Гильденков, Хачиков, 2000 [как *C. subtilicornis* (Roubal, 1946)]; Хачиков, 2012; Арзанов и др., 2016. Обычен, ПЗ, альгофаг.

***C. nitidus* Baudi di Selve, 1848**

Миноранский, Ломакин, 1978 (как *Trogophloeus nitidus* Baudi); Гильденков, Хачиков, 2000; Арзанов и др., 2004.

Обычен, ПЗ, альгофаг.

***C. nigrita nigrita* Wollaston, 1857**

Арзанов и др., 2004.

Обычен, ПЗ, альгофаг.

***C. nigrita anthracinus* (Mulsant et Rey, 1861)**

Миноранский, Ломакин, 1978 (как *Trogophloeus anthracinus* Muls.); Гильденков, Хачиков, 2000; Арзанов и др., 2004, 2016; Хачиков, 2012а.

Обычен, ПЗ, альгофаг.

***C. obesus* (Kiesenwetter, 1844)**

Миноранский, Ломакин, 1978 (как *Trogophloeus obesus* Kiesw.); Гильденков, Хачиков, 2000; Арзанов и др., 2003, 2004, 2016; Хачиков, 2012а.

Обычен, ПЗ, альгофаг.

***C. politus teneripunctus* Gildenkov, 1994**

Гильденков, Хачиков, 2000 (как *C. teneripunctus* Gildenkov, 1994); Арзанов и др., 2003, 2016; Хачиков, 2012а.

Обычен, ПЗ, альгофаг.

***C. pusillus* (Gravenhorst, 1802)**

Миноранский, Ломакин, 1978 (как *Trogophloeus pusillus* Grav.); Гильденков, Хачиков, 2000.

Обычен, ПЗ, альгофаг.

***C. rivularis* (Motschulsky, 1860)**

Миноранский, Ломакин, 1978 (как *Trogophloeus rivularis* Motsch.); Гильденков, Хачиков, 2000; Арзанов и др., 2003; 2010.

Обычен, ПЗ, альгофаг.

Триба Oxytelini

Род *Anotylus* Thomson, 1859

***A. bernhaueri* (Ganglbauer, 1898)**

Хачиков, 2012б.

Материал. 2 ♂, РО, хутор Крымский, 4.V.1998, норы байбака (Э. Хачиков).

Копробиионт, весна, спорадичен.

***A. insecatus* (Gravenhorst, 1806)**

Миноранский, Ломакин, 1978 (как *Oxytelus insecatus* Gr.); Хачиков, 1998; Гильденков, Хачиков, 2000.

Обычен, копробиионт.

***A. mendus* Herman, 1970**

Хачиков, 1998, 2012а, 2012б; Гильденков, Хачиков, 2000; Арзанов и др., 2004, 2016. Спорадичен, галлобиионт. ПЗ.

***A. nitidulus* (Gravenhorst, 1802)**

Миноранский, Ломакин, 1978 (как *Oxytelus nitidulus* Gr.); Хачиков, 1998, 2012а; Гильденков, Хачиков, 2000; Арзанов и др., 2016.

Обычен, копробиионт.

****A. plagiatus* (Rosenhauer, 1856)**

Материал. 3 ♂, 2 ♀, РО, 10 км СЗ г. Гуково, ур. «Провальская степь», детский лагерь «Лесная сказка», в подстилке, 1.VI.2000 (Э. Хачиков).

В РО редок.

***A. pumilus* (Erichson, 1839)**

Хачиков, 1998, 2008, 2012а, 2012б; Гильденков, Хачиков, 2000; Арзанов и др., 2016.

Обычен, копробиионт.

***A. rugifrons* (Hochhuth, 1849)**

Хачиков, 1998, 2012б; Гильденков, Хачиков, 2000; Арзанов и др., 2003, 2010.

Обычен, в подстилке.

****A. rugosoides* Schülke, 2012**

Материал. РО: 1 ♂, станция Ольгинская, VI.1972 (А. Фомичев) (определение М. Schülke, 2013); 1 ♂, хутор Недвиговка, 18.VII.1991 (Ю. Арзанов); 2 ♂, Ростовский степной заповедник, с. Волочаевское, 10.VII.1998 (Э. Хачиков).

Повсеместно, сапрофаг.

***A. rugosus* (Fabricius, 1775)**

Кизерицкий, 1912; Миноранский, Ломакин, 1978 (как *Oxytelus rugosus* F.); Хачиков, 1998, 2012а; Гильденков, Хачиков, 2000; Арзанов и др., 2003, 2004, 2010, 2016.

Повсеместно, сапрофаг.

***A. tetracarinated* (Block, 1799)**

Миноранский, Ломакин, 1978 (как *Oxytelus tetracarinated* Block); Хачиков, 1998; Гильденков, Хачиков, 2000.

Обычен, копробионт.

Род *Platystethus* Mannerheim, 1830

***P. arenarius* (Geoffroy, 1785)**

Миноранский, Ломакин, 1978; Хачиков, 2008, 2012б.

В РО редок, копробионт.

***P. cornutus* (Gravenhorst, 1802)**

Миноранский, Ломакин, 1978; Хачиков, 1998 [как *Platystethus* ex gr *cornutus* (Gravenhorst, 1802)], 2003, 2012а, 2012б; Гильденков, Хачиков, 2000; Арзанов и др., 2004 (экземпляры из пос. Калининский, станица Вешенская, как *P. alutaceus*, Thomson, 1861), 2016.

Обычен, ПЗ.

***P. nitens* C.R. Sahlberg, 1832**

Миноранский, Ломакин, 1978; Хачиков, 1998, 2012а; Гильденков, Хачиков, 2000; Арзанов и др., 2003, 2004, 2010; 2016.

Повсеместно, сапрофаг.

***P. rufospinus* (Hochhuth, 1851)**

Хачиков, 1998, 2008, 2012а, 2012б; Гильденков, Хачиков, 2000; Арзанов и др., 2016. Май–август, спорадичен, сапрофаг.

***P. spinosus* (Erichson, 1840)**

Миноранский, Ломакин, 1978; Хачиков, 1998, 2012а; Гильденков, Хачиков, 2000; Арзанов и др., 2016.

Спорадичен, сапрофаг.

Род *Oxytelus* Gravenhorst, 1802

****O. fulvipes* Erichson, 1839**

Материал. 1 ♂, РО, станица Вешенская, 4, 5.IX.1999 (Э. Хачиков).

Редок.

****O. migrator* Fauvel, 1904**

Материал. 1 ♂, РО, Песчанокопский район, с. Богородицкое, 25–29.VI.2010 (С. Поушкова).

В РО редок, на свет.

***O. piceus* (Linnaeus, 1767)**

Кизерицкий, 1912; Миноранский, Ломакин, 1978; Хачиков, 1998, 2012а, 2012б; Гильден-

ков, Хачиков, 2000; Арзанов и др., 2003, 2004, 2010, 2016.

Повсеместно, сапрофаг.

***O. sculptus* Gravenhorst, 1806**

Хачиков, 1998, 2012б; Гильденков, Хачиков, 2000; Арзанов и др., 2004.

Повсеместно, сапрофаг.

Подсемейство *Habrocerinae*

Род *Habrocerus* Erichson, 1839

***H. capillaricornis* Gravenhorst, 1806**

Хачиков, 1998, 2012а; Арзанов и др., 2003, 2004, 2010, 2016.

Повсеместно, в подстилке, байрачные и пойменные леса.

Подсемейство *Tachyporinae*

Триба *Mycetoporini*

Род *Bolitobius* Leach, 1819

***B. castaneus* (Stephens, 1832)**

Хачиков, 1998.

Мицетофаг.

***B. cingulatus* Mannerheim, 1830**

Хачиков, 1998; Арзанов и др., 2003.

Мицетофаг.

Род *Ischnosoma* Stephens, 1829

***I. splendidum* Gravenhorst, 1806**

Хачиков, 1998; Арзанов и др., 2003.

Май–июнь, повсеместно, в подстилке, байрачные и пойменные леса.

Род *Mycetoporus* Mannerheim, 1830

***M. clavicornis* (Stephens, 1832)**

Хачиков, 1998.

Май–июнь, повсеместно, в подстилке, байрачные и пойменные леса.

***M. forticornis* Fauvel, 1875**

Хачиков, 1998.

Май–июнь, повсеместно, в подстилке, байрачные и пойменные леса.

***M. glaber* (Sperk, 1835)**

Хачиков, 1998, Арзанов и др., 2003 [как *M. perlaetus* Rey, 1883 – синоним (Catalogue ..., 2015)].

Май–июнь, повсеместно, в подстилке, байрачные и пойменные леса.

***M. piceolus* Rey, 1883**

Хачиков, 1998 [как *M. erichsonianus* Fagel, 1965 – синоним (Catalogue ..., 2015)]; Арзанов и др., 2016.

Май–июнь, повсеместно, в подстилке, байрачные и пойменные леса.

Род *Lordithon* Thomson, 1859

***L. lunulatus* Linnaeus, 1760**

Хачиков, 2003; Арзанов и др., 2004.
Мицетофаг.

***L. pulchellus* Mannerheim, 1830**

Хачиков, 1998; Арзанов и др., 2003, 2004.
Мицетофаг.

***L. rostratus* (Motschulsky, 1845)**

Арзанов и др., 2016.
Мицетофаг.

***L. thoracicus* (Fabricius, 1777)**

Хачиков, 1998; Арзанов и др., 2003.
Мицетофаг.

Триба *Tachyporini*

Род *Cilea* Jacquelin du Val, 1856

***C. silphoides* Linnaeus, 1767**

Хачиков, 1998, Арзанов и др., 2004 (как *Leucoraryphus silphoides* Linnaeus, 1767).
Обычен, копробионт.

Род *Coproporus* Kraatz, 1857

***C. colchicus* Kraatz, 1858**

Хачиков, 1998.
Под корой, редок.

Род *Sepedophilus* Gistel, 1856

***S. marshami* (Stephens, 1832)**

Хачиков, 1998, 2012а; Арзанов и др., 2003, 2010, 2016.

Повсеместно, в подстилке, байрачные и пойменные леса.

***S. pedicularius* Gravenhorst, 1802**

Хачиков, 1998; Арзанов и др., 2003.

Повсеместно, в подстилке, байрачные и пойменные леса.

***S. testaceus* (Fabricius, 1792)**

Миноранский, Ломакин, 1978 (как *Conosoma testaceum* F.); Хачиков, 1998; Арзанов и др., 2003, 2004.

Повсеместно, в подстилке, байрачные и пойменные леса.

Род *Tachyporus* Gravenhorst, 1802

***T. abdominalis* (Fabricius, 1781)**

Миноранский, Ломакин, 1978; Хачиков, 1998; Арзанов и др., 2004.

Повсеместно, в подстилке, байрачные и пойменные леса.

***T. chrysomelinus* (Linnaeus, 1758)**

Хачиков, 1998.

Повсеместно, в подстилке, байрачные и пойменные леса.

***T. formosus* Matthews, 1838**

Хачиков, 1998; Арзанов и др., 2004.

Повсеместно, в подстилке, байрачные и пойменные леса.

***T. hypnorum* (Fabricius, 1775)**

Миноранский, Ломакин, 1978; Хачиков, 1998, 2012а; Арзанов и др., 2003, 2004, 2010, 2016.

Повсеместно, в подстилке, байрачные и пойменные леса.

***T. nitidulus* (Fabricius, 1781)**

Миноранский, Ломакин, 1978; Хачиков, 1998, 2012а; Арзанов и др., 2003, 2004, 2010, 2016.

Повсеместно, в подстилке, байрачные и пойменные леса. В заповеднике «Ростовский» (долина р. Волочаевка) встречается масово на склонах и в понижениях степных участков.

***T. pusillus* Gravenhorst, 1806**

Хачиков, 1998, 2012а; Арзанов и др. 2010, 2016.

Степь, спорадичен.

***T. signatus* Gravenhorst, 1802**

Арзанов и др., 2004.

Спорадичен, в подстилке, байрачные и пойменные леса.

Род *Tachinus* Gravenhorst, 1802

***T. bipustulatus* (Fabricius, 1792)**

Арзанов и др., 2004.

Спорадичен, копробионт.

***T. discoideus* Erichson, 1839**

Хачиков, 1998, 2012а; Арзанов и др., 2016.

Спорадичен, копробионт, аридные станции.

***T. laticollis* Gravenhorst, 1802**

Хачиков, 2012а; Арзанов и др., 2016.

Спорадичен, копробионт.

***T. rufipes* (Linnaeus, 1758)**

Хачиков, 1998; Арзанов и др., 2004 [как *T. signatus* Gravenhorst, 1802 – синоним (Catalogue ..., 2015)].

Спорадичен, копробионт.

***T. subterraneus* Linnaeus, 1758**

Хачиков, 1998.

Спорадичен, копробионт.

Подсемейство Aleocharinae

Триба Nomalotini

Род *Gyrophaena* Mannerheim 1830

***G. affinis* Mannerheim, 1830**

Енushchenko, Semenov, 2016.

Мицетофаг, обычен.

***G. bihamata* Thomson, 1867**

Енushchenko, Semenov, 2016.

Мицетофаг, обычен.

***G. boleti* (Linnaeus 1758)**

Енushchenko, Semenov, 2016.

Мицетофаг, обычен.

***G. caucasica* A. Strand, 1939**

Енushchenko, Semenov, 2016.

Мицетофаг, обычен.

***G. fasciata* (Marsham 1802)**

Енushchenko, Semenov, 2016.

Мицетофаг, обычен.

***G. gentilis* Erichson, 1839**

Енushchenko, Semenov, 2016.

Мицетофаг, обычен.

***G. joyi* Wendeler, 1924**

Енushchenko, Semenov, 2016.

Мицетофаг, обычен.

***G. joyioides* Wüsthoff, 1937**

Енushchenko, Semenov, 2016.

Мицетофаг, обычен.

***G. lucidula* Erichson, 1837**

Енushchenko, Semenov, 2016.

Мицетофаг, обычен.

***G. manca* Erichson, 1839**

Енushchenko, Semenov, 2016.

Мицетофаг, обычен.

Подсемейство Oxyporinae

Род *Oxyporus* Fabricius, 1775

***O. rufus* (Linnaeus, 1758)**

Кизерицкий, 1912; Миноранский, Ломакин, 1978; Хачиков, 1998; Арзанов и др., 2004.

Мицетофаг, обычен.

Подсемейство Euaesthetinae

Триба Euaesthetini

Род *Euaesthetus* Gravenhorst, 1806

***E. laeviusculus* Mannerheim, 1844**

Хачиков, 2003.

ПЗ.

***E. superlatus* Peyerimhoff, 1937**

Хачиков, 2003, 2012а; Арзанов и др., 2016.

ПЗ.

Подсемейство Steninae

Род *Stenus* Latreille, 1797

S. argutus Puthz, 1971

Хачиков, 2012а; Арзанов и др., 2016.
Материал. 1 ♀, РО, станица Пухляковская, байрак, подстилка, 17.VI.2017 (Э. Хачиков).
Редок, июнь, степи, иногда в байрачных лесах, в подстилке.

S. ater Mannerheim, 1830

Миноранский, Ломакин, 1978.
Май–август, обычен, повсеместно, луга.

S. bidenticulatus Puthz, 1969

Хачиков, 2012а; Арзанов и др., 2016.
Спорадичен, май–июнь, луга.

S. bimaculatus Gyllenhal, 1810

Арзанов и др., 2004.
Обычен, луга.

S. boops Ljungh, 1810

Миноранский, Ломакин, 1978.
Обычен, май–июнь, в подстилке.

S. canaliculatus Gyllenhal, 1827:

Рывкин, 1990.
Спорадичен, июнь, укрытия.

S. calcaratus W. Scriba, 1864

Арзанов и др., 2004.
Спорадичен, май–июнь, луга.

S. comma Le Conte, 1863

Миноранский, Ломакин, 1978; Арзанов и др., 2004.
Обычен, ПЗ (песчаные берега).

S. clavicornis (Scopoli, 1763)

Миноранский, Ломакин, 1978.
Материал. РО: 3 ♂, Ростов-на-Дону, 5.V.1991; 1 ♂, Тарасовский район, Городищенский лесхоз, 9.VIII.1993 (Э. Хачиков).
Май–август, обычен, луга.

**S. crassus* (Stephens, 1833)

Материал. 1 ♂, РО, Азов, 1.V.1990 (И. Шохин) (определение А. Рывкина, 1990).
В РО редок, май, укрытия.

S. cicindeloides (Schaller, 1783)

Миноранский, Ломакин, 1978.
Май–август, обычен, повсеместно, луга.

S. circularis Gravenhorst, 1802

Миноранский, Ломакин, 1978.
В РО редок, ПЗ.

S. humilis Erichson 1839

Миноранский, Ломакин, 1978; Арзанов и др., 2003, 2010.
Май–август, обычен, повсеместно, луга.

S. hypoproditor Puthz, 1965

Рывкин, 1990; Арзанов и др., 2004.
Спорадичен, май–июнь, укрытия.

S. juno (Paykull, 1789)

Миноранский, Ломакин, 1978; Арзанов и др., 2004.
Май–август, обычен, повсеместно, луга.

S. incrassatus Erichson, 1839

Миноранский, Ломакин, 1978.
В РО редок, май–июнь, укрытия.

S. intricatus zoufali Fleischer, 1909

Хачиков, 2012а; Арзанов и др., 2016.
Спорадичен, май–июнь, укрытия.

S. morio Gravenhorst, 1806

Миноранский, Ломакин, 1978.
Спорадичен, май–июнь, ПЗ, укрытия.

S. nanus Stephens, 1833

Миноранский, Ломакин, 1978.
Спорадичен, май–июнь, ПЗ, (луга).

S. nigrutilus Gyllenhal, 1827

Миноранский, Ломакин, 1978.
Редок, май–июнь, ПЗ, укрытия.

S. nitens Stephens, 1833

Миноранский, Ломакин, 1978.
Редок, май–июнь, укрытия.

S. obscuripalpis Hubenthal, 1911

Рывкин, 1990; Хачиков, 2012а; Арзанов и др., 2016.
Материал. РО: 2 ♂, хутор Недвиговка, 23.VII.1978 (Э. Хачиков) (определение

L. Hromadka, 1987); 1 ♂, Щепкинский лесхоз, 15.VI.1990 (Э. Хачиков).
Спорадичен, май–июнь, подстилка.

***S. planifrons* Rey, 1884**

Рывкин, 1990.
Спорадичен, май–июнь, ПЗ.

***S. providus* Erichson 1839**

Арзанов и др., 2003, 2010.
Май–август, обычен, повсеместно, луга.

****S. solutus* Erichson, 1840**

Материал. 1 ♂, РО, Щепкинский лесхоз, 28.IX.1992 (Э. Хачиков).
Спорадичен, май–июнь, ПЗ.

***S. stigmula* Erichson, 1840**

Рывкин, 1990.
Спорадичен, май–июнь, ПЗ.

Подсемейство Paederinae

Триба Paederini

Род *Achenium* Leach, 1819

***A. humile* (Nicolai, 1822)**

Хачиков, 1998, 2012а; Арзанов и др., 2003, 2004, 2010, 2016.
Май–август, обычен, повсеместно, ПЗ.

***A. propontiacum* Bordoni, 2009**

Миноранский, Ломакин, 1978; Хачиков, 2008, 2012а; Арзанов и др., 2004, 2016 [как *A. depressum* (Gravenhorst, 1802)].
Май–август, обычен, повсеместно, ПЗ.

***A. quadriceps* Eppelsheim, 1889**

Хачиков, 2003 (как «*A. quadriceps* Eppelsheim»), Хачиков, 2012а; Арзанов и др., 2016.
Май–август, обычен, повсеместно, ПЗ.

Род *Astenus* Dejean, 1833

***A. bulgaricus* Coiffait, 1971**

Хачиков, 1998, 2008, 2012а; Арзанов и др., 2016.
Весна, степи, спорадичен.

***A. immaculatus* Stephens, 1833**

Хачиков, 1998, 2012а; Арзанов и др., 2003, 2004, 2010, 2016.

Май–июнь, обычен, повсеместно, байрачные и пойменные леса, в подстилке.

***A. lyonesius* (Joy, 1908)**

Арзанов и др., 2016.
Весна, степи, спорадичен.

***A. procerus* (Gravenhorst, 1806)**

Миноранский, Ломакин, 1978; Хачиков, 1998 [как *A. filiformis* (Latreille, 1806) – синоним (Catalogue ..., 2015)].
Материал. РО, заповедник «Ростовский»: 1 ♂, в 6 км СВ от пос. Рунный, балка Лисья, 16–21.V.1999 (Д. Касаткин, П. Ивлиев); 1 ♂, о. Водный, 4.IX.2017 (Э. Хачиков).
Обычен, повсеместно, байрачные и пойменные леса, в подстилке. Реже в разнотравной степи, в войлоке.

***A. pulchellus* (Heer, 1839)**

Хачиков, 1998, 2012а; Арзанов и др., 2016.
Весна, степи, спорадичен.

Род *Lathrobium* Gravenhorst, 1802

***L. brunnipes* (Fabricius, 1792)**

Арзанов и др., 2004.
ПЗ, лесные массивы, спорадичен.

***L. elongatum* (Linnaeus, 1767)**

Хачиков, 1998; Арзанов и др., 2004, 2010.
На свет.

***L. flavipes* Hochhuth, 1851**

Миноранский, Ломакин, 1978; Хачиков, 1998, 2012а; Арзанов и др., 2003, 2004, 2010, 2016.
Обычен, повсеместно, ПЗ.

***L. fovulum* Stephens, 1833**

Хачиков, 1998; Арзанов и др., 2003, 2004, 2010; Ruvkin, 2011.
Обычен, повсеместно, байрачные и пойменные леса, в подстилке.

***L. fulvipenne* Gravenhorst, 1806**

Хачиков, 1998; Арзанов и др., 2004.
На свет.

***L. furcatum* Czwalina, 1888**

Хачиков, 1998; Арзанов и др., 2004.

На свет, спорадичен.

***L. geminum* Kraatz, 1857**

Хачиков, 1998; Арзанов и др., 2003, 2004, 2010 [как *L. boreale* Hochhuth, 1851 – синоним (Catalogue ..., 2015)].

Май–сентябрь, обычен, повсеместно, байрачные и пойменные леса, в подстилке.

***L. impressum* Heer, 1841**

Хачиков, 1998; Арзанов и др., 2004: [как *L. filiforme* Gravenhorst, 1806 – синоним (Catalogue ..., 2015)].

На свет.

***L. latum* Tikhomirova, 1968**

Арзанов и др., 2003.

На свет.

***L. longulum* Gravenhorst, 1802**

Хачиков, 1998; Арзанов и др., 2003, 2004, 2010; Ruvkin, 2011.

Обычен, повсеместно, байрачные и пойменные леса, в подстилке.

***L. pallidum* Nordmann, 1837**

Хачиков, 1998; Арзанов и др., 2004.

На свет.

***L. pallidipenne* Hochhuth, 1851**

Хачиков, 1998.

На свет.

***L. quadratus* (Paykull, 1789)**

Хачиков, 2003 (как «*L. quadratum* Paykull»); Арзанов и др., 2004.

На свет.

***L. roubali* Koch, 1944**

Хачиков, 2003, 2012а; Полтавский, Хачиков, 2004 [как *L. bernhaueri* (Koch, 1937) – неверное понимание]; Арзанов и др., 2016.

Редок, степи.

***L. rufonitidus* Reitter, 1909**

Хачиков, 1998.

На свет.

Род *Lobrathium* Mulsant et Rey, 1878

***L. multipunctum* (Gravenhorst, 1802)**

Хачиков, 1998.

Редок, ПЗ, лес.

Род *Leptobium* Casey, 1905

***L. gracile* (Gravenhorst, 1802)**

Миноранский, Ломакин, 1978 (как *Dolicaon biguttulus* Lac.); Хачиков, 1998, 2008; 2012а; Арзанов и др., 2003, 2004, 2010, 2016.

Май–август, обычен, повсеместно, ПЗ, укрытия.

Род *Lithocharis* Dejean, 1833

***L. nigriceps* Kraatz, 1859**

Хачиков, 1998, 2012а; Арзанов и др., 2003, 2004, 2010, 2016.

Май–август, обычен, повсеместно, ПЗ, иногда в навозе.

***L. ochracea* (Gravenhorst, 1802)**

Арзанов и др., 2016.

Спорадичен, ПЗ.

Род *Luzea* Blackwelder, 1952

***L. cephalica* Eppelsheim, 1889**

Хачиков, 2008 [как *L. caucasica* (Luze, 1912) – неверное понимание].

Материал. РО: 2 ♂, 1 ♀, пос. Кружилинский, 27.VII.03 (Э. Хачиков); 1 ♂, 1 ♀, станция Раздорская, 25.IV.2009 (Э. Хачиков).

На свет, в степи, весной, редок.

***L. rossica* Bernhauer, 1908**

Хачиков, 2003 (как *L. cephalica* Eppelsheim, 1889 – неверное понимание).

На свет, спорадичен.

Род *Medon* Stephens, 1833

***M. dilutus pythonissa* (Saulcy, 1865)**

Хачиков, 2003; Арзанов и др., 2004 [как *M. mersinus* A. Bordonì, 1980 – синоним (Catalogue ..., 2015)].

Май–июнь, обычен, байрачные и пойменные леса, в подстилке.

***M. fuscus* Mannerheim 1830**

Хачиков, 1998; Арзанов и др., 2003, 2004, 2010.

Май–июнь, обычен, байрачные и пойменные леса, в подстилке.

Род *Micrillus* Raffray, 1873

***M. testaceus* (Erichson, 1840)**

Пришутова, Арзанов, 2012; Хачиков, 2012а; Арзанов и др., 2016.
Спорадичен, на свет, ПЗ.

Род *Ochtheophilum* Stephens, 1829

***O. aff. collare* (Reitter, 1884)**

Арзанов и др., 2003, 2004, 2010 (как *O. turkestanicum* Korge, 1968 – неверное понимание).
Май–август, обычен, повсеместно, ПЗ.

***O. brevipenne* (Mulsant et Rey, 1861)**

Хачиков, 2012а; Арзанов и др., 2016.

Род *Paederus* Fabricius, 1775

***P. fuscipes* Curtis, 1826**

Кизерицкий, 1912; Миноранский, Ломакин, 1978; Хачиков, 1998, 2012а; Арзанов и др., 2003, 2004, 2010, 2016.
Май–октябрь, фоновый, повсеместно, луговые станции.

***P. limnophilus* Erichson, 1840**

Хачиков, 1998.
Редок.

***P. littoralis* Gravenhorst, 1802**

Хачиков, 1998; Арзанов и др., 2003, 2010.
Обычен, ПЗ.

***P. riparius* (Linnaeus, 1758)**

Миноранский, Ломакин, 1978; Хачиков, 1998, 2012а; Арзанов и др., 2004, 2016.
Повсеместно, луговые станции.

Род *Pseudomedon* Mulsant et Rey, 1878

***P. obscurellus* (Erichson, 1840)**

Арзанов и др., 2003, 2004, 2010.
Май–июль, обычен, повсеместно, ПЗ.

Род *Rugilus* Leach, 1819

***R. angustatus* (Geoffroy, 1785)**

Хачиков, 1998; Арзанов и др., 2003 [как *Stilicus angustatus* (Geoffroy, 1785)].
Май–июль, спорадичен, в подстилке.

***R. orbiculatus* (Paykull, 1789)**

Миноранский, Ломакин, 1978; Хачиков, 1998, Арзанов и др., 2003, 2004 (как *Stilicus orbiculatus* Paykull, 1789). Арзанов и др., 2010, 2016; Хачиков, 2012а.
Май–июль, обычен, повсеместно, байрачные и пойменные леса, в подстилке.

***R. rufipes* Germar, 1836**

Хачиков, 1998; Арзанов и др., 2004 (как *Stilicus rufipes* Germar, 1836).
Обычен, повсеместно, байрачные и пойменные леса, в подстилке.

***R. similis* (Erichson, 1839)**

Хачиков, 1998; Арзанов и др., 2003, 2010 [как *Stilicus similis* (Erichson, 1839)].
Май–июнь, обычен, в подстилке.

Род *Scopaeus* Erichson, 1839

***S. debilis* Hochhuth, 1851**

Хачиков, 2003; Арзанов и др., 2004 [как *S. scitulus* Baudi di Selve, 1857 – синоним (Catalogue ..., 2015)].

****S. gladifer* Binaghi, 1935**

Material. РО: 1 ♂, Донлесхоз, 9.V.1995 (Э. Хачиков); 2 ♂, заповедник «Ростовский», 6 км Ю п. Волочаевский, долина р. Волочаевка, в понижениях склонов, разнотравная степь, 1–15.IX.2017 (Э. Хачиков).

***S. gracilis* (Sperk, 1835)**

Хачиков, 1998; Арзанов и др., 2003, 2010.
Июнь–июль, обычен, повсеместно, ПЗ.

***S. laevigatus* (Gyllenhal, 1827)**

Миноранский, Ломакин, 1978; Хачиков, 1998, 2012а; Арзанов и др., 2003, 2004, 2010, 2016.
Июнь–июль, обычен, повсеместно, ПЗ.

****S. pusillus* Kiesenwetter, 1843**

Material. 1 ♂, РО, с. Мержаново, 27.V.1996 (Э. Хачиков).

Род *Sunius* Stephens, 1829

***S. fallax* (Lokay, 1919)**

Хачиков, 1998; Арзанов и др., 2003, 2010.

Май–июнь, обычен, мезофил, в подстилке, предпочитает увлажненные станции.

***S. melanocephalus* (Fabricius, 1793)**

Миноранский, Ломакин, 1978 (как *Medon melanocephalus* F.); Хачиков, 1998, 2008; 2012а; Арзанов и др., 2016.

Май–июнь, обычен, мезофил, в подстилке, увлажненные станции.

Род *Scymbalium* Erichson, 1839

***S. anale* (Nordmann, 1837)**

Миноранский, Ломакин, 1978; Хачиков, 2008.

Май–июнь, луга, обычен.

Род *Tetartopeus* Czwalina, 1888

***T. rufonitidus* (Reitter, 1909)**

Арзанов и др., 2003, 2004 (как *Lathrobium rufonitidus* Reitter, 1909); Арзанов и др. 2016; Пришутова, Арзанов, 2012; Хачиков, 2012а. Май–июнь, обычен, ПЗ.

***T. scutellaris* (Nordmann, 1837)**

Арзанов и др., 2003, 2010 (как *Lathrobium scutellaris* Nordmann).

Спорадичен, наносы и в подстилке.

***T. terminatus* (Gravenhorst, 1802)**

Миноранский, Ломакин, 1978 (как *Lathrobium terminatum* Gravenhorst); Арзанов и др., 2004 (как *L. terminatus* Gravenhorst); Хачиков, 2003.

Май–июнь, обычен, ПЗ.

Род *Throbalium* Mulsant et Rey, 1878a

***T. kochi* (Peyerimhoff, 1938)**

Хачиков, 1998, 2003, 2012а; Арзанов и др., 2004, 2016; Пришутова, Арзанов, 2012.

Май–июнь, спорадичен, ПЗ.

Подсемейство Staphylininae

Триба Platyprosopini

Род *Platyprosopus* Mannerheim, 1830

***P. elongatus* Mannerheim, 1830**

Хачиков, 1998, 2012а; Полтавский, Хачиков, 2004; Арзанов и др., 2016.

Май–июнь, спорадичен, ПЗ, наносы.

Триба Othiini

Род *Othius* Stephens, 1829

***O. punctulatus* Goeze, 1777**

Хачиков, 1998; Арзанов и др., 2003, 2004. Байрачные леса, в подстилке, спорадичен.

Триба Staphylinini

Род *Erichsonius* Fauvel, 1874

***E. cinerascens* (Gravenhorst, 1802)**

Хачиков, 2003; Арзанов и др., 2004.

Май–июнь, спорадичен, ПЗ, в лесах.

***E. subopacus* (Hochhuth, 1851)**

Хачиков, 1997; Арзанов и др., 2003, 2010.

Обычен, ПЗ.

Род *Bisnius* Stephens, 1829

****B. cephalotes* (Gravenhorst, 1802)**

Материал. 2 ♂, РО, Шолоховский район, пос. Нижне-Матвеевский, 27.VI.2004 (Э. Хачиков).

Весна, редок, нидикол.

***B. manytchensis* Hatchikov, 2003**

Хачиков, 2003, 2012а; Арзанов и др., 2016.

Крайне редок, в соломе.

***B. nitidulus* (Gravenhorst, 1802).**

Хачиков, 1997; Миноранский, Ломакин, 1978; Арзанов и др., 2003 (как *Philonthus nitidulus* Gravenhorst). Арзанов и др. 2004, 2010, 2016; Хачиков, 2012а.

Апрель–май, обычен, степные участки, войлок, реже копробионт.

***B. parvus* (Sharp, 1874)**

Хачиков, 1997 [как *Philonthus parvus* (Sharp)]; Арзанов и др., 2003, 2010.

Обычен, под органическими остатками в птичьих колониях.

***B. scribae* (Fauvel, 1867)**

Миноранский, Ломакин, 1978, Хачиков, 1997 (как *Philonthus scribae* Fauvel). Арзанов

и др., 2004 [как *Bisnius varipennis* (Scriba, 1864) – синоним (Catalogue ..., 2015)], 2016; Хачиков, 2012а.
Весна, нидикол, спорадичен.

***B. sordidus* (Gravenhorst, 1802)**

Хачиков, 1997 (как *Philonthus sordidus* Gravenhorst), 2012а; Арзанов и др., 2003, 2004, 2010.
Обычен, органические остатки.

***B. spermophili* Ganglbauer, 1897**

Арзанов и др., 2003, 2004.
Весна, нидикол, спорадичен.

Род *Gabrius* Stephens, 1829

***G. breviventer* Sperk, 1835**

Арзанов и др., 2004.
Редок.

***G. exspectatus* Smetana, 1952**

Хачиков, 2003; Арзанов и др., 2004, 2010.
Обычен, ПЗ.

***G. nigrutilus* (Gravenhorst, 1802)**

Хачиков, 1997.
Обычен, ПЗ.

***G. osseticus* Kolenati, 1846**

Хачиков, 1997; Миноранский, Ломакин, 1978; Арзанов и др., 2004 [как *G. vernalis* Gravenhorst, 1806 – синоним (Catalogue ..., 2015)]. Арзанов и др., 2003, 2010.
Повсеместно, байрачные и пойменные леса, в подстилке.

****G. pilliger* Mulsant et Rey, 1876**

Материал. 1 ♂, РО, Красносулинский район, пос. Донлесхоз, 2–4.V.1996 (Э. Хачиков).
Редок.

***G. sacerdotalis* Joy, 1913**

Арзанов и др., 2016; Хачиков, 2012а.
Обычен, ПЗ.

***G. subnigrutilus* Joy, 1913**

Хачиков, 2003 [как *G. subnigrituloides* (Scheerpeltz, 1933) – синоним (Catalogue ..., 2015)].
Обычен, ПЗ.

***G. suffragani* Joy, 1913**

Миноранский, Ломакин, 1978; Хачиков, 1997, 2012а; Арзанов и др., 2003, 2004, 2010, 2016.
Обычен, ПЗ.

***G. trossulus* (Nordmann, 1837)**

Арзанов и др., 2004 (как *G. trossuliformis* Schillhammer, 1999).
Редок.

Род *Gabronthus* Tottenham, 1955

***Gabronthus limbatus* (Fauvel, 1900)**

Хачиков, 2003, 2012а; Арзанов и др., 2004, 2016.
Сентябрь, обычен, копробионт.

Род *Rabigus* Mulsant et Rey, 1876

***R. pullus* Nordmann, 1837**

Арзанов и др., 2004.
Май, спорадичен, ПЗ.

Род *Philonthus* Stephens, 1829

***P. alberti* Schillhammer, 2000**

Хачиков, 1997 [как *P. picipes* Fauvel, 1875 – синоним (Catalogue ..., 2015)].
В РО редок, в укрытиях.

***P. albipes* (Gravenhorst, 1802)**

Хачиков, 1997, 2012а; Арзанов и др., 2003, 2004, 2016.
Обычен, копробионт.

***P. atratus* Gravenhorst, 1802**

Хачиков, 1997; Арзанов и др., 2004.
Май–июнь, спорадичен, ПЗ, песок.

***P. biskrensis* (Fagel, 1957)**

Хачиков, 1997, 2012а; Арзанов и др., 2004, 2016.
Обычен, копробионт.

***P. carbonarius* (Gravenhorst, 1802)**

Хачиков, 1997; Арзанов и др., 2003, 2004 [как *P. varius* Gyllenhal, 1810 – синоним (Catalogue ..., 2015)]. Арзанов и др., 2010, 2016; Пришутова, Арзанов, 2012; Хачиков, 2012а.
Обычен, копробионт.

***P. caucasicus* Nordmann, 1837**

Миноранский, Ломакин, 1978; Хачиков, 1997; Арзанов и др., 2003, 2004 [как *P. dimidiatus* C.R. Sahlberg, 1830 – синоним (Catalogue ..., 2015)]. Арзанов и др., 2010, 2016; Хачиков, 2012а.
Обычен, копробионт.

***P. chalceus* Stephens, 1832**

Хачиков, 1997, Арзанов и др., 2003, 2004.
Обычен, некробионт.

***P. cochleatus* Scheerpeltz, 1937**

Арзанов и др., 2016; Хачиков, 2012а.
Обычен, копробионт.

***P. cognatus* Stephens, 1832**

Хачиков, 1997, Арзанов и др., 2004 [как *P. fuscipennis* Mannerheim, 1830 – синоним (Catalogue ..., 2015)]. Арзанов и др., 2003, 2010, 2016; Хачиков, 2012а.
Обычен, копробионт.

***P. concinnus* (Gravenhorst, 1802)**

Миноранский, Ломакин, 1978; Хачиков, 1997, 2012а; Арзанов и др., 2003, 2004, 2010, 2016.
Обычен, органические остатки.

***P. confinis* A. Strand, 1941**

Арзанов и др., 2016.
Спорадичен, копробионт.

***P. coprophilus* Jarrige, 1949**

Хачиков, 1997, 2012а; Арзанов и др., 2004, 2010, 2016.
Обычен, копробионт.

***P. corruscus* (Gravenhorst, 1802)**

Миноранский, Ломакин, 1978; Хачиков, 1997, 2012а; Арзанов и др., 2003, 2004, 2010, 2016.
Обычен, копробионт.

***P. cruentatus* (Gmelin, 1790)**

Хачиков, 1997; Арзанов и др., 2004, 2010.
Обычен, копробионт.

***P. debilis* (Gravenhorst, 1802)**

Миноранский, Ломакин, 1978; Хачиков, 1997, 2012а; Арзанов и др., 2003, 2004, 2010, 2016.
Обычен, копробионт.

***P. decorus* (Gravenhorst, 1802)**

Хачиков, 1997; Арзанов и др., 2004.
Май, в РО редок, в подстилке.

***P. dimidiatipennis* Erichson, 1840**

Хачиков, 1997, 2012а; Арзанов и др., 2004, 2016.
Спорадичен, копробионт.

***P. discoideus* (Gravenhorst, 1802)**

Хачиков, 1997, 2012а; Арзанов и др., 2004, 2016.
Спорадичен, копробионт.

***P. ebeninus* (Gravenhorst, 1802)**

Миноранский, Ломакин, 1978; Хачиков, 1997, 2012а; Арзанов и др., 2004, 2016.
Обычен, копробионт.

***P. ephippium* Nordmann, 1837**

Хачиков, 2003, 2012а; Арзанов и др., 2016.
Редок, ПЗ.

***P. fumarius* Gravenhorst, 1806**

Хачиков, 1997; Арзанов и др., 2003, 2004, 2010.
Обычен, ПЗ.

***P. intermedius* Lacordaire, 1835**

Хачиков, 1997; Арзанов и др., 2004, 2016.
Спорадичен, копробионт.

***P. lepidus* (Gravenhorst, 1802)**

Хачиков, 1997; Арзанов и др., 2004.
Весна, спорадичен, в подстилке.

***P. linki* Solsky, 1866**

Хачиков, 2003; Арзанов и др., 2004.
Июнь, редок, ПЗ, песок.

***P. longicornis* Stephens, 1832**

Хачиков, 1997, 2012а; Арзанов и др., 2016.
Обычен, копробионт.

***P. micans* (Gravenhorst, 1802)**

Хачиков, 1997; Арзанов и др., 2003, 2004, 2010.
Обычен, ПЗ.

***P. sp. aff. micans* (Gravenhorst, 1802)**

Хачиков, 2003; Арзанов и др., 2004 (как *P. micantoides* – неверное понимание).

Редок, ПЗ.

***P. parvicornis* (Gravenhorst, 1802)**

Кизерицкий, 1912 (как *P. varians* Paykull var. *agilis* Gravenhorst). Миноранский, Ломакин, 1978; Арзанов и др., 2003 [как *P. agilis* (Gravenhorst, 1806) – синоним (Catalogue ..., 2015)]. Хачиков, 1997, 2012а; Арзанов и др., 2016.

Обычен, копробионт.

***P. politus* (Linnaeus, 1758)**

Миноранский, Ломакин, 1978; Хачиков, 1997, 2012а; Арзанов и др., 2003, 2004, 2010, 2016.

Обычен, копробионт.

***P. punctus* (Gravenhorst, 1802)**

Кизерицкий, 1912 [как *P. punctatus* (Gravenhorst, 1802)]; Хачиков, 1997, 2012а; Арзанов и др., 2003, 2004, 2010, 2016.

Массовый, ПЗ.

***P. quisquiliarius* (Gyllenhal, 1810)**

Миноранский, Ломакин, 1978; Хачиков, 1997, 2012а; Арзанов и др., 2003, 2004, 2010, 2016.

Массовый, ПЗ.

***P. rectangulus* Sharp, 1874**

Миноранский, Ломакин, 1978; Хачиков, 1997, 2012а; Арзанов и др., 2003, 2004, 2010, 2016.

Обычен, копробионт

***P. rotundicollis* Ménétriés, 1832**

Арзанов и др., 2004.

Обычен, копробионт.

***P. rubripennis* Stephens, 1832**

Хачиков, 1997; Арзанов и др., 2004 [как *P. fulvipes* Fabricius, 1792 – синоним (Catalogue ..., 2015)]; Арзанов и др., 2010.

Обычен, ПЗ.

***P. rufimanus* Erichson, 1840**

Хачиков, 1997; Арзанов и др., 2004.

Обычен, ПЗ.

***P. rufipes* (Stephens, 1832)**

Хачиков, 1997; Арзанов и др., 2004 [как *P. immundus* Gyllenhal, 1810 – синоним (Herman,

2001)]. Арзанов и др., 2010, 2016; Хачиков, 2012а.

Обычен, под органическими остатками.

***P. salinus* Kiesenwetter, 1844**

Миноранский, Ломакин, 1978; Хачиков, 1997, 2012а; Арзанов и др., 2004, 2010, 2016.

Обычен, ПЗ.

***P. sanguinolentus* (Gravenhorst, 1802)**

Хачиков, 1997, 2012а; Арзанов и др., 2004, 2016.

Обычен, копробионт.

***P. spinipes* Sharp, 1874**

Хачиков, 1997, 2012а; Арзанов и др., 2003, 2004, 2010, 2016.

Обычен, копробионт.

***P. subvirescens* Thomson, 1884**

Хачиков, 2003; Арзанов и др., 2004.

Июнь, ПЗ, песок.

***P. tenuicornis* Mulsant et Rey, 1853**

Хачиков, 1997; Арзанов и др., 2003, 2004.

Май–июль, спорадичен, некробионт.

***P. umbratilis* (Gravenhorst, 1802)**

Хачиков, 1997, 2012а; Арзанов и др., 2004, 2010, 2016.

Обычен, копробионт.

***P. varians* (Paykull, 1789)**

Миноранский, Ломакин, 1978; Хачиков, 1997; Арзанов и др., 2003, 2004, 2010.

Обычен, копробионт.

***P. velatipennis* Solsky, 1870**

Хачиков, 1997, 2012а; Арзанов и др., 2004, 2010, 2016.

Обычен, ПЗ.

***P. ventralis* Gravenhorst, 1802**

Арзанов и др., 2016.

Май, редок, копробионт.

***P. viridipennis* Fauvel, 1875**

Хачиков, 1997, 2012а, Арзанов и др., 2004, 2016 [как *P. diversiceps* Bernhauer, 1901 – синоним (Catalogue ..., 2015)].

Спорадичен, ПЗ.

***P. wuesthoffi* Bernhauer, 1939**

Хачиков, 1997 [как *P. fagelianus* Tikhomirova, 1973 – синоним (Catalogue ..., 2015)], 2012а; Арзанов и др., 2003, 2004, 2016.

Спорадичен, некробионт.

Род *Neobisnius* Ganglbauer, 1895

***N. procerulus* (Gravenhorst, 1806)**

Хачиков, 1997, 2012а; Арзанов и др., 2004, 2016.

Май–июль, обычен, ПЗ.

***N. prolixus* Erichson, 1840**

Хачиков, 1997; Арзанов и др., 2004.

Май–июль, обычен, ПЗ.

***N. villosulus* Stephens, 1833**

Хачиков, 1997.

Май–июль, обычен, ПЗ.

Род *Platydracus* Thomson, 1858

***P. fulvipes* (Scopoli, 1763)**

Хачиков, 1997 (как *Staphylinus fulvipes* Scopoli, 1763); Арзанов и др., 2010.

Обычен, в подстилке.

***P. stercorarius* (Olivier, 1795)**

Миноранский, Ломакин, 1978; Хачиков, 1997 (как *Staphylinus stercorarius* Olivier, 1795); Арзанов и др., 2004.

Обычен, лес, степь, в укрытиях.

Род *Tasgius* Stephens, 1829

***T. ater* (Gravenhorst, 1802)**

Миноранский, Ломакин, 1978; Хачиков, 1997 [как *Ocupus* (Gravenhorst, 1802)].

Редок, укрытия.

***T. falcifer* (Nordmann, 1837)**

Хачиков, 1997, 2012а; Арзанов и др., 2003, 2004, 2016.

Редок, укрытия.

***T. gracilicornis* (Hochhuth, 1849)**

Хачиков, 1997; Арзанов и др., 2003, 2004, 2010, 2016 [как *T. ensifer* (J. Muller, 1932) – синоним, (Catalogue ..., 2015)]; Хачиков, 2012а.

Май–июнь, обычен, в подстилке.

***T. melanarius* (Heer, 1839)**

Хачиков, 1997; Арзанов и др., 2003, 2010.

Май–июль, обычен, в подстилке.

***T. pedator* (Gravenhorst, 1802)**

Хачиков, 1997.

Редок, укрытия.

***T. solskyi* (Fauvel, 1875)**

Хачиков, 1997, 2012а, 2014г; Полтавский, Хачиков, 2004; Арзанов и др., 2016.

Весна, редок, степь, укрытия.

Род *Staphylinus* Linnaeus, 1758

***S. caesareus* Cederhjelm, 1798**

Хачиков, 1997; Миноранский, Тихонов, 2002; Арзанов и др., 2003, 2004, 2010.

Массовый, байрачные и пойменные леса.

***S. erythropterus* Linnaeus, 1758**

Хачиков, 1997; Арзанов и др., 2003, 2004.

Обычен, укрытия, в подстилке.

Род *Creophilus* Leach, 1819

***C. maxillosus* (Linnaeus, 1758)**

Миноранский, Ломакин, 1978; Хачиков, 1997, 2012а; Арзанов и др., 2003, 2004, 2010, 2016.

Обычен, некробионт.

Род *Physetops* Mannerheim, 1830

***P. tataricus* (Pallas, 1773)**

Хачиков, 2006, 2014б.

Крайне редок. На свет.

Род *Ocupus* Leach, 1819

***O. brunripes* (Fabricius, 1781)**

Арзанов и др., 2003, 2004.

Спорадичен, укрытия, в подстилке.

***O. fulvipennis* Erichson, 1840**

Хачиков, 1997; Арзанов и др., 2003.

Обычен, укрытия, в подстилке.

***O. nitens* (Schrank, 1781)**

Кизерицкий, 1912 [как *Staphylinus similis* Fabricius – синоним (Catalogue ..., 2015)];

Миноранский, Ломакин, 1978 [как *O. similis* Fabricius – синоним (Catalogue ..., 2015)]. Хачиков, 1997; Арзанов и др., 2003 [как *O. nero* (Faldermann, 1835) – синоним (Catalogue ..., 2015)]; Арзанов и др., 2004, 2010, 2016; Хачиков, 2012а.

Май–октябрь, массовый, байрачные и пойменные леса, в подстилке.

***O. ophthalmicus ophthalmicus* Scopoli, 1763,**

Хачиков, 1997, 2006; Арзанов и др., 2004. Спорадичен, укрытия, в подстилке.

***Ocyrops picipennis picipennis* (Fabricius, 1793)**

Хачиков, 1997, 2012а; Арзанов и др., 2003, 2004, 2016.

Обычен, укрытия, в подстилке.

***Ocyrops ponomarevorum* Khachikov, 2013**

Khachikov, 2013; Хачиков, 2014в.

Материал. 2 ♀, РО, станция Пухляковская, 25.IV – 15.V.2017 (Э. Хачиков).

Весна, крайне редок, степь, укрытия.

Род *Ontholestes* Ganglbauer, 1895

***O. murinus* (Linnaeus, 1758)**

Миноранский, Ломакин, 1978; Хачиков, 1997, 2012а; Арзанов и др., 2003, 2004, 2010, 2016.

Обычен, копробионт.

Род *Emus* Leach, 1819

***E. hirtus* (Linnaeus, 1758)**

Хачиков, 1997, 2004, 2014а; Арзанов и др., 2004.

Редок, некрокопробионт.

Род *Heterothops* Stephens, 1829

***H. balthasari* Smetana, 1967**

Хачиков, 1998, 2012а; Арзанов и др., 2016. Обычен, ПЗ.

***H. dissimilis* (Gravenhorst, 1802)**

Миноранский, Ломакин, 1978; Хачиков, 1998; Арзанов и др., 2004, 2010.

Обычен, ПЗ.

Род *Acylophorus* Nordmann, 1837

***A. glaberrimus* (Herbst, 1784)**

Миноранский, Ломакин, 1978; Хачиков, 1998; Арзанов и др. 2003.

Спорадичен, ПЗ.

Род *Astrapaeus* Gravenhorst, 1802

***A. ulmi* (Rossi, 1790)**

Хачиков, 1998.

Спорадичен, укрытия.

Род *Quedius* Stephens, 1829

***Q. balticus* Korge, 1960**

Хачиков, 1998, 2012а; Арзанов и др., 2016. Спорадичен, укрытия.

***Q. cinctus* (Paykull, 1790)**

Хачиков, 1998, 2012а; Арзанов и др., 2004, 2016.

Спорадичен, укрытия.

***Q. cruentus* (Olivier, 1795)**

Хачиков, 1998; Арзанов и др., 2004.

Спорадичен, укрытия.

***Q. curtipennis* Bernhauer, 1902**

Хачиков, 1998.

Спорадичен, укрытия.

***Q. dilatatus* (Fabricius, 1787)**

Хачиков, 2003 (как *Veileius dilatatus* Fabricius).

Редок, на свет.

***Q. umbrinus* Erichson, 1839**

Арзанов и др., 2004.

Спорадичен, укрытия.

***Q. fulgidus* (Fabricius, 1792)**

Хачиков, 1998.

Спорадичен, укрытия.

***Q. fuliginosus* (Gravenhorst, 1802)**

Хачиков, 2003; Арзанов и др., 2004.

Спорадичен, укрытия.

***Q. invreae* Gridelli, 1924**

Хачиков, 1998.

Спорадичен, укрытия.

***Q. limbatus* (Heer, 1839)**

Хачиков, 1998; Арзанов и др. 2003.

Спорадичен, в подстилке.

***Q. kvashei* Khachikov, 2005**

Хачиков, 2005.

Редок, укрытия.

***Q. meridiocarpaticus* Smetana, 1958**

Хачиков, 1998.

Спорадичен, в укрытиях.

***Q. mesomelinus* (Marsham, 1802)**

Хачиков, 1998.

Спорадичен, в укрытиях.

***Q. puncticollis* (Thomson, 1867)**

Хачиков, 2012а; Арзанов и др., 2016.

Спорадичен, в укрытиях.

***Q. scintillans* (Gravenhorst, 1806)**

Хачиков, 1998, 2012а; Арзанов и др., 2016.

Спорадичен, в укрытиях.

***Q. sofiri* Khachikov, 2005**

Хачиков, 2005.

Редок, укрытия.

****Q. suramensis* Eppelsheim, 1880**

Материал. 1 ♀, РО, хутор Недвиговка, V.2006 (Д. Касаткин).

***Q. tetrapunctatus* Coiffait, 1977**

Хачиков, 1998.

Спорадичен, укрытия.

Триба Xantholinini

Род *Leptacinus* Erichson, 1839

***L. formicetorum* Markel, 1841**

Арзанов и др., 2016.

Обычен, копробионт.

***L. intermedius* Donisthorpe, 1936**

Материал. 1 ♂, РО, заповедник «Ростовский», о. Водный, 25.V.2017 (Э. Хачиков).

Редок, копробионт.

***L. othioides* Baudi di Selve, 1870**

Арзанов и др., 2016.

Спорадичен, копробионт.

***L. sulcifrons* (Stephens, 1833)**

Миноранский, Ломакин, 1978; Арзанов и др., 2016; Bordoni, 2011.

Обычен, копробионт.

Род *Stenistoderus* Jacquelin du Val, 1856

***S. versicolor* Solsky, 1871**

Арзанов и др., 2016; Bordoni, 2011.

Редок, ПЗ, наносы.

Род *Gyrophypnus* Leach, 1819

***G. angustatus* Stephens, 1833**

Миноранский, Ломакин, 1978; Bordoni, 2011.

Обычен, копробионт.

***G. fracticornis* (G. Müller, 1776)**

Миноранский, Ломакин, 1978; Арзанов и др., 2016.

Обычен, копробионт.

***G. ochripennis* (Eppelsheim, 1892)**

Bordoni, 2011.

Спорадичен, копробионт.

Род *Gauropterus* Thomson, 1860

***G. fulgidus* (Fabricius, 1787)**

Миноранский, Ломакин, 1978.

Спорадичен, укрытия.

Род *Phacophallus* Coiffait, 1956

***P. parumpunctatum* (Gyllenhal, 1827)**

Арзанов и др., 2016 [как *P. aff. parumpunctatum* (Gyllenhal, 1827)].

Материал. 1 ♂, РО, Шолоховский район, пос. Калининский, 16.VI.2000 (Э. Хачиков).

Редок, копробионт.

Род *Xantholinus* Dejean, 1821

****X. audrasi* Jarrige, 1949**

Материал. РО: 1 ♂, пос. Казачьи лагеря, 5.IV.1998 (Д. Дубовиков); 1 ♂, Ростов-на-Дону, 8.IV.2007 (А. Рудайков).

Спорадичен, в подстилке.

***X. dvoraki* Coiffait, 1956**

Bordoni, 2011.

Обычен, в подстилке.

***X. fortepunctatus* Motschulsky, 1860**

Bordoni, 2011; Anlaş, 2014.

Материал. РО: 1 ♂, Ростов-на-Дону, 7.VIII.1977 (Э. Хачиков); 1 ♀, Ростов-на-Дону, о. Зеленый, 15.VII.1989 (И. Шохин); 1 ♂, Усть-Донецкий район, станица Раздорская, 11.VII.2008 (Э. Хачиков).

Спорадичен, в подстилке.

***X. tricolor* (Fabricius, 1787)**

Миноранский, Ломакин, 1978.

Материал. 1 ♂, РО, 10 км СЗ г. Гуково, ур. Провальская степь, детский лагерь «Лесная сказка», 1.VI.2000 (Э. Хачиков).

В РО редок, в подстилке.

Род *Hypnogyra* Casey, 1906

***H. angularis* (Ganglbauer, 1895)**

Bordoni, 2011.

Редок.

Благодарности

Автор искренне благодарен за ценные советы М.Ю. Гильденкову (Смоленский государственный университет, Россия), О.И. Симеоненкову (Национальный парк «Смоленское Поозерье», Смоленская область, Россия), А.Ю. Солодовникову (Natural History Museum of Denmark, University of Copenhagen, Denmark) и А.В. Шаврину (Daugavpils University, Institute of Systematic Biology, Daugavpils, Latvia), а также А. Занетти (A. Zanetti, Museo Civico di Storia Naturale di Verona, Italy), М. Шульке (M. Schülke, Berlin, Germany), Л. Хромадка (L. Hromádka, Praha, Czech Republic) А.Б. Рывкину (Москва, Россия), и А.В. Шаврину за помощь в определении.

Литература

- Арзанов Ю.Г., Хачиков Э.А., Пономарев А.В., Пономарева Л.К., Шохин И.В., Рудайков А.Е. 2003. Предварительные данные по фауне жесткокрылых (Coleoptera) территории Раздорского музея-заповедника. *Историко-культурные и природные исследования на территории Раздорского этнографического музея-заповедника*. Ростов-на-Дону, 1: 212–247.
- Арзанов Ю.Г., Хачиков Э.А., Брехов О.Г., Касаткин Д.Г., Набоженко М.В., Шохин И.В., Рудайков А.Е. 2004. Жесткокрылые. *Флора, фауна и микобиота государственного музея-заповедника М.А. Шолохова (посвящается 100-летию со дня рождения М.А. Шолохова)*. Вешенская: 105–153.
- Арзанов Ю.Г., Хачиков Э.А., Ивлиев П.П. 2010. Жесткокрылые природного парка «Донской». *Флора, фауна и микобиота природного парка «Донской»*. Ростов-на-Дону: 113–128.
- Арзанов Ю.Г., Пришутова З.Г., Полтавский А.Н., Набоженко М.В., Шохин И.В., Хачиков Э.А., Касаткин Д., Г., Терсков Е.Н., Решетов А.А., Рудайков А.Е., Попов И.Б. 2016. Видовой состав насекомых заповедника Ростовский. *Экосистемный мониторинг долины Западного Маныча. Итоги и перспективы. К 20-летию Государственного природного заповедника «Ростовский»*. Ростов-на-Дону, 6: 114–227.
- Гильденков М.Ю. 2015. *Coprophilus schubertii* (Motschulsky, 1860) и *Coprophilus piceus* (Solsky, 1876). *Coprophilus (Zonyptilus) pseudopiceus* – новый вид из Европы (Coleoptera: Staphylinidae: Oxytelinae). *Известия Смоленского государственного университета*, 2(1): 6–17.
- Гильденков М.Ю., Хачиков Э.А. 2000. Материалы к фауне Oxytelinae (Coleoptera, Staphylinidae) Нижнего Дона и Северного Кавказа. *Чтения памяти профессора В.В. Станчинского*. Смоленск, 3: 48–52.

- Гильденков М.Ю., Хачиков Э.А. 2007. Новый вид рода *Manda* Blackwelder, 1952 с юга европейской части России (Coleoptera, Staphylinidae, Oxytelinae). *Кавказский энтомологический бюллетень*, **3**(1): 31–34.
- Гильденков М.Ю., Хачиков Э.А. 2012. Новые данные о распространении малоизвестных видов подсемейства Oxytelinae (Coleoptera: Staphylinidae) на юге Европейской части России. *Кавказский энтомологический бюллетень*, **8**(1): 15–16.
- Гильденков М.Ю., Хачиков Э.А. 2017. Новые данные о распространении *Coprophilus* Latreille, 1829 (Coleoptera: Staphylinidae: Oxytelinae) с юга европейской части России, Кавказа и Турции. *Кавказский энтомологический бюллетень*, **13**(1): 35–37.
- Кизерицкий В. 1912. К фауне жуков Области Войска Донского. *Русское энтомологическое обозрение*, **12**(1): 81–94.
- Миноранский В.А., Ломакин В.И. 1978. Экологическая характеристика и распределение стафилинид (Coleoptera, Staphylinidae) в агробиценозах Ростовской области. *Научные доклады высшей школы. Биологические науки*, **4**: 53–57
- Миноранский В.А., Тихонов А.В. 2002. Материалы по герпетофауне заповедника «Ростовский». *Труды заповедника «Ростовский»*. Ростов-на-Дону, **1**: 165–189.
- Полтавский А.Н., Хачиков Э.А. 2004. Энтомологические рефугиумы заповедника «Ростовский». *Биоразнообразие заповедника «Ростовский» и его охрана. Труды Государственного природного заповедника «Ростовский»*. Ростов-на-Дону, **3**: 251–257.
- Пришутова З.Г., Арзанов Ю.Г. 2012. Герпетобийотные жесткокрылые Островного и Стариковского участков государственного природного биосферного заповедника «Ростовский». *Биоразнообразие долины Западного Маныча. Труды Государственного природного биосферного заповедника «Ростовский»*. Ростов-на-Дону, **5**: 127–159.
- Рывкин А.Б. 1990. Стафилиниды подсемейства Steninae (Coleoptera, Staphylinidae) Кавказа и сопредельных территорий. *Фауна наземных беспозвоночных Кавказа. Сборник научных трудов*. Москва: 137–234.
- Хачиков Э.А. 1997. *Материалы к фауне жуков (Coleoptera) Нижнего Дона и Северного Кавказа. Жуки-стафилины (Staphylinidae). Часть I. Триба Staphylinini*. Ростов-на-Дону: Издательство РОИПК и ПРО. 27 с.
- Хачиков Э.А. 1998. *Материалы к фауне жуков (Coleoptera) Нижнего Дона и Северного Кавказа. Жуки-стафилины (Staphylinidae). Часть II*. Ростов-на-Дону: Издательство РОИПК и ПРО. 49 с.
- Хачиков Э.А. 2003. Новые и малоизвестные жуки-стафилиниды (Coleoptera, Staphylinidae) юга европейской части России и Северного Кавказа. *Известия Харьковского энтомологического общества*, **10**(1–2): 44–50.
- Хачиков Э.А. 2004. Эмус волосатый – *Emus hirtus* L. *Красная книга Ростовской области. Том I. Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения животные*. Ростов-на-Дону: 76.
- Хачиков Э.А. 2005. Новые жуки – стафилины (Coleoptera, Staphylinidae) с юга России. *Кавказский энтомологический бюллетень*, **1**(2): 119–122.
- Хачиков Э.А. 2006. Предварительные данные по мониторингу краснокнижных и редких видов насекомых с территории ГМЗ М.А. Шолохова. *Музей-заповедник: экология и культура: Материалы 2-й международной конференции*. Вешенская: 206–210.
- Хачиков Э.А. 2008. Дополнение по фауне насекомых Государственного музея-заповедника М.А. Шолохова. *Музей-заповедник: экология и культура: Материалы 3-й международной конференции*. Вешенская: 119–122.
- Хачиков Э.А. 2012а. Жуки-стафилины (Coleoptera, Staphylinidae) государственного природного биосферного заповедника «Ростовский» и сопредельных территорий. *Биоразнообразие долины Западного Маныча: Труды Государственного природного биосферного заповедника «Ростовский»*. Ростов-на-Дону, **5**: 159–177.
- Хачиков Э.А. 2012б. К познанию таксономии подсемейства Oxytelinae Fleming, 1821 (Coleoptera: Staphylinidae). *Кавказский энтомологический бюллетень*, **8**(2): 213–231.

- Хачиков Э.А. 2014а. Волосатый эмус – *Emus hirtus* (Linnaeus, 1758). *Красная книга Ростовской области. Издание 2-е. Т. 1. Животные*. Ростов-на-Дону: 45.
- Хачиков Э.А. 2014б. Татарский стафилин – *Physetops tataricus* (Pallas, 1773). *Красная книга Ростовской области. Издание 2-е. Т. 1. Животные*. Ростов-на-Дону: 46.
- Хачиков Э.А. 2014в. Стафилин Пономаревых – *Ocypus pomomarevorum* Khachikov, 2013. *Красная книга Ростовской области. Издание 2-е. Т. 1. Животные*. Ростов-на-Дону: 47.
- Хачиков Э.А. 2014г. Стафилин Сольского – *Tasgius solskyi* Fauvel, 1875. *Красная книга Ростовской области. Издание 2-е. Т. 1. Животные*. Ростов-на-Дону: 48.
- Anlaş S. 2014. On the genus *Xantholinus* Dejean of Turkey: three new species, new and additional records, with distributional checklist (Coleoptera: Staphylinidae: Staphylininae: Xantholinini). *Journal of Insect Biodiversity*, **2**(11): 1–28.
- Bordoni A. 2011. Notes on Palaearctic Xantholinini. VI. New species and new records from Caucasus. *Fragmenta Entomologica*, **43**(1): 41–56.
- Catalogue of Palaearctic Coleoptera. 2015. Vol. 2/1. Revised and updated edition. *Hydrophiloidae – Staphilinoidea*. Boston: Brill. xxvi + 1702 p.
- Enushchenko I.V., Semenov V.B. 2016. A review of the genus *Gyrophaena* Mannerheim 1830 (Coleoptera: Staphylinidae: Aleocharinae: Gyrophaenina) of the Caucasus and adjacent territories. *Zootaxa*, **4126**(3): 301–337.
- Herman L.H. 2001. Catalog of the Staphylinidae (Insecta: Coleoptera). *Bulletin of the American Museum of Natural History*, **2**: 2441–3020.
- Khachikov E.A. 2013. A new species of the genus *Ocypus* Leach, 1819 (Coleoptera: Staphylinidae) from the south of Russia. *Russian Entomological Journal*, **22**(2): 131–133.
- Ryvkin A. 2011. On new and poorly known *Lathrobium* (s.str.) species from Siberia and the Russian Far East (Insecta: Coleoptera: Staphylinidae: Paederinae). *Baltic Journal of Coleopterology*, **11**(2): 135–170.
- Schomann A., Solodovnikov A. 2016. Phylogenetic placement of the austral rove beetle genus *Hyperomma* triggers changes in classification of Paederinae (Coleoptera: Staphylinidae). *Zoologica Scripta*, **46**(3): 336–347.
- Shavrin A.V. 2014. Review of the genus *Lesteva* Latreille, 1797 (Coleoptera: Staphylinidae: Omaliinae: Anthophagini) of Iran and adjacent territories. *Zootaxa*, **3884**(2): 122–140.