



ЗАМЕТКИ

Распространение каштановой минирующей моли на территории Украины [Distribution of the Horse-Chestnut Moth *Cameraria ohridella* in Ukraine]. — В период 26.05–29.07.2003 г. Институтом зоологии НАНУ организованы 2 экспедиционных выезда в западные и юго-западные регионы Украины, а также обследован г. Киев с целью определения ареала нового опаснейшего вредителя конского каштана обыкновенного *Aesculus hippocastanum* (Hippocastanaceae) каштановой минирующей моли *Cameraria ohridella* Deschka & Dimitrić, 1986 (Lepidoptera, Gracillariidae). Обследование населенных пунктов данного региона показало, что к 1.08.2003 г. каштановая минирующая моль распространилась в Закарпатье и на большей части Западной Украины: во Львовской, Луцкой, Ровенской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Хмельницкой и Винницкой областях, а также найдена в отдельных районах Киева. Таким образом, естественное продвижение моли стремительно идет с запада Украины в северо-восточном направлении, где каштановая моль достигла Ровно, Хмельницкого и Жмеринки. Примерная скорость продвижения моли 25–50 км в течение одной генерации. Установлено, что обнаружение моли в парковой зоне урбанизированных территорий является индикатором окончательного заселения молью данного региона. Появление каштановой моли в Киеве следует расценивать как антропогенную инвазию (транспорт, посадочный- или лесоматериал и пр.), что полностью соответствует характеру и скорости распространения моли в Западной и Центральной Европе. — И. А. Акимов, М. Д. Зерова, Н. Б. Нарольский, А. В. Гумовский, С. В. Свиридов (Институт зоологии им. И. И. Шмальгаузена НАН Украины, Киев).

Новый синоним в роде *Auletobius* (Coleoptera, Attelabidae) [New Synonym in the Genus *Auletobius* (Coleoptera, Attelabidae)]. — В результате изучения голотипа *Auletes convexifrons* Wollaston, 1864 (= *Auletobius convexifrons* (Wollaston) (♂ с этикеткой «*Auletes convexifrons* Woll., Type») (Natural History Museum London) и голотипа *Auletobius freyi* Uyttenboogaart, 1940 (♂ с этикетками «Tenerife, Mte Aguirre, 22–5–27», «type», «*Auletobius freyi* Uyttenboogaart» (Naturhistorisches Museum Basel) выяснилось, что эти экземпляры рода *Auletobius* Desbrochers относятся к одному виду (нет существенных морфологических отличий, эдагусы идентичны), поэтому название *Auletobius freyi* Uyttenboogaart, 1940, syn. n. есть младший субъективный синоним к *Auletobius convexifrons* (Wollaston, 1864). — А. А. Легалов (Сибирский зоологический музей