


Catalogue of Palaeartic Coleoptera

Volume 2/1

Revised and Updated Edition

Hydrophiloidea - Staphylinoidea



Edited by
I. Löbl and D. Löbl


BRILL

Catalogue of Palaeartic Coleoptera

Volume 2/2

Revised and Updated Edition


Hydrophiloidea - Staphylinoidea



Edited by

I. Löbl and D. Löbl

BRILL



Pseudobironium confusum Löbl & Tang, 2013

Hydrophiloidea – Staphylinoidea

Revised and Updated Edition

VOLUME 1

Edited by

I. Löbl
D. Löbl



BRILL

LEIDEN | BOSTON

Catalogue

superfamily HYDROPHILOIDEA Latreille, 1802

family HELOPHORIDAE Leach, 1815

genus *Helophorus* Fabricius, 1775: 66 type species *Silpha aquatica* Linnaeus, 1758

subgenus *Empleurus* Hope, 1838: 149 type species *Elophorus nubilus* Fabricius, 1777

Bradempleurus Sharp, 1915a: 131 type species *Elophorus schmidtii* A. Villa & G.B. Villa, 1838

Megempleurus Sharp, 1915a: 131 type species *Elophorus rugosus* Olivier, 1795 (= *Opatrum rufipes* Bosc, 1791)

Simempleurus Sharp, 1915a: 132 type species *Helophorus porculus* Bedel, 1881

hirsutiventris Angus, 1984: 544 E: AL BH GR A: TR

hispanicus Sharp, 1915a: 137 (*Empleurus*) E: SP

nubilus Fabricius, 1777: 213 E: AU BH BU BY CR CT CZ DE EN FI FR GB GE GR HU IR IT LA LT MC NL NR NT

PL PT RO SK SL SP ST SV SZ TR UK YU "Transcaucasus" A: IN TR

costatus Goeze, 1777: 148 (*Dermestes*)

linearis Kuwert, 1885: 309 [HN]

lineellus Kuwert, 1886b: 225 (*Empleurus*) [RN]

meridionalis Motschulsky, 1860b: 107 (*Empleurus*)

mesopotamiae Kuwert, 1886a: 90

nigromaculatus Dalla Torre, 1877: 69

striatus Geoffroy, 1785: 20 (*Dermestes*)

peyerimhoffi d'Orchymont, 1926a: 91 N: AG

porculus Bedel, 1881: 298 E: BE CR FR GB GE GR IR IT NL PT SP TR N: AG MO

aper Kuwert, 1886b: 224 (*Empleurus*)

rufipes Bosc, 1791: 8 (*Opatrum*) E: BE BH BU CR FR GB GE GR HU IT NL PT SP N: AG MO

apulicus Fiori, 1915: 77

cinereus Marsham, 1802: 410 (*Hydrophilus*)

fennicus Paykull, 1798: 243

pyrenaicus Kuwert, 1885: 229

rugosus Olivier, 1795: 38: 6

siculus Kuwert, 1886a: 137

variegatus Mulsant, 1844a: 30

schmidtii A. Villa & G.B. Villa, 1838: 63 E: AU FR GE IT PT RO SP SZ

alpinus Heer, 1841: 476

fracticosis Fairmaire, 1859a: 29

subgenus *Eutrichelophorus* Sharp, 1915b: 156 type species *Elophorus micans* Faldermann, 1835

micans Faldermann, 1835a: 234 E: AB AR AU BU CZ GR SK ST UK A: AF CY IN IQ IS PA TD TR UZ

acutipalpus Mulsant & Wachanru, 1852: 5

baklarensis Sharp, 1915b: 158 (*Eutrichelophorus*)

bescianus Sharp, 1915b: 157 (*Eutrichelophorus*)

elegans Ballion, 1871: 329

- ibericus* Sharp, 1915b: 159 (*Eutrichelophorus*)
opalisans Motschulsky, 1860b: 107 (*Empleurus*)
subcostatus Kolenati, 1846b: 65
tessellatus Kuwert, 1886b: 225 (*Empleurus*)
tigrinus Kuwert, 1890b: 190
oxygonus Bedel, 1881: 299 E: FR N: AG
bedelianus Sharp, 1915b: 157 (*Eutrichelophorus*)
subgenus *Gephelophorus* Sharp, 1915c: 198 type species *Helophorus auriculatus* Sharp, 1884
auriculatus Sharp, 1884b: 464 A: ANH BEI GUX HEI JA JIA JIX QIN XIN YUN ZHE
chinensis Sharp, 1915c: 200 (*Gephelophorus*)
sibiricus Motschulsky, 1860b: 104 (*Empleurus*) E: FI NR NT SV A: ES FE HEI JA MG WS YUN NAR
costulifer Knisch, 1922: 90
dovrensis Kuwert, 1886b: 226
gyllenhalii J. Sahlberg, 1875: 210 [RN]
mukawaensis N. Watanabe, 1983: 44
subgenus *Helophorus* Fabricius, 1775: 66 type species *Silpha aquatica* Linnaeus, 1758
Elophorus Fabricius, 1775: 66 [incorrect original spelling]
Megahelophorus Kuwert, 1886b: 226 type species *Silpha aquatica* Linnaeus, 1758
aequalis Thomson, 1868: 300 E: AU BE BU BY CZ DE FA FI FR GB GE HU IT LA LU NL NR PL SK SP SV UK YU
aquaticus Linnaeus, 1758: 362 (*Silpha*) E: AU BE BH BY CR CT CZ DE EN FI FR GE HU IT LA LT LU MC ME NL
 NT PL PT SK SL SP ST SZ TR UK YU "Caucasus" A: IN TR WS
alpigena Dalla Torre, 1877: 69
frigidus Graëlls, 1847: 305
fuscoaeneus Dalla Torre, 1879: 46
splendens Sharp, 1915c: 202 (*Meghelophorus*)
bergrothi J. Sahlberg, 1880a: 62 E: NT A: ES FE WS
grandis Illiger, 1798: 272 E: AU BE BY CT CZ DE EN FI FR GB GE IR LA LT LU NL NR NT PL SK SP SV SZ N: MO
 A: TR NARi
stagnalis Marsham, 1802: 409 (*Hydrophilus*)
hammondi Angus, 1970a: 47 E: ST A: ES FA HEI KA KZ MG QIN
jaechi Angus, 1995: 188 A: FUJ QIN SCH
khnzoriani Angus, 1970a: 50 A: MG WS
kozlovi Zaitzev, 1908c: 423 A: QIN UZ
liguricus Angus, 1970a: 33 E: AU CR CZ FR GR HU IT PL SK ST UK A: TR
manchuricus Sharp, 1915c: 203 (*Meghelophorus*) A: "Manchuria"
maritimus Rey, 1885b: 370 E: BH CR FR MC ME SP N: TU
milleri Kuwert, 1886a: 92 E: FR (Corse) GR IT
brevipilis Guillebeau, 1893: xxxiv [DA]
italus Kuwert, 1890b: 201
niger J. Sahlberg, 1880a: 61 A: ES FE WS
occidentalis Angus, 1983: 12 E: SP N: MO

strandii Angus, 1970a: 46 E: FI NR NT SV

syriacus Kuwert, 1885: 231 E: AB A: IN IS KZ SA TD TM TR UK

thauma Angus & Toledo, 2010: 107 E: IT

subgenus *Kyphohelophorus* Kuwert, 1886b: 223 type species *Elophorus tuberculatus* Gyllenhal, 1808

tuberculatus Gyllenhal, 1808: 129 E: BE BY CZ DE EN FI FR GB GE LA LT NL NR NT PL SV SZ A: BT ES FE NP

SCH NAR

baicalicus Motschulsky, 1860b: 107 (*Empleurus*)

scaber LeConte, 1850: 218

subgenus *Lihelophorus* Zaitzev, 1908c: 421 type species *Helophorus lamicola* Zaitzev, 1908

lamicola Zaitzev, 1908c: 421 A: QIN

ser Zaitzev, 1908c: 422 A: KA QIN XIZ

subgenus *Orphelophorus* d'Orchymont, 1927: 103 type species *Helophorus wandereri* d'Orchymont, 1927

(= *Helophorus obscurellus* Poppius, 1907)

arcticus Brown, 1937a: 109 A: ES FE NAR

obscurellus Poppius, 1907a: 3 E: NT A: ES KZ MG QIN WS

bernhaueri Breit, 1916b: 83

fausti Kuwert, 1887b: 165

turca İncekara, 2008: 421 A: TR

subgenus *Rhopalohelophorus* Kuwert, 1886b: 247 type species *Elophorus griseus* Herbst, 1793

Atractohelophorus Kuwert, 1886b: 227 type species *Helophorus arvernicus* Mulsant, 1846

Thaumhelophorus Angus, 1995: 194 type species *Helophorus inexpectatus* Angus, 1995

abeillei Guillebeau, 1896b: 239 E: AR ST A: IN LE SY TR

algericus Motschulsky, 1860b: 106 N: AG MO TU

cognatus Rey, 1884b: 268

altaicus Ganglbauer, 1901a: 316 A: WS

angusi Hebauer, 1999: 3 A: NP

angustatus Motschulsky, 1860b: 105 E: AR N: AG EG MO A: IN IQ KI KU KZ SA

aegyptiacus Motschulsky, 1860b: 105

araraticus Iablokoff-Khnzorian, 1962b: 113

deplanus Kuwert, 1886b: 250

maroccanus Kuwert, 1885: 264

punctatosulcatus Kuwert, 1892a: 102

apfelbecki Kniž, 1910a: 51 E: MC

aquila Angus, F.-L. Jia & Z.-N. Chen, 2004: 210 A: QIN

armeniacus Ganglbauer, 1901a: 315 E: AR GG A: TR

arvernicus Mulsant, 1846: 281 E: AU BE BY CR CT CZ DE EN FI FR GE IR IT LT LU NL NT PL RO SK SP SZ UK

YU A: TR

asperatus Rey, 1885a: 19 E: AU CZ DE FR GB GE GR IT LU PL SK SV SZ

crenatus Rey, 1884b: 268 [HN]

ganglbaueri Sharp, 1916b: 130 [HN]

umbilicollis Kuwert, 1885: 310

- aspericollis* Angus, 1973: 309 A: ES FE KZ MG QIN
asturiensis Kuwert, 1885: 262 E: FR IT PT SP N: AG MO TU
iricollis Sharp, 1916b: 165
atlantis Angus & Aouad, 2009: 295 N: MO
auricollis Eschscholtz, 1822: 43 A: ES NAR
angustulus Mannerheim, 1853: 165
consimilis Mannerheim, 1853: 164
inquinatus Mannerheim, 1852b: 343
bameuli Angus, 1987: 52 E: SP
banghaasi Kniž, 1919: 11 A: AF KI KZ TD
barbarae Angus, 1985c: 743 E: ST A: KZ WS
biltoni Angus, Mahdizadeh & Hosseinie, 2005: 196 E: AB A: IN
brevipalpis brevipalpis Bedel, 1881: 301 E: AB AR AU BH BU BY CR CT CZ DE EN FA FI FR GB GE GG GR HU IR
 IT LA LT LU MD NL NR NT PL SK SP ST SV SZ TR UK YU A: CY IN IQ IS LE SY TR NARI
bulbipalpis Kuwert, 1890b: 196
creticus Kiesenwetter, 1858b: 40 [suppressed]
insignis Rey, 1885b: 392
mixtus Rey, 1885b: 392
rufipennis Hubenthal, 1911b: 189
brevipalpis levantinus Angus, 1988b: 226 A: IN IQ LE TR
brevitarsis Kuwert, 1890b: 191 E: AL AU BH BU CR CZ HU IT PL RO SK
deubeli Krauss, 1900a: 239
browni McCorkle, 1970: 280 A: ES FE JIL MG NAR
calpensis Angus, 1988a: 178 E: SP
carsoni Angus, 1970b: 269 A: ES MG QIN SCH WS
cincticollis Guillebeau, 1893: xxxv E: SP N: AG MO TU
biscrensis Sharp, 1916b: 166
chobauti Guillebeau, 1896b: 232
confrater Kuwert, 1886a: 169 E: BU PL UK "Balkan"
knothyi Ganglbauer, 1901a: 319
costulatus Kuwert, 1887b: 167 E: "Caucasus"
croaticus Kuwert, 1886b: 248 E: AU BE BY CR CT CZ GE NL PL SK ST YU A: ES TR WS
fausti Sharp, 1916a: 85 [HN]
moscoviticus A.P. Semenov, 1899: 610
daedalus d'Orchymont, 1932b: 395 A: IN TR
dalmatinus Ganglbauer, 1901a: 312 E: ME
difficilis Angus, 1988b: 230 A: IS LE TR
discrepans Rey, 1885a: 19 E: AU BY CR CT CZ EN FI FR HU IT LU NT PL SK SP ST UK "Transcaucasus" N: MO
 A: IN TR
iteratus Sharp, 1916b: 174

- discretus* d'Orchymont, 1925a: 147 A: KZ TM
- dixonii* Angus, 1987: 51 A: IS TR
- dorsalis* Marsham, 1802: 410 (*Hydrophilus*) E: AU BH CR CT CZ FR GB GE HU IT NL PL SK ST SZ TR UK A: TR
- demoulini* Mathieu, 1858: 34 [DA]
- quadrisignatus* Bach, 1851: 389
- elizabethae* Angus, 1987: 53 N: MO
- erzurumicus* İncekara, Mart & Erman, 2005: 44 A: TR
- faustianus* Sharp, 1916d: 195 (*Atracthelophorus*) E: GG ST A: TR
- fauveli* Ganglbauer, 1901a: 314 E: IT SZ
- ganglbaueri* Kniž, 1909: (297)
- flavipes* Fabricius, 1792a: 205 E: AU BH BU BY CR CT CZ DE EN FA FI FR GB GE IR IT LA LT MC NR NT PL PT SK SP SV SZ UK A: TR
- arcuatus* Mulsant, 1844a: 36
- balticus* Kuwert, 1886a: 138
- monticola* Rey, 1885b: 385
- phalleterus* Sharp, 1916b: 129
- planicollis* Thomson, 1870b: 327
- shetlandicus* Kuwert, 1890b: 227
- sphagnicola* Hardy, 1871: 254
- viridicollis* Stephens, 1828: 112
- fosteri* Angus, 1985c: 725 A: KI TD UZ
- frater* d'Orchymont, 1926a: 93 A: ES IN KA NP TR UP XIZ
- hingstoni* d'Orchymont, 1926a: 95
- fulgidicollis* Motschulsky, 1860b: 105 E: DE FR GB GE IR IT NL PT SP SV N: AG MO TU A: TR
- emaciatus* Kuwert, 1886b: 249
- exasperatus* Sharp, 1916a: 83
- flitarsis* L.W. Schaufuss, 1882c: 621
- mulsanti* Cox, 1874: 136
- glacialis* A. Villa & G.B. Villa, 1833b: 34 E: AU BU FI FR GE GR IT MC NR NT PL PT SK SP SV SZ
- inalpinus* Dufour, 1851: 363
- insularis* Reiche, 1861: 204
- nivalis* Thomson, 1853: 44 [HN]
- granularis* Linnaeus, 1760: 214 (*Buprestis*) E: AU BH BY CR CT CZ DE EN FI FR GB GE GG HU IR IT LA LT LU MC NL NR NT PL PT SK SP ST SV SZ UK A: ES TR WS
- brevicollis* Thomson, 1868: 307
- latus* Kuwert, 1886b: 282
- minus* Kuwert, 1887b: 168 [HN]
- opacus* Kuwert, 1886b: 282 [DA]
- pusillus* Motschulsky, 1860b: 106
- pygmaeus* Fabricius, 1792a: 205
- ytensis* Sharp, 1914b: 103

- gratus* Angus, 1987: 47 E: PT SP N: AG MO TU
pusillus Rey, 1885b: 392 [HN]
- griseus* Herbst, 1793: 143 E: AR AU BU BY CT CZ DE EN FI FR GB GE HU IR IT LA LT LU MD NL NR NT PL PT
 RO SK SP ST SV SZ TR UK A: TR
affinis Marsham, 1802: 409 (*Hydrophilus*) [HN]
lateralis Dalla Torre, 1877: 70
- gurjevae* Angus, 1985c: 725 A: KI UZ
- guttulus* Motschulsky, 1860b: 106 E: AR ST A: TR
caucasicus Kuwert, 1885: 232
dormitans Sharp, 1916d: 196 (*Atracthelophorus*)
- helenae* Angus, 1998: 5 A: TR
- hilaris* Sharp, 1916b: 125 E: AB AR GG A: IN LE TR
eichleri d'Orchymont, 1926c: 391
- illustris* Sharp, 1916b: 126 E: FR GR IT MC SP UK A: TR
- imaensis* d'Orchymont, 1926a: 97 A: KA QIN XIZ
- jocoteroi* Angus & Diaz Pazos, 1991: 419 E: PT SP
- kaszabianus* Angus, 1970b: 274 A: MG
- kayae* Angus, 1985c: 741 A: TD UZ
- kazakhstanicus* Angus, 1995: 196 A: KZ
- kerimi* Ganglbauer, 1901a: 318 E: AB GG A: ES IN KI KZ MG NMO QIN TR WS XIN XIZ
- kervillei* d'Orchymont, 1932b: 394 E: GR A: TR
- kirgicus* Kniž, 1914: (114) E: ST A: IN KZ TR
- korotyaevi* Angus, 1985a: 89 E: SP
- kryzhanovskii* Angus, 1985c: 745 A: ES FE
- laferi* Angus, 1995: 201 A: FE
- lapponicus* Thomson, 1853: 42 E: BY CT DE FI GG IT NT SP SV A: ES FE IN IS KZ LE TR WS
celatus Sharp, 1916b: 171
jakowlewi A.P. Semenov, 1900a: 89
jeniseiensis Kuwert, 1886b: 285
satunini Zaitzev, 1946: 260
suturalis Motschulsky, 1860b: 105
- laticollis* Thomson, 1853: 43 E: BY CT DE EN FI FR GB GE IC NL NR NT PL SV
pallidulus Thomson, 1868: 304
- leontis* Angus, 1985c: 740 E: SP
- lewisii* Angus, 1985c: 740 E: GG A: IS TR
- limbatus* Motschulsky, 1860b: 106 A: ES IN KZ MG WS
- longipennis* Ganglbauer, 1901a: 315 A: KI KZ
- longitarsis* Wollaston, 1864: 86 E: AU FR GB GE HU IT NL PL SP ST UK YU N: CI TU A: KZ TR
diffinis Sharp, 1916b: 168
erichsoni Bach, 1866: xi [RN]
punicus Sharp, 1916b: 167

- punientanus* L.W. Schaufuss, 1882c: 62o
semifulgens Rey, 1885b: 388
maculatus Motschulsky, 1860a: 106 E: AB AR A: IN KZ TR
matsumurai Nakane, 1963c: 63 A: FE JA
mervensis A.P. Semenov, 1900b: 587 E: AR A: AF IN KA KZ SA TD TM TR UZ YE
 arabicus Sharp, 1916a: 83
 fryanus Sharp, 1916b: 171
 infelix Sharp, 1916a: 84
 lederi Sharp, 1916b: 174
minutus Fabricius, 1775: 66 E: AU BH BY CR CT CZ DE EN FI FR GB GE GG HU IR IT LA LT LU NL NR NT PL
 SK SL SP ST SV SZ TR UK YU N: AG MO A: IS TR
mongoliensis Angus, 1970b: 257 A: KZ MG QIN
montanus d'Orchymont, 1926a: 97 A: AF KI KZ QIN SCH UP WS XIZ
montenegrinus Kuwert, 1885: 261 E: AU BH BU CR CZ GE GG HU IT MC ME PL RO SK TR UK YU A: TR
nanus Sturm, 1836: 40 E: AU BY CR CT CZ DE EN FI FR GB GE HU IR IT LA LT LU NL NR NT PL SK SL ST SV
 SZ UK "Transcaucasus" A: ES FE NMO TR WS
nevadensis Sharp, 1916d: 196 (*Atracthelophorus*) E: SP
nigricans Poppius, 1907a: 9 A: ES FE HEI JA MG NMO WS
 transbaikalicus d'Orchymont, 1945c: 11
nivalis Giraud, 1852: 92 E: AL AU CR CZ FR GE HU IT MC ME PL SZ YU
 nivalis L. Miller, 1852a: 109 [HN]
 semicostatus Rey, 1885b: 375
nivicola Sainte-Claire Deville, 1926a: 93 N: MO
oblongus LeConte, 1850: 217 E: NT A: ES FE WS NAR
 laevicollis Poppius, 1907a: 5
obscurus Mulsant, 1844a: 36 E: AU CZ DE FI FR GB GE GG GR IR IT LU NL PL PT SK SP ST SV TR UK A: TR
 aeneipennis Thomson, 1853: 43
 apicatus Rey, 1885b: 386
 krueperi Kuwert, 1886b: 284
 simplex Rey, 1885b: 386
 subcrenatus Rey, 1885b: 386
 walkeri Sharp, 1916b: 108
orientalis Motschulsky, 1860b: 106 E: NT A: ES FE HEI JA WS NAR
 sahlbergi Kuwert, 1886a: 90
pallidipennis Mulsant & Wachanru, 1852: 6 E: GR A: CY IS TR
 reitteri Kuwert, 1885: 262
 vinctus Sharp, 1916b: 167
pallidus Gebler, 1830: 103 E: EN FI NR NT SK SV A: ES FE WS
 borealis R.F. Sahlberg, 1834: 4
 incertus Kuwert, 1886a: 136
 pallidipennis Thomson, 1853: 41 [HN]

- parallelus* Motschulsky, 1860b: 105
quadricollis Kuwert, 1886b: 247 [RN]
thomsonis Kuwert, 1885: 312 [RN]
- parajacutus* Angus, 1970b: 279 A: MG
paraminutus Angus, 1986: 150 E: AU BY CT CZ GE GR HU SK ST UK N: TU A: TR WS
paramontanus Angus, 1985c: 744 A: TD TR
parasplendidus Angus, 1970b: 272 A: ES FE NAR
pici Guillebeau, 1893: xxxiv N: AG
pictus Ganglbauer, 1901a: 317 A: TD UZ
pitcheri Angus, 1970b: 277 A: ES JIL
ponticus Angus, 1988b: 234 A: TR
poppii Angus, 1970b: 263 A: ES FE
praenanus Łomnicki, 1894: 69 A: ES FE MG QIN WS
birulai Zaitzev, 1910: 48
jacutus Poppius, 1907a: 7
pumilio Erichson, 1837: 197 E: AU CR CT DE FI FR GE LU NL NT PL SK SZ YU A: ES WS
fallax Kuwert, 1886a: 135
puncticollis Rey, 1885b: 382 E: FR (Corse)
corsicanus Kuwert, 1885: 310
redtenbacheri Kuwert, 1885: 264 E: AU BY CZ DE EN GE HU LT PL SK ST SV UK A: WS
spinifer Sharp, 1916a: 84
richterae Angus, 1985c: 737 E: GG ST
rinki Angus, 1985c: 744 E: IT
seidlitzii Kuwert, 1885: 261 E: PT SP
carpetanus Sharp, 1916b: 111
impressus Kuwert, 1886b: 282
longulus Kuwert, 1886b: 284
shatrovskyi Angus, 1985b: 163 A: MG
similis Kuwert, 1887b: 166 E: ST A: ES HEI KZ LLA MG TR WS
elongatus Motschulsky, 1860b: 105 [HN]
motschulskyi Angus, 1970b: 265 [RN]
singularis L. Miller, 1881: 189 E: AL CR GR ME
splendidus J. Sahlberg, 1880a: 62 A: ES FE WS NAR
strigifrons Thomson, 1868: 308 E: AU BY CT CZ DE EN FI FR GB GE IR IT LA NL NR NT PL SK SV SZ A: ES
 TR WS
championi Sharp, 1915: 236
subarcuatus Rey, 1885b: 386 E: FR (Corse) IT (Sardegna) A: TR
aritzuensis Sharp, 1916b: 110
lancifer Sharp, 1916b: 111
purpuratus Rey, 1885b: 386
subcarinatus Angus, 1985c: 743 A: IS LE TR

- theryi* d'Orchymont, 1925a: 145 N: MO
timidus Motschulsky, 1860b: 106 A: ES FE HEI JIL NMO
trisulcatus Guillebeau, 1896b: 232 N: AG
uvarovi Angus, 1985c: 742 A: KZ WS
villosus Duftschmid, 1805: 296 E: AU CZ GE HU RO SK
 pinkeri Ganglbauer, 1904a: 171
 zoppae Ganglbauer, 1901a: 319
wrootae Angus, 1988b: 237 E: GR
yammounensis Angus, 1988b: 232 A: IS LE
zagrosicus Angus, 1988b: 236 A: IN TR
subgenus *Transithelophorus* Angus, 1970b: 252 type species *Helophorus crinitus* Ganglbauer, 1901
beibienkoi Angus, 1984: 539 A: KZ TD UZ
crinitus Ganglbauer, 1901a: 312 A: ES FE HEI QIN SHA XIZ WS
 kardakoffi Stöcklein, 1954: 268
terminassianae Angus, 1984: 540 E: AR A: TR
subgenus *Trichohelophorus* Kuwert, 1886b: 223 type species *Elophorus alternans* Gené, 1836
alternans Gené, 1836: 184 E: CR FR GB GR IR IT NL PT SP N: AG MO TU
 intermedius Mulsant, 1844a: 32
 mauritanicus Sharp, 1915b: 162 (*Trichelophorus*)
oscillator Sharp, 1915b: 163 (*Trichelophorus*) A: IS SY TR

family Helophoridae, **nomen dubium** (possibly not even Hydrophiloidea)
Helophorus cicatricosus Gravenhorst, 1807: 107 [DA] [no type locality given]

family EPIMETOPIDAE Zaitzev, 1908

- genus** *Eumetopus* Balfour-Browne, 1949: 13 type species *Sepidulum bullatum* Sharp, 1875
acutimontis Ji & Jäch, 1998: 202 A: HAI
asperatus Champion, 1919d: 237 (*Epimetopus*) A: HP NP UP
bullatus Sharp, 1875b: 249 (*Sepidulum*) A: "India"
weigeli Skale & Jäch, 2003: 195 A: NP

family GEORISSIDAE Laporte, 1840

- genus** *Georissus* Latreille, 1809: 377 type species *Pimelia pygmaea* Fabricius, 1798 (= *Byrrhus crenulatus* P. Rossi, 1794)
subgenus *Georissus* Latreille, 1809: 377 type species *Pimelia pygmaea* Fabricius, 1798 (= *Byrrhus crenulatus* P. Rossi, 1794)
babai Satô, 1970: 199 A: JA
canalifer Sharp, 1888a: 244 A: FE JA
crenulatus P. Rossi, 1794: 81 (*Byrrhus*) E: AU BY CR CZ DE EN FI FR GB GE GG GR HU IR IT LT LU NL NR NT
 PL PT RO SK SP ST SV SZ A: ES FE IS KZ WS
bisulcatus Motschulsky, 1843: 657

- canaliculatus* Reiche, 1879: 237 [HN]
corcyraeus J. Sahlberg, 1903b: 25
dubius Panzer, 1799a: no. 5 (*Trox*)
incisus Motschulsky, 1843: 649
integrostriatus Motschulsky, 1843: 650
major Motschulsky, 1843: 647
mutilatus Motschulsky, 1843: 655
nepos Fairmaire, 1879c: 182
punctatus Grimmer, 1841: 40
pygmaeus Fabricius, 1798: 45 (*Pimelia*)
siculus Ragusa, 1873: 233
spinicollis Motschulsky, 1843: 653
substriatus Heer, 1841: 472 E: AU BU FR GE GR IT RO SZ "Balkan" "Caucasus"
tenuepunctatus Motschulsky, 1843: 652
subgenus *Neogeorissus* Satô, 1972: 209 type species *Georissus japonicus*
 Satô, 1972
bipartitus Champion, 1923b: 177 A: UP
caelatus Erichson, 1847: 504 E: AU CR FR GR IT RO A: SY TR
chameleo Fikáček & Trávníček, 2009: 145 E: AE
coelosternus Champion, 1923b: 177 A: UP
costatus Laporte, 1840b: 45 E: CT FR GR IT PT SP ST N: AG EG A: IS TR WS
carinatus Rosenhauer, 1856: 112
cupreus Reiche, 1879: 237
latreillei Dufour, 1843: 57
pimelioides Fairmaire, 1859a: 45
formosanus Kôno, 1936: 53 A: TAI
fusicornis Champion, 1923b: 175 A: SD UP
instabilis instabilis Champion, 1923b: 176 A: UP
instabilis minusculus Champion, 1923b: 176 A: UP
japonicus Satô, 1972: 210 A: FE JA
katsuoi Nakane, 1995: 42 A: JA
kurosawai Nakane, 1963c: 63 A: JA
laesicollis Germar, 1832: pl. 3 E: AB AU BU CR CZ FR GE GR IT RO SP SZ UK A: LE TR
canaliculatus Motschulsky, 1843: 659
maritimus Fikáček, Delgado & Gentili, 2012: 49 A: YE (Suqutra)
nemo Fikáček, Delgado & Gentili, 2012: 112 A: YE (Suqutra)
persicus Fikáček & Falamarzi, 2010: 108 A: IN
sakaii Satô, 1972: 211 A: JA
septemcostatus Champion, 1923b: 178 A: UP
trifossulatus Motschulsky, 1843: 658 E: GG N: EG

subgenus *Nipponogeorissus* Satô, 1972: 212 type species *Georissus granulatus* Satô, 1972
granulosus Satô, 1972: 212 A: JA

family HYDROCHIDAE Thomson, 1859

genus *Hydrochus* Leach, 1817: 90 type species *Silpha elongata* Schaller, 1783

- Amrishi* Makhan, 1998a: 143 type species *Hydrochus lacustris* Nietner, 1856
Aschius Makhan, 2004: 12 type species *Hydrochus squamifer* LeConte, 1855
Deepakius Makhan, 1998a: 141 type species *Deepakius amrishi* Makhan, 1998
Kiransus Makhan, 1994: 160 type species *Kiransus aschnaae* Makhan, 1994
Rishihydroius Makhan, 2001a: 84 type species *Hydrochus megaphallus* Berge Henegouwen, 1988
Rishwanus Makhan, 1998a: 144 type species *Hydrochus soesilae* Makhan, 1994 (= *Hydrochus richteri* Bruch, 1915)
Satishius Makhan, 2004: 11 type species *Satishius tishi* Makhan, 2004
Soesilius Makhan, 2001b: 390 type species *Hydrochus dewnaraini* Makhan, 1992
- aequalis* Sharp, 1884b: 457 A: JA
aljibensis Castro & Delgado, 1999: 26 E: PT SP
angusi Valladares, 1988: 84 E: SP
angustatus angustatus Germar, 1824: 90 E: BE CR FR GB GE IR IT LU NL PT SP
ramiroi Roubal, 1934d: 43
rugiceps Rey, 1886: 9
salinus Rey, 1886: 10
sculptus Rey, 1886: 10
subcyanescens Gozis, 1919: 127
brevis Herbst, 1793: 141 (*Elophorus*) E: AU BE BY CT CZ DE EN FI FR GB GE GG HU IR IT LA LT LU NL NR NT
 PL SK SV SZ UK A: ES TR
chubu Balfour-Browne & Satô, 1962: 3 A: JA
crenatus Fabricius, 1792a: 205 (*Elophorus*) E: AU BE BU BY CR CT CZ DE EN FI FR GB GE HU IT LA LU NL PL
 SK SL ST SV SZ A: WS
carinatus Germar, 1824: 89
elongatus Schaller, 1783: 257 (*Silpha*) E: AU BE BY CR CT CZ DE FR GB GE HU IT LA LU PL SK SL SV SZ A: ES
 KZ WS TR "Central Asia"
cicindeloides Marsham, 1802: 411 (*Hydrophilus*)
crenulatus Motschulsky, 1860b: 104
elongatus Fabricius, 1792a: 204 (*Elophorus*) [HN]
sibiricus Motschulsky, 1860b: 104
farsicus Hidalgo-Galiana, Jäch & Ribera, 2010: 61 A: IN
flavipennis Küster, 1852: no.55 E: AB AL AU BH CR CZ IT ME PL SP ST UK N: TU A: TR
filiformis Kuwert, 1887c: 291 [DA]
foveostriatus Fairmaire, 1859b: 786 [DA]
fuscipennis Kuwert, 1887c: 291 [DA]
obtusicollis Fairmaire, 1877a: 141 [DA]
testaceipennis Kuwert, 1887c: 291 [DA]

- grandicollis* Kiesenwetter, 1870: 73 E: FR IT SL SP N: CI TU
ibericus Valladares, Díaz & Delgado, 1999: 82 E: SP
ignicollis Motschulsky, 1860b: 104 E: AU BE BY CT CZ DE EN FI GB GE HU IR LA LT LU NR NT PL SK ST SV YU
 A: TR WS
interruptus L. Heyden, 1870: 72 E: PT SP
martinae Makhan, 1996: 185
japonicus Sharp, 1873b: 64 A: HUN JA LIA TAI AUR ORR
annamita Régimbart, 1903b: 64
kirgisis Motschulsky, 1860b: 103 E: BY CT NT UK A: ES FE KZ WS
lacustris Nietner, 1856: 14 A: "India" ORR
laferi Shatrovskiy, 1989: 275 A: FE
megaphallus Berge Henegouwen, 1988: 19 E: AU BE BY CZ DE EN FI GB GE HU NL NR PL RO ST SV TR
nitidicollis Mulsant, 1844a: 49 E: BE FR GB GE IT PT SP N: "Northwest Africa"
flavipennis Gozis, 1919: 125 [HN] [DA]
funebrior Gozis, 1919: 125 [DA]
impressus Rey, 1885a: 21 [HN]
nodulifer Reitter, 1897d: 210 E: AB A: IN TR
nooreinus Berge Henegouwen & Sáinz-Cantero, 1992: 26 E: SP
octocarinatus Hochhuth, 1871: 249 E: UK
opacus Motschulsky, 1860b: 103 A: "India"
violaceomicans Motschulsky, 1860b: 103
rishi Makhan, 1995: 193 A: GUX HUN ORR
rhytipterus Jia & W. Wu, 1999: 308 A: HUN
roberti Shatrovskiy, 1993: 828 E: AB ST
smaragdineus Fairmaire, 1879b: 159 E: FR PT SP N: AG MO TU
bicolor Rey, 1885a: 20
fossula Rey, 1886: 11
tariqi Ribera, Hernando & Aguilera, 1999: 99 E: SP N: MO

family SPERCHEIDAE Erichson, 1837

- genus *Spercheus* Kugelann, 1798: 241 type species *Dytiscus emarginatus* Schaller, 1783
belli babylonicus Hebauer, 1997a: 34 A: IQ
belli belli Champion, 1919d: 239 A: PA UP ORR
binodulus Champion, 1919d: 239
gibbus Champion, 1919d: 238
cerisyi Guérin-Ménéville, 1842: 71 N: EG A: IQ IS AFR
capicola Péringuey, 1892b: 107
crenaticollis Régimbart, 1906: 271
emarginatus Schaller, 1783: 327 (*Dytiscus*) E: AB AU BE BU BY CR CT CZ DE EN FR GB GE GR HU IT LA LT LU
 NL NT PL RO SK ST SV SZ TR UK A: FE IN KZ TD TR "Central Asia" "South Siberia"

- luridus* Mathieu, 1858: 33
sordidus Marsham, 1802: 403 (*Hydrophilus*)
texanus Spangler, 1961: 117
verrucosus Marsham, 1802: 404 (*Hydrophilus*)
platycephalus interruptus Fairmaire, 1892a: 88 N: EG AFR
senegalensis Laporte, 1832: 398 A: TR AFR
algoensis Péringuey, 1892b: 108
distinguendus Fairmaire, 1893: 147
sulcatus Gory, 1834: pl. 20

family HYDROPHILIDAE Latreille, 1802

subfamily **Hydrophilinae** Latreille, 1802

tribe **Amphiopini** Kuwert, 1890

genus **Amphiops** Erichson, 1843: 229 type species *Hydrophilus gibbus* Illiger, 1801

- Cyprimorphus* Fairmaire, 1873: 334 type species *Cyprimorphus compressus* Fairmaire, 1873 (= *Coelostoma senegalense* Laporte, 1840)
caristripus Jia, 1994: 100 (102) A: FUJ
coelopunctatus F.-L. Jia, 2014 A: HAI
coomani d'Orchymont, 1926: 246 A: GUA HAI HKG MAC ORR
mater Sharp, 1873b: 62 A: BEI FUJ GUA GUI GUX HAI HUB HUN JA JIA JIX NP SC SCH TIA YUN ZHE ORR
annamita Régimbart, 1903b: 62
pedestris Sharp, 1890: 354
varians d'Orchymont, 1922: 629
mirabilis Sharp, 1890: 355 A: GUA GUX HAI JIA SHN YUN ORR
variolosus Régimbart, 1903b: 63
yunnanensis Pu, 1963: 82 (80)
phallicus d'Orchymont, 1936c: 114 N: EG A: IS AFR
senegalensis Laporte, 1840b: 59 (*Coelostoma*) N: EG MO AFR
abeillei Guillebeau, 1896b: 229
compressus Fairmaire, 1873: 334 (*Cyprimorphus*)
lucidus Erichson, 1843: 231

tribe **Berosini** Mulsant, 1844

genus **Allocotocerus** Kraatz, 1883: 14 type species *Allocotocerus bedeli* Kraatz, 1883

- Ashnaia* Makhan, 2007a: 1 type species *Ashnaia soesilae* Makhan, 2007
Globaria Latreille, 1829: 521 [HN] type species *Globaria leachii* Hope, 1838
Spheroides Hope, 1838: 168 [HN] (no type species designated)
leachii Hope, 1838: pl. 3 [fig. 6 + p. 167] (*Globaria*) A: GUA GUX ORR
narayanus Hebauer, 2002a: 8 A: NP
striatopunctatus Laporte, 1840b: 57 (*Globaria*) A: SA ORR
subditus d'Orchymont, 1939a: 105 (*Globaria*) A: YUN

genus *Berosus* Leach, 1817: 92 type species *Dytiscus luridus* Linnaeus, 1760

Hygotrophus W.J. Macleay, 1873: 131 type species *Hygotrophus nutans* W.J. Macleay, 1873

Paraberosus Kuwert, 1890a: 113 type species *Paraberosus nigriceps* Kuwert, 1890 (= *Hydrophilus nigriceps* Fabricius, 1801)

subgenus *Berosus* Leach, 1817: 92 type species *Dytiscus luridus* Linnaeus, 1760

Euberosus Acloque, 1896: 94 type species *Dytiscus luridus* Linnaeus, 1760

***affinis* Brullé, 1835:** 285 E: AL AU BH BU CR FR GB GR IT MC ME NL PT SL SP TR YU N: AG EG MO TU A: CY

IN IS SY TR

algericus Kuwert, 1890a: 120

murinus Küster, 1844: no.36

pelagicus Kuwert, 1888c: 139

salmuriensis Ackermann, 1853: 197

sardous Kuwert, 1888c: 139

suturalis Küster, 1844: no.37

byzantinus Ganglbauer, 1904a: 225 E: GR A: KZ TR

corrugatus Régimbart, 1906: 266 A: YE (Suqutra) AFR

dentatis Wu & Pu, 1997: 190 [193] A: FUJ GUA GUI HEI HUN JIX SCH SHG YUN

dispar Reiche & Saulcy, 1856: 355 E: "Caucasus" A: IQ IS LE SY TR

fuscostriatus Fairmaire, 1892a: 87 N: AG A: OM SA YE AFR

geminus Reiche & Saulcy, 1856: 356 E: AU CR CZ GE IT PL RO SK "Caucasus"

hispanicus Küster, 1847: no.80 E: AU CR CZ FR GR IT MA NL PT SP N: AG LB MO TU A: TR AFR

lineicollis A. Costa, 1884: 49

subciliaris Rey, 1885b: 348

insolitus d'Orchymont, 1937c: 40 A: IN KU PA SA

japonicus Sharp, 1873b: 61 A: GUA GUI GUX HUB HUN JA JIX SC SCH TAI ZHE

luridus Linnaeus, 1760: 214 (*Dytiscus*) E: AL AU BE BH BU BY CR CT CZ DE EN FI FR GB GE HU IR IT LA LT

NL NR NT PL RO SK SL ST SV SZ UK YU "Caucasus" A: TR WS

chalcaspis Eschscholtz, 1818: 457 (*Hydrophilus*)

fuscus De Geer, 1774: 378 (*Hydrophilus*) [RN]

globosus Curtis, 1828: pl. 240

lapponicus J. Sahlberg, 1894: 47

sculptus Solsky, 1873: 308

***nigriceps* Fabricius, 1801a:** 254 (*Hydrophilus*) A: IN IQ NP OM PA SA UP YE AFR ORR

aeneiceps Motschulsky, 1861: 110

immaculicollis Fairmaire, 1892a: 88

melanocephalus Kuwert, 1890a: 113 (*Paraberosus*)

nigriceps Kuwert, 1890a: 114 (*Paraberosus*) [HN]

***problematicus* Schödl, 1993b:** 214 N: EG A: IN YE

***pulchellus* W.S. Macleay, 1825:** 35 A: HUB HUN FUJ GUA GUI GUX HAI HKG IN JA JIA JIX NP SA SCH TAI UP

YUN ZHE AUR ORR

decrescens Walker, 1859: 258

pubescens Mulsant & Rey, 1858: 319

vestitus Sharp, 1884b: 456

punctipennis Harold, 1878: 67 A: ES FE HEI HUN JA JIA LIA MG NMO SC TAI

rubiginosus Kuwert, 1890a: 116 A: OM SA YE AFR

australis Péringuey, 1892a: 23 (*Spercheus*)

signaticollis Charpentier, 1825: 204 (*Hydrophilus*) E: AL AU BE BH BU BY CR CT CZ DE EN FR GB GE GG
GR HU IR IT LT MC ME NL NR PL PT RO SK SL SP ST SV SZ UK YU N: AG MO TU A: AF IN KZ TD TM TR
UZ WS

aericeps Curtis, 1828: pl. 240

corsicus Desbrochers des Loges, 1869: (45)

krueperi Kuwert, 1890a: 117

subgenus *Enoplurus* Hope, 1838: 128 type species *Hydrophilus spinosus* Steven, 1808

Acanthoberosus Kuwert, 1888c: 130 type species *Hydrophilus spinosus* Steven, 1808

Anchialus Thomson, 1859: 17 [HN] type species *Hydrophilus spinosus* Steven, 1808

asiaticus Kuwert, 1888c: 132 A: IN IQ KU TR XIN

assamensis Schödl, 1992: 141 A: NP ORR

atlanticus Queney, 2007: 93 E: FR

atrodorsus Jia & Pu, 1997: 190 [194] A: HEI

bispina Reiche & Saulcy, 1856: 356 E: GR IT SP ST UK N: AG EG TU A: AF IN IS KZ LE SY TM TR

aethiops Kuwert, 1888c: 135

numidicus Kuwert, 1888c: 131

chinensis Knisch, 1922: 111 A: AF GUA GUX HKG IN KA NP PA SD UP YUN ORR

fallax d'Orchymont, 1937b: 30

cuspidatus Erichson, 1843: 228 N: EG AFR

acutispina Fairmaire, 1869a: 196

bispinosus Boheman, 1851: 591

gracilispina Régimbart, 1906: 264

dentalis İncekara, Mart, Polat, Aydoğan, Türken, Taşar & Bayram, 2011: 238 A: TR

elongatulus Jordan, 1894: 112 A: AF GUA GUX FUJ HKG JIX JA TAI YUN AFR ORR

fairmairei Zaitzev, 1908b: 355 [RN] A: FUJ GUA GUX HAI HEN HKG JA NP PA TIA YUN ORR

acutispina Fairmaire, 1889b: 336 [HN]

fischeri Schödl, 1993a: 29 A: BEI FE GAN HEI HEN MG TIA

frontifoveatus Kuwert, 1888c: 131 E: AB AU BH BU CR CZ FR GE HU IT NR PL RO ST UK YU N: EG A: AF IN KZ
TM TR WS

fulvus Kuwert, 1888c: 134 E: AU DE FI FR GB GE HU NL SP ST SV A: ES HEN IN KZ MG NMO TM TR WS

furcatus Boheman, 1851: 590 N: AG EG AFR

aegyptiacus Kuwert, 1888c: 130

guttalis Rey, 1883b: 88 E: FR SP N: AG MO TU A: TR

huangi Jia & Pu, 1997: 192 [193] A: YUN

incretus d'Orchymont, 1937a: 12 A: GUA GUX HAI HKG JA MAC NP TAI UP YUN ORR

indicus Motschulsky, 1861: 110 (*Enoplurus*) A: NP PA UP ORR

indiges Schödl, 1992: 150 A: PA ORR

- ineditus* d'Orchymont, 1937a: 11 A: YUN ORR
- jaechi* Schödl, 1991: 118 E: FR GR IT SP YU N: EG A: TR GAN HEB NMO
- lewisius* Sharp, 1873b: 61 A: BEI FE HEI GUA GUX HKG HUB HUN JA JIA JIX MG NC NMO SC SCH SHA SHG
SHX YUN ZHE ORR
- nipponicus* Schödl, 1991: 123 A: JA ZHE
- spinus* Steven, 1808: 8 (*Hydrophilus*) E: AB AL AU BH BU BY CR DE EN FI FR GB GE GG GR HU IT LA MC
ME NL NR PL RO SK SL ST SV TR UK YU N: TU A: AF IN KI KZ MG TD TIA TM TR UZ WS XIN
- apicalis* Samouelle, 1832: no. 5-1
- lenkoranus* Kuwert, 1888c: 133
- samarkanti* Kuwert, 1888c: 132
- schusteri* Kuwert, 1888c: 133
- tayouanus* Ueng, Wang & Wang, 2007: 88 [RN] A: FUI TAI ZHE
- salinus* Ueng, Wang & Wang, 2006: 63 [HN]
- yunnanensis* Jia & Pu, 1997: 191 [194] A: YUN

- genus *Regimbartia* Zaitzev, 1908b: 362 [RN] type species *Volvulus inflatus* Brullé, 1835
- Brachygaster* Mulsant, 1853: 173 [HN] (no type species designated)
- Spheroides* Hope, 1838: 168 [HN] (no type species designated)
- Volvulus* Brullé, 1835: 282 [HN] type species *Volvulus inflatus* Brullé, 1835
- attenuata* Fabricius, 1801a: 253 (*Hydrophilus*) A: AF FUJ GUA GUI HAI HUN JA JIA JIX NP OM PA SC SCH TAI
YE YUN "India" "Kurdistan" AUR ORR
- aenea* Brullé, 1835: 283 (*Volvulus*)
- indica* Mulsant, 1853: 179 (*Brachygaster*)
- metallescens* Mulsant, 1853: 178 (*Brachygaster*)
- profunda* Sharp, 1873b: 62 (*Volvulus*)
- scaphiformis* Fairmaire, 1879a: 83 (*Volvulus*)
- compressa* Boheman, 1851: 588 (*Volvulus*) N: EG AFR
- jaegerskioeldi* Sharp, 1904: 5 (*Volvulus*)
- nilotica* Sharp, 1904: 5 (*Volvulus*) N: EG AFR
- compressa* Régimbart, 1906: 267 (*Volvulus*) [HN]

tribe Laccobiini Houlbert, 1922

- genus *Arabhydrus* Hebauer, 1997c: 261 type species *Arabhydrus gallagheri* Hebauer, 1997
- gallagheri* Hebauer, 1997c: 262 A: OM
- genus *Hydrophilomima* M. Hansen & Schödl, 1997: 187 type species *Hydrophilomima jaechi* M. Hansen &
Schödl, 1997
- yunnanensis* M. Hansen & Schödl, 1997: 193 A: YUN
- genus *Laccobius* Erichson, 1837: 202 type species *Chrysomela minuta* Linnaeus, 1758
- subgenus *Compsolaccobius* Ganglbauer, 1904a: 251 type species *Hydrophilus decorus* Gyllenhal, 1827

decorus Gyllenhal, 1827: 275 (*Hydrophilus*) E: EN FI GG LA ST SV UK A: AF ES KI KZ MG QIN TD TM TR UZ
WS

pallidissimus Reitter, 1899b: 197 A: AF KI KZ TD TM UZ XIN

subgenus *Cyclolaccobius* Gentili, 1991: 381 type species *Laccobius rectus* Sharp, 1890

almoranus Gentili, 1995: 255 A: UP

arabicus Gentili, 1980: 31 N: EG A: SA YE AFR

bacchusi Gentili, 1979a: 44 A: HP NP UP

confusus Gentili, 1996: 23 A: HP NP PA

cribratus Gentili, 1989a: 35 A: NP UP

cyclicus Gentili, 1996: 24 A: SD ORR

fuscus Gentili, 1995: 256 A: HP UP

globulus Gentili, 1995: 257 A: UP

hainanensis Jia, Gentili & Fikáček, 2013: 406 A: HAI

hanka Gentili & Fikáček, 2009: 612 A: AP

hingstoni d'Orchymont, 1926a: 104 A: UP XIZ

championi Knisch, 1927: 132

imperialis Knisch, 1924b: 35 A: BT NP SD UP

inermis Gentili, 1995: 255 A: UP

osefi Gentili & Fikáček, 2009: 615 A: AP

kumaonicus Gentili, 1988: 36 A: UP

martini Jia, Song & Gentili, 2013: 92 A: GUX

masatakai Kamite, Ogata & Hikida, 2007: 35 A: JA

nitidus Gentili, 1984: 32 A: AHN FUJ HUN JIX SCH SHA ZHE

patruelis Knisch, 1924b: 36 A: HP NP PA UP ORR

inermis Hebauer & Wang, 1998: 42 (*Oocyclus*) [HN]

manalicus Short & Fikáček, 2011: 101 [RN]

politus Gentili, 1979a: 46 A: TAI YUN

flaveolus Hebauer & Wang, 1998: 41 (*Oocyclus*)

regalis Knisch, 1924b: 34 A: UP

schawalleri Gentili, 2003: 414 A: NP

silvester Gentili, 2006: 72 A: NP

yunnanensis Gentili, 2003: 415 A: SW

zugmayeri Kniž, 1910b: 454 A: NP XIZ

subgenus *Dimorpholaccobius* Zaitzev, 1938: 120 type species *Laccobius sulcatulus* Reitter, 1909

Brachypalpus Laporte, 1840b: 56 [HN] type species *Hydrophilus bipunctatus* Fabricius, 1775

Macrolaccobius Gentili, 1974: 550 type species *Hydrophilus striatulus* Fabricius, 1801

albescens Rottenberg, 1874a: 308 E: AU BH CR CZ FR GE IT SL SZ

similis Gentili, 1973: 61

atratus Rottenberg, 1874a: 308 E: AU BE CZ FR GB GE HU IR NL PT SP N: MO TU

subregularis Rey, 1885b: 299

atricolor d'Orchymont, 1938a: 4 N: MR

- atrocephalus atrocephalus* Reitter, 1872: 178 E: IT SP N: AG EG LB MO TU A: IS SY AFR
carreti Guillebeau, 1896b: 227 (245)
purpuratus Guillebeau, 1896b: 227
- atrocephalus canariensis* d'Orchymont, 1940d: 71 N: CI
- bipunctatus* Fabricius, 1775: 229 (*Hydrophilus*) E: AL AR AU BE BH BU BY CR CZ DE EN FI FR GB GE GR HU
 IR IT LA LT LU MC NL NR NT PL PT RO SK SL SP SV SZ UK YU N: MO TU A: KZ TM TR WS XIN
alutaceus Thomson, 1868: 313
emmeryanus Rottenberg, 1874a: 318
graecus Rottenberg, 1874a: 317
- chiesai* Gentili, 1974: 556 A: IN KZ NP TR
- elmii* Gentili & Sadeghi, 2003: 40 A: IN
- eremita* Gentili, 1989b: 100 A: SA
- gloriana* Gentili & Ribera, 1998: 194 E: SP
- halophilus* Gentili, 1982: 37 A: IN TR
- hauserianus* Kniž, 1914: (116) A: KZ IN IQ TD TM TR
- hindukuschi* Chiesa, 1966: 302 E: AB AR GG RU A: AF HP IN IQ KI NP PA TD TM TR UP UZ
farsicus Gentili, 1975: 128
- hispanicus* Gentili, 1974: 553 E: FR IT SP N: AG MO
- hoberlandti* Gentili, 1982: 35 E: AB A: IN TR
znojki Shatrovskiy, 1984: 320
- hopaensis* Mart, İncekara & Erman, 2003: 77 A: TR
- kashmirensis* d'Orchymont, 1943d: 1 A: KA PA
- levantinus* Balfour-Browne, 1939a: 31 A: IS "Palestine"
- lycius* Gentili & Whitehead, 2000: 74 A: TR
- moraguesi* Régimbart, 1898: 350 E: IT MA SP N: AG MO TU A: IN
peyerimhoffi d'Orchymont, 1939c: 369
- neapolitanus* Rottenberg, 1874a: 308 E: AU CZ FR GE GR IT SL SP SZ N: AG MO TU
laevis Gerhardt, 1877a: 20 [DA]
- obscuratus aegaeus* Gentili, 1974: 558 E: GR TR UK (Krym) A: TR
- obscuratus meridionalis* Gentili, 1974: 560 A: AF TD ORR
- obscuratus obscuratus* Rottenberg, 1874a: 308 E: AB AL AR AU BE BH BU CR CZ FR GB GE GG GR HU IT MC
 ME NL PL PT RO SK SL SP SZ UK A: IN IS TD TM TR AFR
minor Rottenberg, 1874a: 308 [HN]
obscurus Gerhardt, 1877a: 20
regularis Rey, 1885a: 14
rufescens Rottenberg, 1874a: 308 [DA]
- obscuratus orchymonti* Gentili, 1976: 143 A: CY IS LE SY TR
- sculptus* d'Orchymont, 1935: 17 E: FR GB N: MO A: IQ TR
- scutellaris* Motschulsky, 1855b: 84 E: AB BH BU CR GR MC ME SL TR N: EG TU A: CY IS LE TR
sternocrinis Kuwert, 1890a: 77
- simulans* d'Orchymont, 1923a: 7 A: HP NP SCH SD UP YUN ORR
knischi Balfour-Browne, 1939a: 30

- simulatrix* d'Orchymont, 1932b: 398 E: AB AL AU BH BU CR CT CZ FR GB GG GR HU IN IT MC PL RO SK TR
UK (Krym) YU A: AF IN KZ TM TR
kuwerti Zaitzev, 1938: 117
- sinuatus binaghii* Gentili, 1974: 554 E: FR (Corse) IT (Sardegna)
- sinuatus sinuatus* Motschulsky, 1849: 80 E: AU BE BH BU BY CR CT CZ DE FI FR GB GE GR HU IT LA LT NL
NT PL PT RO SK SP ST SV SZ UK N: AG MO TU
cupreus Rey, 1884b: 267 [HN] [DA]
oblongus Gorham, 1907: 54
- sipylus* d'Orchymont, 1939c: 371 E: AB AR A: IN IQ LE TR
- striatulus* Fabricius, 1801a: 254 (*Hydrophilus*) E: AL AR AU BE BH BU BY CR CT CZ DE EN FI FR GB GE GG GR
HU IR LA LU MC ME NL NR NT PL PT RO SK SL SP ST SV SZ TR UK YU N: TU A: KI KZ TR ZU XIN
belgicus Gentili, 1979b: 47
bucciarellii Gentili, 1974: 550
maculiceps Rottenberg, 1874a: 308
maculiceps Gerhardt, 1877a: 17 [HN]
nigriceps Thomson, 1853: 50
purpurascens Newbery, 1908: 30
signiceps Kuwert, 1890a: 78 [DA]
- sulcatulus* Reitter, 1909c: 80 E: AB AR GG A: IN TD TM TR
- syriacus* Guillebeau, 1896b: 228 E: AB AL AU BH BU CZ GG GR HU MC RO SK UK YU N: EG A: AF CY IN IQ IS
JO KI KZ LE SY TD TM TR ORR
afghanus Chiesa, 1966: 301
laevicollis Ganglbauer, 1904a: 254
- torbaticus* Sadeghi & Gentili, 2004: 75 A: IN
- varius* Gentili, 1975: 127 E: AU RO UK
- ytensis* Sharp, 1910b: 250 E: BE CZ FR GB GE IR IT NL PL PT SP SZ N: MO TU
- ziguensis* Jia, 1997b: 650 A: HUB
- subgenus *Glyptolaccobius* Gentili, 1989a: 36 type species *Laccobius affinis* Knisch, 1927
affinis Knisch, 1927: 132 A: NP UP
celsus Gentili, 1989a: 36 A: NP
egregius Gentili, 1995: 252 A: UP
eliogentilii Hebauer, 2002a: 14 A: NP
guttalis Gentili & Fikáček, 2009: 611 A: NP
incisus Gentili, 1989a: 36 A: NP UP
jaechi Gentili, 1988: 32 A: NP
moriyai Kamite, Ogata & Hikida, 2007: 36 A: JA
munus Gentili, 1995: 251 A: NP
qinlingensis Jia, Gentili & Fikáček, 2013: 403 A: SHA
sharmai Gentili, 1995: 252 A: NP
- subgenus *Hydroxenus* Wollaston, 1867: 40 type species *Hydroxenus subpictus* Wollaston, 1867
Platylaccobius Gentili, 1974: 549 type species *Laccobius mulsanti* Zaitzev, 1908
femoralis femoralis Rey, 1885b: 294 E: FR IT

- femorialis mulsanti* Zaitzev, 1908b: 393 [RN] E: FR IT PT SP SZ N: AG MO
pallidus Mulsant & Rey, 1861a: 61 [HN]
- leucaspis* Kiesenwetter, 1870: 68 N: EG A: IN IS LE SA AFR
mascarensis Spangler, 1980: 703
- revelieri* Perris, 1864: 278 E: FR IT PT SP N: AG MO TU AFR
debilis Rottenberg, 1874a: 322
elongatus Tournier, 1878: 437 [HN]
- subpictus erlangeri* Régimbart, 1905: 218 A: SA YE AFR
propinquus Régimbart, 1905: 218
- subgenus** *Laccobius* Erichson, 1837: 202 type species *Chrysomela minuta* Linnaeus, 1758
- albipes* Kuwert, 1890a: 83 E: AL AU BE BH BU CT CZ FR GE GR HU IT NL PL RO SK ST YU "Caucasus" A:
 KZ TR
- bedeli* Sharp, 1884b: 455 A: FE HEI JA LIA NMO SC
binotatus d'Orchymont, 1934b: 109 A: ANH BEI CHQ FE FUJ GAN GUA GUI HEI HEN HUB HUN JIL LIA NMO
 NC QIN SC SHA SHN SHX YUN ZHE
czerskii Zaitzev, 1938: 116
- cinereus* Motschulsky, 1860b: 103 A: ES FE KI LIA MG NMO QIN SHX UZ
densatus Rey, 1884b: 267 [DA]
littoralis J. Sahlberg, 1900b: 189
- colon* Stephens, 1829c: 133 (*Hydrobius*) E: AU BE BH BU BY CR CT CZ DE FI FR GB GE HU IR LA LU MC NL NT
 PL RO SK SL ST SV SZ UK YU A: ES FE HEI KZ MG NIN NMO SHA TIA UZ WS XIN
biguttatus Gerhardt, 1877a: 23
mongolicus Gentili, 1973: 62
nanulus Rottenberg, 1874a: 316
- expectans* Gentili, 1980: 30 A: BEI SHN
- inopinus* Gentili, 1980: 30 A: FE FUJ GUA JA JIL JIX LIA
miyuki Matsui, 1986: 86
- kunashiricus* Shatrovskiy, 1984: 308 A: FE JA
- minutus* Linnaeus, 1758: 372 (*Chrysomela*) E: AU BE BH BU BY CR CT CZ DE EN FI FR GB GE HU IR IT LA LT
 MC ME NL NR NT PL RO SK SL SP ST SV SZ UK YU A: ES FE HEI KI KZ MG NMO SHA TR WS XIN
chrysolinus O.F. Müller, 1776: 69 (*Hydrophilus*)
coccinelloides Schrank, 1781: 199 (*Dytiscus*)
dermestoides Forster, 1771: 53 (*Dytiscus*)
globosus Heer, 1841: 481
perla Geoffroy, 1785: 12 (*Scarabaeus*)
marginellus Herbst, 1784: 129 (*Dytiscus*) [DA]
minimus Gredler, 1863a: 77 [DA]
pallidus Laporte, 1840b: 57 (*Brachypalpus*) [DA]
- nobilis* Gentili, 1979a: 34 A: FE FUJ GUI HUB HUN JIX SCH YUN
- subgenus** *Microlaccobius* Gentili, 1974: 550 type species *Laccobius gracilis* Motschulsky, 1855
- algiricus* M. Hansen, 1999a: 147 [RN] E: GR IT N: AG EG TU A: SA AFR
minimus Kuwert, 1890a: 76 [HN]

- alternus* Motschulsky, 1855b: 84 E: AL AR AU BH CR CZ FR GE GR HU IT MC PL RO SK SL SP ST SZ UK YU
 "Caucasus" A: TR
gracilis Rottenberg, 1874a: 320 [HN]
nigritus Rottenberg, 1874a: 320
peezi Chiesa, 1959: 133
andersi Hebauer, 2002b: 16 A: FE
argillaceus J. Sahlberg, 1900b: 188 A: KI NP SD TD UP ORR
cretaeus Gentili, 1975: 132 E: GR (Kriti)
elegans Gentili, 1979b: 45 A: FUJ HEN SCH SHA SHN YUN ORR
exilis Gentili, 1974: 560 A: AF BT CY IN NP PA SCH SD TD TM TR UP UZ ORR
eximius Kuwert, 1890a: 71 A: SA YE (Suqutra)
florens Gentili, 1979a: 48 A: FUJ GUA GUX SHN
formosus Gentili, 1979a: 48 A: FE GAN GUA GUX HAI HUB HUN JIX LIA SHA SHN TAI ORR
fragilis Nakane, 1966: 57 A: GAN JA LIA SC SHA TAI
gangeticus Gentili, 1979a: 37 A: NP SD UP
gracilis gracilis Motschulsky, 1855b: 84 E: AL AU BE BH BU BY CR CZ FR GE GG GR HU IT MC ME PL PT RO
 SK SL SP ST SZ TR UK N: AG CI LB MO TU A: IN IS TR
intermittens Kiesenwetter, 1870: 69
signatus Kuwert, 1890a: 79
subtilis Kiesenwetter, 1870: 69
viridiceps Rottenberg, 1870: 23
gracilis sardeus Baudi di Selve, 1864: 222 E: IT (Sardegna)
gracilis sellae Sharp, 1874d: 317 E: IT
hammondi Gentili, 1984: 31 A: AHN BEI FUJ GAN GUA GUI GUX HUN JIX LIA SCH SHA SHN TAI
harteni Fikáček, Gentili & Short, 2010: 142 A: AE
hebaueri Gentili, 1989b: 100 N: EG
himalayanus Gentili, 1988: 34 A: NP SD YUN ORR
indonesiae Gentili, 1979a: 47 A: SD ORR
kaszabi Chiesa, 1966: 300 A: AF KA PA
kyrgyzicus Gentili, 2003: 423 A: KI
laotianus Gentili, 1979a: 40 A: NP ORR
macrophthalmus Gentili, 1982: 32 A: IN
minor Wollaston, 1867: 42 (*Hydroxenus*) A: IS LE SA YE AFR
mistus Gentili, 1989a: 35 A: NP SD
nakanei Gentili, 1982: 33 A: JA
nepalensis Gentili, 1982: 33 A: HAI NP SD ORR
orientalis Knisch, 1924b: 33 N: TU A: AF BT IN IQ KU KZ NP SD TD TM UP ORR
orsenigoi Gentili, 1980: 31 A: IN
oscillans Sharp, 1884b: 455 A: FE JA NC SC
nipponicus Gentili, 1979a: 43
ovatus Gentili, 1979a: 36 A: IN ORR
persicus Gentili, 1974: 562 E: AB A: IN TR

- philipinus* Gentili, 2005: 362 A: TAI ORR
- praecipuus* Kuwert, 1890a: 81 N: AG CI EG A: AE IS OM QA SA YE AFR
- singularis* Kuwert, 1890a: 71
- thermalis* J. Müller, 1941b: 326
- problematicus* Gentili, 1988: 35 A: BT NP SD UP
- quaesitus* Gentili, 1988: 35 A: IN NP PA TM TR
- roseiceps* Régimbart, 1903b: 59 A: HKG JA NP UP AUR ORR
- satoi* Gentili, 1989a: 35 A: JA
- shatrovskiy* Gentili, 1988: 35 A: TD
- sinicus* Gentili, 1975: 129 A: XIN
- sublaevis* J. Sahlberg, 1900b: 189 A: KI KZ NP TD TM UP UZ
- thermarius jelineki* Gentili, 1975: 130 E: SK
- thermarius thermarius* Tournier, 1878: 436 E: SZ
- tonkinensis* Gentili, 1979: 42 A: SHA ORR
- yonaguniensis* Matsui, 1993: 319 A: JA
- subgenus** *Notoberosus* Blackburn, 1895a: 30 type species *Notoberosus zietzi* Blackburn, 1895
- Ortholaccobius* Ganglbauer, 1904a: 251 type species *Laccobius pommayi* Bedel, 1881
- pommayi* Bedel, 1881: 313 N: AG MO TU
- genus** *Oocyclus* Sharp, 1882: 61 type species *Oocyclus brevicornis* Sharp, 1882
- Enochroides* Kuwert, 1890a: 62 type species *Enochroides decorus* Kuwert, 1890
- Beralitra* d'Orchymont 1919: 145 type species *Beralitra obscura* d'Orchymont 1919
- bhutanicus* Satô, 1979: 53 A: BT NP TAI ORR
- dinghu* Short & Jia, 2011: 66 A: GUA
- fikaceki* Short & Jia, 2011: 65 A: FUJ GUA JIX
- magnificus* Hebauer & Wang, 1998: 43 A: TAI
- shorti* Jia & Maté, 2012: 81 A: GUA HKG
- sumatrensis* d'Orchymont, 1932c: 685 A: HAI ORR
- nudus* Balfour-Browne, 1939d: 296
- genus** *Paracymus* Thomson, 1867a: 120 type species *Hydrophilus aeneus* Germar, 1824
- Eumetacymus* Brèthes, 1922: 263 type species *Eumetacymus virescens* Brèthes, 1922 (= *Paracymus rufocinctus* Bruch, 1915)
- Paracymorphus* Kuwert, 1888a: 39 type species *Paracymorphus globuloides* Kuwert, 1888 (= *Hydrobius scutellaris* Rosenhauer, 1856)
- Quasiparacymus* Marjanian, 2009: 124 type species *Hydrobius chaliceolus* Solsky, 1874
- aeneus* Germar, 1824: 96 (*Hydrophilus*) E: AL AU BU CR CZ DE FR GB GE GR IR IT NL NR PL PT RO SL SP ST SV UK "Caucasus" N: EG TU A: ES FE IN IS KI KZ MG TD TM TR XIN "Middle Asia"
- cupreus* Dalla Torre, 1877: 68 (*Laccobius*)
- punctulatus* Sturm, 1836: 15 (*Hydrobius*)
- salinus* Bielz, 1851: 152 (*Hydrobius*)

- atomus* d'Orchymont, 1925b: 202 A: FUJ GUA HAI JIX ORR
chalceolus Solsky, 1874: 149 (*Hydrobius*) E: AB ST A: AF TR UZ
caucasicus Kuwert, 1890a: 65
maximus Peyerimhoff, 1929c: 121 N: TU
mimicus Wooldridge, 1977: 123 A: HAI ORR
orientalis d'Orchymont, 1925b: 201 A: FUJ GUA GUI GUX HAI JA JIX NP ORR
satsumanus Matsui, 1986: 88
phalacroides Wollaston, 1867: 47 (*Hydrobius*) E: FR SP N: MO AFR AURi NTRI
punctillatus Rey, 1885b: 273
relaxus Rey, 1884b: 267 E: CR GG GR IT RO SP ST N: AG CI EG LB TU A: CY IN IQ IS KU NP SA TD TM TR
XIN YE
schneideri Kuwert, 1888e: 293
scutellaris Rosenhauer, 1856: 57 (*Hydrobius*) E: AL BE BU CR FR GB GE GR IR IT NL PT SL SP N: AG MO TU A:
CY TR
globuloides Kuwert, 1888a: 39 (*Paracymorphus*)
nigroaeneus J. Sahlberg, 1875: 219 (*Anacaena*)
vulgatus Wooldridge, 1977: 120 A: NP PA SD UP ORR
zaitzevi Shatrovskiy, 1989: 290 A: FE

genus *Pelthydrus* d'Orchymont, 1919: 150 type species *Pelthydrus sculpturatus* d'Orchymont, 1919

subgenus *Globipelthydrus* Schönmann, 1994: 193 type species *Pelthydrus jendeki* Schönmann, 1994

championi d'Orchymont, 1926b: 241 A: UP ORR

dudgeoni Schönmann, 1994: 213 A: GUA GUX HKG JIX

grossus Bian, Schönmann & Li, 2009: 59 A: YUN ORR

horaki Schönmann, 1994: 218 A: GUX HKG ORR

longifolius Bian, Schönmann & Li, 2009: 61 A: GUI HUN FUJ JIX

okinawanus Nakane, 1982: 102 A: JA

rosa Bian, Schönmann & Li, 2009: 62 A: HUN

subgrossus Bian, Schönmann & Li, 2009: 60 A: HUB

vietnamensis Schönmann, 1994: 214 A: YUN ORR

waltraudae Bian, Schönmann & Li, 2008: 267 A: HAI

subgenus *Pelthydrus* d'Orchymont, 1919: 150 type species *Pelthydrus sculpturatus* d'Orchymont, 1919

angulatus Bian, Schönmann & Li, 2008: 268 A: HAI

fenestratus Schönmann, 1995: 133 A: GUX HKG HUN JIX

inaspectus d'Orchymont, 1926b: 237 A: YUN

incognitus Schönmann, 1995: 139 A: HKG ORR

insularis Schönmann, 1995: 129 A: GUX HKG

japonicus Satô, 1960: 78 A: JA

jengi Schönmann, 1995: 140 A: TAI

minutus d'Orchymont, 1919: 153 A: GUX HKG HAI NP TAI UP ORR

nepalensis Schönmann, 1995: 133 A: NP XIZ YUN

sculpturatus d'Orchymont, 1919: 153 A: YUN ORR
speculifer Schönmann, 1995: 142 A: HKG
tongi Bian, Schönmann & Li, 2008: 271 A: HAI
vitalisi d'Orchymont, 1926b: 239 A: GUA HAI HKG TAI ORR
yulinensis Bian, Schönmann & Li, 2009: 63 A: GUI

tribe Hydrobiusini Mulsant, 1844

genus *Ametor* A.P. Semenov, 1900c: 614 type species *Ametor rudesculptus* A.P. Semenov, 1900
elongatus Ji & Schödl, 1998: 215 A: SCH
rudesculptus A.P. Semenov, 1900c: 617 A: BT HP KZ NP SCH SD TD XIZ YUN
oberthuri d'Orchymont, 1942e: 18
wittmeri Sató, 1977: 200
rugosus Knisch, 1924b: 32 (*Hydrocycclus*) A: BT HP NP SCH SD UP XIZ YUN
rufrena d'Orchymont, 1942e: 15 (*Hydrocassis*)
scabrosus Horn, 1873a: 133 (*Hydrobius*) A: FE JIL NAR
granulosus d'Orchymont, 1942e: 19
lucifer Shatrovskiy, 1989: 289 (*Hydrocassis*)
xizangensis Jia & Zhao, 2013: 128 A: XIZ

genus *Hydrobius* Leach, 1815: 96 type species *Dytiscus fuscipes* Linnaeus, 1758 (ICZN, 1990)

Limnohydrobius Reitter, 1909a: 357 type species *Hydrobius convexus* Brullé, 1835
arcticus Kuwert, 1890a: 34 E: FI NR NT SV A: ES TR
frigidus Poppius, 1909b: 30
convexus Brullé, 1835: 282 E: FR IT PT SP N: TU A: TR
grandis Motschulsky, 1859a: 128 (*Limnoxenus*)
fuscipes Linnaeus, 1758: 411 (*Dytiscus*) E: AB AU BE BH BU BY CR CT CZ DE EN FI FR GB GE GR HU IR IT LA
 LT LU NL NR NT PL PT RO SK SL SP ST SV SZ UK YU N: AG TU A: CY ES FE IN IQ IS KZ MG NMO SY TD
 TR UZ WS XIN NAR
aeneus Solier, 1834: 314
aestivus Rey, 1885b: 246
angustatus A. Villa & G.B. Villa, 1838: 63 (*Hydrophilus*)
aquaticus Linnaeus, 1760: 139 (*Scarabaeus*)
arcadius Brullé, 1832: 164
balearicus L.W. Schaufuss, 1882b: 528
brevior Kuwert, 1890a: 33
chalconotus Stephens, 1829c: 128
fuscipes O.F. Müller, 1776: 69 (*Hydrophilus*) [HN]
fuscipes Steven, 1808: 8 (*Hydrophilus*) [HN]
gyrinoides Schrank, 1781: 199 (*Dytiscus*)
insculptus LeConte, 1855: 372
levigatus Laporte, 1840b: 55

picircus Thomson, 1884b: cxxxi
regularis LeConte, 1855: 372
rottenbergii Gerhardt, 1872: 3
scarabaeoides Linnaeus, 1758: 413 (*Dytiscus*)
seriatus LeConte, 1855: 372
subrotundus Stephens, 1829c: 128
orientalis Jia & Short, 2009: 26 A: GUA
pauper Sharp, 1884b: 452 A: JA
pui Jia, 1995: 131 A: QIN
punctistriatus Jia, 1995: 133 A: HEI

genus *Hydrocassis* Fairmaire, 1878a: 88 type species *Hydrocassis scapulata* Fairmaire, 1878

Hydrocyclus Sharp, 1884b: 451 type species *Hydrocyclus lacustris* Sharp, 1884
anhuiensis Ji & Schödl, 1998: 212 A: ANH JIX
baoshanensis Schödl & Ji, 1995: 233 A: YUN
gansu Jia & Zhao, 2013: 131 A: GAN
hebaueri Schödl, 2000: 178 A: GUA ORR
imperialis Knisch, 1921b: 105 (*Hydrocyclus*) A: FUJ HUN JIX
jengi Satô, 1998: 82 A: JA
lacustris Sharp, 1884b: 451 (*Hydrocyclus*) A: JA
metasternalis Schödl & Ji, 1995: 231 A: YUN ORR
mongolica Liu, Ji & Jing, 2008: 175 A: NMO
pseudoscapha Ji & Schödl, 1998: 212 A: ANH
scapha d'Orchymont, 1942e: 13 A: FUJ GUA GUX HUN JIX SCH ORR
vietnamica Satô, 1995: 129
scaphoides d'Orchymont, 1942e: 14 A: YUN ORR
scapulata Fairmaire, 1878a: 89 A: GAN HEB SHA SHX SCH
schillhammeri Schödl & Ji, 1995: 234 A: YUN
sichuana Ji & Schödl, 1998: 214 A: SCH
taiwana Satô, 1971: 35 A: TAI
uncinata Ji & Schödl, 1998: 214 A: YUN ORR

genus *Hydrocassis*, **nomen dubium**

formosa Knisch, 1921b: 103 (*Hydrocyclus*) A: FUJ

genus *Limnoxenus* Motschulsky, 1853b: 10 type species *Hydrophilus oblongus* Herbst, 1797 (= *Hydrophilus*

niger Gmelin, 1790)

niger Gmelin, 1790: 1944 (*Hydrophilus*) E: AU BU BY CR CZ DE FR GB GE GR HU IR IT NL PL PT RO SK SP ST

YU "Caucasus" N: AG MO A: IN IS LE SY TR

oblongus Herbst, 1797: 300 (*Hydrophilus*) [HN]

olmoi Hernando & Fresneda, 1994: 81 E: PT SP

tribe Hydrophilini Latreille, 1802

genus *Brownephilus* Mouchamps, 1959: 300 type species *Neohydrophilus levantinus* Balfour-Browne, 1939
levantinus Balfour-Browne, 1939a: 34 (*Neohydrophilus*) A: JO
major İncekara, Mart, Polat & Karaca, 2009: 318 (*Hydrochara*) A: TR

genus *Hydrobiomorpha* Blackburn, 1888b: 814 type species *Hydrobiomorpha bovilli* Blackburn, 1888
Neohydrophilus d'Orchymont, 1911: 59 type species *Hydrophilus deplanatus* d'Orchymont, 1911
spinicollis nordica Mouchamps, 1959: 315 A: BT NP SD ORR
spinicollis spinicollis Eschscholtz, 1822: 41 (*Hydrophilus*) A: FUJ GUA GUX HKG JIX YUN "India" ORR
elongata Régimbart, 1902b: 471 (*Hydrophilus*)
wencki Paulino d'Oliveira, 1880: 156 (*Hydrophilus*) N: EG AFR
loanei Camerano, 1907: 4 (*Hydrophilus*)

genus *Hydrochara* Berthold, 1827: 355 type species *Dytiscus caraboides* Linnaeus, 1758
Hydraechus Stephens, 1839: 88 type species *Dytiscus caraboides* Linnaeus, 1758
Hydrochaeres Sharp, 1873b: 58 type species *Dytiscus caraboides* Linnaeus, 1758
Hydrocharis Hope, 1838: 125 type species *Dytiscus caraboides* Linnaeus, 1758
affinis Sharp, 1873b: 58 (*Hydrochaeres*) E: ST "Caucasus" A: ANH BEI ES FE FUJ GAN GUA GUI HEI HEN HUB
HUN JA JIL JIX KZ LIA MG NMO SC SCH SHG SHN SHX TD UZ XIN YUN ZHE
caraboides Linnaeus, 1758: 411 (*Dytiscus*) E: AL AU BE BH BU BY CR CT CZ DE EN FI FR GB GE GR HU IT LA
LT LU NL NR NT PL RO SK SL SP ST SV SZ UK YU A: ES TR WS
costata Lüderwaldt, 1897: 126 (*Hydrous*)
flaviventris G. Ochs, 1923: 46 (*Hydrophilus*)
intermedia Mulsant, 1844a: 133 (*Hydrous*)
nigricornis De Geer, 1774: 376 (*Hydrophilus*) [RN]
scrobiculata Panzer, 1799c: no. 11 (*Hydrophilus*)
smaragdina Bach, 1856: 246 (*Hydrophilus*) [HN]
subaenea Motschulsky, 1845a: 32 (*Hydrophilus*)
substriata Sturm, 1843: 330 (*Hydrophilus*)
dichroma Fairmaire, 1892b: 144 (*Hydrous*) E: BU GR HU ST TR UK A: CY IN IS KI SY TD TM TR UZ WS XIN
subvariolosa A.P. Semenov, 1900b: 585 (*Hydrophilus*)
flavipalpis Boheman, 1851: 595 (*Hydrophilus*) A: OM YE AFR
flavipes Steven, 1808: 3 (*Hydrophilus*) E: AB AU BU CR CZ FR GE GG GR HU IT LA MC PL RO SK SL SP ST UK
YU N: EG MO A: AF GAN IN IQ KU KZ TD TM TR UZ XIN
profanifuga A.P. Semenov, 1900b: 583 (*Hydrophilus*)
libera Sharp, 1884b: 450 (*Hydrocharis*) A: BEI FE HEI JA JIA LIA NC
semenovi Zaitzev, 1908a: 150 (*Hydrophilus*) E: GG UK (Krym)
similis d'Orchymont, 1919: 162 (*Hydrophilus*) A: "India"
vicina Bameul, 1996: 5 A: NC

genus *Hydrophilus* Geoffroy, 1762: 180 type species *Dytiscus piceus* Linnaeus, 1758

- subgenus** *Hydrophilus* Geoffroy, 1762: 180 type species *Dytiscus piceus* Linnaeus, 1758
- Hydrodema* Laporte, 1840b: 51 type species *Hydrophilus albipes* Laporte, 1840
- Hydrosoma* Laporte, 1840b: 50 type species *Hydrophilus latipalpus* Laporte, 1840
- Hydrous* Linnaeus, 1775: 7 [RN] type species *Dytiscus piceus* Linnaeus, 1758
- Pagipherus* Kuwert, 1893b: 82 type species *Hydrophilus triangularis* Say, 1823
- Stethoxus* Solier, 1834: 302 type species *Hydrophilus ater* Olivier, 1793 (= *Hydrophilus ensifer* Brullé, 1837)
- acuminatus* Motschulsky, 1854: 44 A: BEI FE GUA GUI GUX HEB HEN HKG JA JIX LIA NC NMO SC SCH SHG
TAI TIA XIZ YUN ZHE ORR
- cognatus* Sharp, 1873b: 57
- pallidipalpis* W.S. Macleay, 1825: 35 (*Hydrous*) [DA]
- sumatrae* Kuwert, 1893b: 85 (*Hydrous*)
- aterrimus* Eschscholtz, 1822: 128 E: AU BE BU BY CR CZ DE EN FI FR GE HU IT LA LT NL NT PL RO SK SV SZ
UK "Caucasus" A: IN TM TR WS
- africanus* Kuwert, 1893b: 86 (*Hydrous*)
- barbatus* Letzner, 1884: 301
- morio* Sturm, 1835: 109
- bilineatus bilineatus* W.S. Macleay, 1825: 36 (*Hydrous*) A: FUJ "India" AUR ORR
- brunnipalpis* Kuwert, 1893b: 90 (*Hydrous*)
- columbinus* Kuwert, 1893b: 90 (*Hydrous*)
- gayndahensis* W.J. Macleay, 1873: 129
- orientalis* Kuwert, 1893b: 91 (*Hydrous*)
- picicornis* Chevrolat, 1863: 204 (*Hydroporus*)
- resplendens* Kuwert, 1893b: 91 (*Hydrous*)
- ruficornis* Boisduval, 1835: 151 [HN]
- sabellifer* Fairmaire, 1879a: 80
- bilineatus caschmirensis* Kollar & L. Redtenbacher, 1844: 513 A: BT FUJ GUA GUX HAI HUB JA JIX KA SC SD
SCH TAI XIZ YUN "Manchuria" ORR
- birmanicus* Régimbart, 1902a: 202 (*Stethoxus*)
- japonicus* Sharp, 1873b: 57
- cavisternum* Bedel, 1891a: 310 (*Stethoxus*) A: GUA HAI HKG ORR
- dauricus* Mannerheim, 1852a: 297 A: ES FE GAN HEI JA LIA NMO SHN
- ganssuensis* A.P. Semenov, 1889: 194
- hastatus* Herbst, 1779: 317 (*Dytiscus*) A: GUA HAI HKG YUN ZHE "India" ORR
- aberrans* Kuwert, 1893b: 93 (*Hydrous*)
- indicus* Bedel, 1891a: 310 (*Stethoxus*) A: NP SD UP
- mesopotamiae* Kniž, 1914: (115) (*Hydrous*) A: IQ
- olivaceus* Fabricius, 1781a: 289 A: NP SHG ORR
- oblongus* Olivier, 1793: 125
- piceus* Linnaeus, 1758: 411 (*Dytiscus*) E: AB AR AU AZ BE BH BU BY CR CZ DE FI FR GB GE GG GR HU IT LA
LT LU MC MD ME NL NR PL RO SK SL SP ST SV SZ UK YU N: AG EG A: FE IS KA KZ LE SY TD TR WS XIN
- angustior* Rey, 1885b: 227

- niger* G. Eichler, 1876: 168 [HN]
plicifer Bedel, 1891a: 313 (*Stethoxus*)
ruficornis De Geer, 1774: 371 [RN]
turkestanus Kuwert, 1893b: 85 (*Hydrous*)
viridicollis Kollar & L. Redtenbacher, 1844: 513
pistaceus Laporte, 1840b: 50 E: FR IT PT SP N: AG MO TU
inermis Lucas, 1846: 244
inermis Küster, 1852: no.56 [HN]
rufocinctus Bedel, 1891a: 309 (*Stethoxus*) A: SD UP
senegalensis Percheron, 1835: (no.4) 3 (*Hydrous*) N: AG EG A: PA SA UP YE AFR ORR
caffer Boheman, 1851: 594
convexus Laporte, 1840b: 50
paulinierii Guérin-Méneville, 1842: 73
piesbergeni Reitter, 1906c: 40 (*Hydrous*)
sternitalis Reitter, 1906c: 41 (*Hydrous*) A: HUN XIN
subgenus *Temnopterus* Solier, 1834: 302 type species *Temnopterus aculeatus* Solier, 1834
aculeatus Solier, 1834: 308 (*Temnopterus*) N: EG A: IN IS OM SA SY TR YE AFR
aegyptiacus Peyron, 1856a: 723
armatus Laporte, 1840b: 51
lugubris Motschulsky, 1845a: 31
spinipennis Gory, 1834: pl. 20 [fig. 14]

genus *Hydrophilus*, **nomina dubia** (possibly not Hydrophiloidea)

- ater* Gmelin, 1790: 1944 [DA] E: "Europa"
atricapillus Duftschmid, 1805: 243 [DA] E: AU
rufus Scopoli, 1763: 98 (*Dytiscus*) [DA] E: AU
tricolor Herbst, 1784: 122 [DA] E: GE

genus *Sternolophus* Solier, 1834: 302 type species *Sternolophus rufipes* Solier, 1834 (= *Sternolophus solieri* Laporte, 1840)

subgenus *Neosternolophus* Zaitzev, 1909: 229 type species *Hydrobius artensis* Montrouzier, 1860 (= *Hydrobius marginicollis* Hope, 1841)

- inconspicuus* Nietner, 1856: 15 (*Hydrous*) A: FUJ GUA GUX HKG JA MAC NP SD TAI YUN ORR
brachyacanthus Régimbart, 1902b: 472

subgenus *Sternolophus* Solier, 1834: 302 type species *Sternolophus rufipes* Solier, 1834 (= *Sternolophus solieri* Laporte, 1840)

- Helobius* Mulsant, 1851: 75 type species *Helobius noticollis* Mulsant, 1851 (= *Sternolophus solieri* Laporte, 1840)
decens Zaitzev, 1909: 231 A: IN OM SA YE ORR

rufipes Fabricius, 1792a: 183 (*Hydrophilus*) A: BEI FUJ GUA GUI GUX HAI HUB HUN JA JIA JIX KA NP SC SCH
 SD SHA SHX TAI XIZ YUN ZHE ORR

- fulvipes* Motschulsky, 1854: 45

- mergus* Kollar & L. Redtenbacher, 1844: 514 (*Tropisternus*) [HN]
solieri Laporte, 1840b: 54 [RN] E: GR ITi N: AG EG A: IS SA YE AFR
graecus Baudi di Selve, 1864: 221 (*Hydrous*)
noticollis Mulsant, 1851: 75 (*Helobius*)
punctulatus L.W. Schaufuss, 1883b: cxc
rufipes Solier, 1834: 311 [HN]
unicolor Laporte, 1840: 54 A: YE (Suqutra) AFR
elongatus Schaufuss, 1883: cxc
frater Schaufuss, 1883: cxc
- subfamily **Chaetarthriinae** Bedel, 1881
 tribe **Anacaenini** M. Hansen, 1991
- genus *Anacaena* Thomson, 1859: 18** type species *Hydrophilus globulus* Paykull, 1798
Creniphilus Motschulsky, 1845a: 549 [suppressed]
Enigmata M. Hansen, 1999b: 129 type species *Enigmata brunnea* M. Hansen, 1999
Grodum M. Hansen, 1999b: 124 type species *Grodum striatum* Hansen, 1999
Hebauerina Gentili, 2002: 141 type species *Hebauerina nanica* Gentili, 2002
Laccobiellus Abeille de Perrin, 1901: 60 type species *Hydrophilus globulus* Paykull, 1798
Metacymus Sharp, 1882: 65 type species *Metacymus parvulus* Sharp, 1882
Omnioops Perkins & Short, 2004: 2 type species *Omnioops fasciatus* Perkins & Short, 2004 (= *Anacaena praetexta* (Gentili, 1996)
Paranacaena Blackburn, 1888b: 820 type species *Paracymus lindi* Blackburn, 1888
asahinai Satô, 1982: 385 A: FE JA
atriflava Jia, 1997a: 108 A: ANH FUJ GUA GUI JIX ZHE
bipustulata Marsham, 1802: 406 (*Hydrophilus*) E: BE BU CR CZ FR GB GE IT LU NL PL PT RO SK SP SZ UK N:
 AG MO TU
kiesenwetteri Reitter, 1872: 178 (*Laccobius*)
similis Laporte, 1840b: 57 (*Brachypalpus*)
brachypenis Komarek, 2012: 248 A: YUN
bulbifera Pu, 1964: 400 (397) A: GUA GUI HUN
bushiki Pu, 1963: 82 (79) A: HUN YUN
conglobata Wollaston, 1854: 97 (*Hydrobius*) N: MR
gaoligongshana Komarek, 2012: 251 A: YUN
gaetanae Bameul, 2001: 226 E: FR (Corse)
gerula d'Orchymont, 1942e: 54 A: GUI YUN
globulus Paykull, 1798: 188 (*Hydrophilus*) E: AL AN AU BE BY CZ DE EN FA FI FR GB GE IR IT LA LU ME NL
 NR PL PT SK SP SV SZ UK N: AG MO TU A: TR
allabroix Laporte, 1840b: 58 (*Coelostoma*) [DA]
elliptica Sainte-Claire Deville, 1914: 532
glabricollis L.W. Schaufuss, 1869: 11 (*Hydrobius*)
nitidior Kuwert, 1890a: 69
haemorrhoea Wollaston, 1864: 92 (*Hydrobius*) N: CI

- hainanensis* Jia, 1997a: 109 A: HAI
- jaegeri* Komarek, 2006: 289 A: NP
- jengi* Komarek, 2011: 230 A: TAI
- jiafenglongi* Komarek, 2012: 255 A: YUN
- laevis* d'Orchymont, 1936d: 257 A: NP UP
- laevoides* Komarek, 2006: 294 A: UP
- lancifera* Pu, 1963: 81 (78) A: ANH FUJ GUA HUN JIX SCH YUN
- lanzhuji* Komarek, 2012: 258 A: HAI
- limbata* Fabricius, 1792a: 82 (*Sphaeridium*) E: AL AR AU BE BH BU BY CR CT CZ DE FI FR GB GE GR HU IR IT
LA LU ME NL NT PL PT RO SK SP ST SV SZ UK YU N: AG A: FE IS KZ SY TR WS NARI
- carinata* Thomson, 1870a: 126
- foveolata* Haworth, 1807: 86 (*Hydrophilus*)
- ochracea* Stephens, 1829c: 134 (*Hydrobius*) [DA]
- lohsei* Berge Henegouwen & Hebauer, 1989: 273 E: AU IT SZ
- lushanensis* Pu, 1964: 400 (398) A: JIX
- lutescens* Stephens, 1829c: 134 (*Hydrobius*) E: AR AU BE BH BY CR CT CZ DE EN FI FR GB GE GG GR IT
LA LT LU MA MC MD NL NR NT PL PT RO RU SP ST SV SZ UK YU N: AG EG MO TU A: FE KZ TR UZ WS
XIN NAR
- ambigua* Rey, 1885a: 13 (*Brachypalpus*)
- castanea* LeConte, 1878b: 597 (*Hydrobius*) [DA]
- feminalis* LeConte, 1878b: 597 (*Hydrobius*) [DA]
- immatura* Abeille de Perrin, 1901: 59
- infuscata* Motschulsky, 1859a: 177 (*Brachypalpus*) [DA]
- marshami* Stephens, 1839: 92 (*Laccobius*) [RN]
- nitida* Heer, 1841: 485 (*Hydrobius*)
- ovata* Reiche, 1861: 203 (*Hydrobius*) [DA]
- praecox* Dufour, 1843: 58 (*Hydrobius*) [DA]
- sordens* Stephens, 1829c: 134 (*Hydrobius*)
- variabilis* Sharp, 1870b: 255
- maculata* Pu, 1964: 400 (399) A: FUJ GUA GUI GUX HUN JIX YUN
- pseudoyunnanensis* Jia, 1997a: 110
- marchantiae* Wollaston, 1857: 31 (*Hydrobius*) N: MR
- pui* Komarek, 2012: 261 A: GUI HUB JIX SICH YUN
- rufipes* Guillebeau, 1896b: 226 (*Paracymus*) E: BH GR IT YU TR A: IS LE SY TR
- jordanensis* Burmeister, 1985: 44
- schoenmanni* Komarek, 2012: 263 A: YUN
- sichuana* Komarek, 2012: 264 A: SCH
- smetanai* Komarek, 2011: 232 A: TAI
- taurica* Ryndevich, 2000: 123 E: AR GG ST UK (Krym) A: KZ
- wangi* Komarek, 2012: 266 A: GUX HUB SCH
- yunnanensis* d'Orchymont, 1942e: 49 A: GUX HUN YUN
- hunanensis* Pu, 1964: 400 (397)

- genus *Crenitis* Bedel, 1881: 306 type species *Hydrobius punctatostratus* Letzner, 1840
 subgenus *Acrenitis* Matsui & Nakane, 1985: 91 type species *Crenitis osawai* Nakane, 1966
formosana Hebauer, 1994: 20 A: TAI
nakanei Hebauer, 1994: 24 A: JA
neglecta Matsui & Nakane, 1985: 90 A: JA
osawai Nakane, 1966: 55 A: JA TAI
primorica Hebauer, 1994: 27 A: FE LIA
satoi Hebauer, 1994: 29 A: JA TAI
tokarana Nakane, 1966: 56 A: JA
 subgenus *Crenitis* Bedel, 1881: 306 type species *Hydrobius punctatostratus*
 Letzner, 1840
Aparacymus Matsui & Nakane, 1985: 91 type species *Anacaena japonica* Nakane, 1963
Creniphilus Horn, 1890a: 267 type species *Hydrobius rufiventris* Horn, 1873
Noxonus d'Orchymont, 1925a: 164 type species *Crenitis zimmermanni* Knisch, 1924
apicalis Reitter, 1896d: 285 (*Paracymus*) A: ES FE HEI JA JIL LIA NMO SCH
protuberans Jia, 1996: 96
convexa Ji & Komarek, 2003: 402 A: NO SHX SW
cordula Hebauer, 1994: 18 A: NP YUN
hokkaidensis Nakane, 1966: 57 (*Anacaena*) A: JA
japonica Nakane, 1963c: 65 (*Anacaena*) A: JA
kanyukovae Shatrovskiy, 1989: 289 A: FE
nepalensis Hebauer, 1994: 25 A: NP
orientalis Satô, 1979: 54 A: BT NP SD
punctatostrata Letzner, 1840: 81 (*Hydrobius*) E: AU BE CZ GE PL SK SZ
rufula Hebauer, 1994: 29 A: NP
shaanxiensis Ji & Komarek, 2003: 408 A: NO

tribe Chaetarthriini Bedel, 1881

- genus *Chaetarthria* Stephens, 1835: 401 type species *Hydrophilus seminulum* Herbst, 1797
Cyllidium Erichson, 1837: 211 type species *Hydrophilus seminulum* Herbst, 1797
almorana Knisch, 1924b: 39 A: UP ORR
indica d'Orchymont, 1920: 19 A: GUX HKG NP SD ORR
saundersi d'Orchymont, 1923b: 420 A: NP ORR
seminulum Herbst, 1797: 314 (*Hydrophilus*) E: AU BH BY CR CT CZ DE EN FI FR GB GE GR HU IR IT LA LT LU
 MC NL NR NT PL PT SK SL SP SV SZ UK YU "Caucasus" N: TU A: IN TR "Siberia"
carbonaria Sturm, 1807: 61 (*Agathidium*) [DA]
picea Hochhuth, 1871: 246
seminulum Paykull, 1798: 190 (*Hydrophilus*) [HN]
sithonica Hebauer, 1993: 1
simillima Vorst & Cuppen, 2003: 164 E: AU BE CZ FR GB GE IR NL SP
similis Wollaston, 1864: 93 E: FR GE IT SP SZ N: CI EG MO A: IS

genus *Hemisphaera* Pandellé, 1876: 57 type species *Hemisphaera infima* Pandellé, 1876 (= *Hydrobius seriato-punctatus* Perris, 1874)

guignoti Schaefer, 1975: 130 E: FR SP

miltiadis J. Sahlberg, 1908: 23 E: GR

orientalis Jia, Fikáček & Song, 2013 A: GUX

seriatopunctata Perris, 1874: 2 (*Hydrobius*) E: FR IT SP

infima Pandellé, 1876: 58

socotrana Fikáček, Delgado & Gentili, 2012: 119 A: YE (Suqutra)

genus *Thysanarthria* d'Orchymont, 1926b: 242 type species *Hydrobius atriceps* Régimbart, 1903

Chaetarthriomorphus Chiesa, 1967: 276 type species *Chaetarthriomorphus sulcatus* Chiesa, 1967

brittoni Balfour-Browne, 1951: 215 A: YE

championi Knisch, 1924b: 40 (*Chaetarthria*) A: UP

madurensis Hebauer, 2001: 298 A: NP ORR

sulcata Chiesa, 1967: 276 (*Chaetarthriomorphus*) A: AF OM

subfamily *Enochrinae* Short & Fikáček, 2013

genus *Cymbiodyta* Bedel, 1881: 307 type species *Hydrophilus marginellus* Fabricius, 1792

Cymbula Pandellé, 1876: 58 [HN] type species *Philhydrus ovalis* Thomson, 1853 (= *Hydrophilus marginellus* Fabricius, 1792)

Hydrocombustus Sharp, 1882: 70 type species *Hydrocombustus brevicollis* Sharp, 1882

marginella Fabricius, 1792a: 185 (*Hydrophilus*) E: AB AR AU BU BY CR CZ DE EN FI FR GB GE GR HU IR IT LA

LT LU ME NL NR NT PL PT RO SK SP ST SV SZ UK A: ES KZ NP TR UZ WS

carbonarius Kuwert, 1892d: 364 (*Philhydrus*)

marginatus Duftschmid, 1805: 241 (*Hydrophilus*)

marginipallens Marsham, 1802: 408 (*Hydrophilus*)

ovalis Thomson, 1853: 52 (*Philhydrus*)

testacea Speiser, 1893: 13

orientalis Jia & Short, 2011a: 348 A: GUA JIX

genus *Enochrus* Thomson, 1859: 18 type species *Hydrophilus bicolor* sensu Gyllenhal, 1808 (= *Hydrophilus melanocephalus* Olivier, 1793)

subgenus *Enochrus* Thomson, 1859: 18 type species *Hydrophilus bicolor* sensu Gyllenhal, 1808 (= *Hydrophilus melanocephalus* Olivier, 1793)

melanocephalus Olivier, 1793: 127 (*Hydrophilus*) E: AR AU BH BU BY CR CT CZ DE EN FI FR GB GE HU IR IT

LA LT LU NL NR NT PL PT SK SP SV SZ UK YU N: AG A: AF ES FE IS KZ NMO TR

atricapillus Stephens, 1829c: 131 (*Hydrobius*)

italus Kuwert, 1890a: 62

subgenus *Holcophilydrus* Kniž, 1912: (168) type species *Holcophilydrus ussuriensis* Kniž, 1912

hybridus Hebauer, 2005: 53 A: HUB

laoticus Hebauer, 2005: 52 A: YUN ORR

parumstriatus Hebauer, 2005: 52 A: TAI

- simulans* Sharp, 1873b: 59 (*Philhydrus*) A: FE JA SC TAI BEI HEB HEI HUB JIL LIA NMO SCH SHA SHG SHX
TIA "Manchuria"
- crenatostriatatus* H. Kolbe, 1886: 179 (*Philhydrus*)
- kishidai* Kamiya, 1935: 4
- umbratus* Sharp, 1884b: 454 (*Philhydrus*)
- ussuriensis* Kniž, 1912: (168)
- subgenus *Hydatotrephis* W.S. Macleay, 1873: 129 type species *Hydatotrephis mastersi* W.S. Macleay, 1873
- liangi* Jia & Zhao, 2007: 252 A: GUI JIX SCH
- subgenus *Lumetus* Zaitzev, 1908b: 385 [RN] type species *Hydrophilus melanocephalus* sensu Fabricius, 1801 (= *Philhydrus fuscipennis* Thomson, 1884)
- Philhydrus* Solier, 1834: 302 [HN] type species *Hydrophilus melanocephalus* sensu Fabricius, 1801 (= *Philhydrus fuscipennis* Thomson, 1884)
- Pseudenochnrus* Łomnicki, 1911: 266 type species *Hydrobius frontalis* Erichson, 1837 (= *Hydrophilus ochropterus* Marsham, 1802)
- asiaticus* Kuwert, 1893a: 17 (*Philhydrus*) A: IN KZ TM GAN SHX
- ater* Kuwert, 1888e: 289 (279) (*Philhydrus*) E: AU BH CR FR GR IT RO SP YU N: AG EG A: CY IN IQ IS JO KU KZ
LE OM SA SY TD TM TR UZ XIN
- bicolor* Fabricius, 1792a: 184 (*Hydrophilus*) E: AB AR AU BH BU BY CR CT CZ DE EN FI FR GB GE GR HU IR IT
LA LT MA ME NL NR NT PL PT RO SK SL SP ST SV UK N: AG CI EG MO TU A: ES FE JA KZ MG NMO NP
TD TM TR UZ WS XIN
- atricornis* Kuwert, 1888e: 286 (276) (*Philhydrus*)
- chrysolinus* Fabricius, 1787: 192 (*Dytiscus*) [HN]
- ferrugineus* Küster, 1849b: no.10 (*Hydrobius*) [HN]
- flavus* Kuwert, 1890a: 43 (*Philhydrus*)
- fulvus* Marsham, 1802: 408 (*Hydrophilus*) [HN]
- grisescens* Gyllenhal, 1827: 276 (*Hydrophilus*)
- labiatus* Rey, 1885b: 258 (*Philhydrus*) [DA]
- levanderi* J. Sahlberg, 1892: 225 (*Philhydrus*) [RN]
- maritimus* Thomson, 1853: 51 (*Philhydrus*)
- mediterraneus* J. Sahlberg, 1900b: 185 (*Philhydrus*)
- rubicundus* Kuwert, 1888e: 275 (*Philhydrus*)
- sahlbergi* Kuwert, 1888e: 286 (276) (*Philhydrus*) [HN]
- sternospina* Kuwert, 1888e: 288 (277) (*Philhydrus*)
- torquatus* Marsham, 1802: 405 (*Hydrophilus*) [DA]
- unguidebilis* Kuwert, 1888e: 287 (276) (*Philhydrus*)
- yukinoae* Matsui, 1994: 218
- blazquezae* Arribas & Millán, 2013: 192 N: MO
- calabricus* Ferro, 1986c: 433 (*Philhydrus*) E: IT
- concii* Chiesa, 1965: 55 E: IT
- convexius* Satô, 1977: 198 [DA] A: BT NP

- falcarius* Hebauer, 1991a: 84 E: IT (Sicilia)
- ferrugineus* Motschulsky, 1849: 79 (*Philhydrus*) [DA] A: ES
- fuscipennis* Thomson, 1884a: 1031 (*Philydrus*) E: AB AR AU BH BU CT CZ DE FI GB GE HU IR IT LA LU NR NT
PL PT SL SP ST SV UK N: TU A: ES HEI IN KI KZ NMO TR WS XIN
- berolinensis* Kuwert, 1888e: 278 (*Philydrus*)
- caspius* Kuwert, 1888e: 282 (275) (*Philydrus*)
- fasciatus* Kuwert, 1888e: 278 (*Philydrus*)
- sahlbergi* Fauvel, 1887: 86 (*Philydrus*) [RN]
- similis* Kuwert, 1888e: 278 (*Philydrus*)
- halophilus* Bedel, 1878b: clxix (*Philydrus*) E: DE FR GB GE IR IT NL SP ST SV UK A: CY TR
- brevipalpis* Sharp, 1914a: 83 (*Philydrus*) [DA]
- salinus* Kuwert, 1888e: 279 (*Philydrus*)
- hamifer* Ganglbauer, 1901a: 332 (*Philydrus*) E: AU CZ GE HU ST UK YU A: IS KI KZ TM UZ
- caspius* d'Orchymont, 1933a: 308
- hispanicus* Kuwert, 1888e: 281 (275) (*Philydrus*) E: PT SP
- jesusarribasi* Arribas & Millán, 2013: 191 E: SP
- ochropterus* Marsham, 1802: 409 (*Hydrophilus*) E: AU BU BY CR CT CZ DE EN FI FR GB GE HU IR IT LA LT NL
NR NT PL PT RO SK SP SV SZ A: ES TR WS
- frontalis* Erichson, 1837: 210 (*Hydrobius*)
- nigricans* Zetterstedt, 1838: 123 (*Hydrophilus*)
- politus* Küster, 1849b: no.9 (*Hydrobius*) E: CR IT PT SP N: AG CI EG MO MR TU A: AF CY IS LE OM SY TR
- agrigeninus* Rottenberg, 1870: 22 (*Philydrus*)
- atlanticus* C.É. Blanchard, 1853: 51 (*Philydrus*)
- cosyrensis* Rey, 1885b: 260 (*Philydrus*)
- sahariensis* Fairmaire, 1879b: 160 (*Philydrus*)
- quadrinotatus* Guillebeau, 1896b: 226 (*Philydrus*) A: "Syria"
- quadripunctatus* Herbst, 1797: 305 (*Hydrophilus*) E: AL AU AZ BH BU BY CR CT CZ DE EN FI FR GB GE GG GR
HU IT LA LT LU ME NL NR NT PL SK SL SP SV UK A: ES FE HEI IN IS KI KZ NMO TD TR XIN WS
- dichrous* Krynicky, 1832: 116 (*Hydrophilus*) [DA]
- frontalis* Dalla Torre, 1877: 68 (*Philydrus*) [HN]
- fulvipennis* Rey, 1885b: 262 (*Philydrus*) [HN]
- marginatus* Gozis, 1916: 42 (*Philydrus*)
- rectus* J. Sahlberg, 1875: 216 (*Philydrus*)
- ytensis* Sharp, 1915f: 323 (*Philydrus*)
- risii* Arribas & Millán, 2013: 193 N: MO TU
- salomonis* J. Sahlberg, 1900b: 187 (*Philydrus*) E: SP A: AF IN IS JO TR
- segmentinotatus* Kuwert, 1888e: 284 (276) (*Philydrus*) E: AL BU CR FR GR IT ME PT RO SL SP ST YU N: AG EG
LB TU A: CY ES FE IN IQ IS JO KU KZ MG SA TD TM TR UZ AFR
- apicinotus* Kuwert, 1888e: 285 (276) (*Philydrus*)
- maculiapex* Kuwert, 1888e: 284 (276) (*Philydrus*)

- transcaspicus* J. Sahlberg, 1900b: 185 (*Philhydrus*)
vultur Kuwert, 1888e: 283 (276) (*Philhydrus*)
sinuatus d'Orchymont, 1937c: 38 A: IN KU PA
subsignatus Harold, 1877: 342 (*Philhydrus*) A: BEI CHQ HUB HUN FUJ GUA JA JIA SHA SHG SC TAI
testaceus Fabricius, 1801a: 252 (*Hydrophilus*) E: AB AR AU BU BY CR CT CZ DE EN FI FR GB GE GR HU IR IT
 LA LT LU NL NR NT PL RO SK SP ST SV SZ UK YU N: TU A: ES FE JA KZ TR WS XIN
lederi Kuwert, 1888e: 289 (277) (*Philhydrus*) [DA]
lineatus Kuwert, 1888e: 275 (*Philhydrus*)
maculicollis Dalla Torre, 1877: 68 (*Philhydrus*)
turanicus Schödl, 1998: 123 A: IN TM
 subgenus *Methydrus* Rey, 1885b: 253 type species *Hydrophilus affinis* Thunberg, 1794
Agraphilydrus Kuwert, 1888e: 280 type species *Hydrophilus affinis* Thunberg, 1794
Gemelus García, 2000: 223 type species *Gemelus pallidus* García, 2000
affinis Thunberg, 1794b: 73 (*Hydrophilus*) E: AR AU BE BH BU BY CR CT CZ DE EN FI FR GB GE IR IT LA LT
 NL NR NT PL SK ST SV SZ UK A: ES FE HEI JA NMO KZ WS
vilis Sharp, 1884b: 453 (*Philhydrus*)
amurensis Hebauer, 1995b: 32 A: FE
circumductus Régimbart, 1905: 213 (*Philhydrus*) A: YE AFR
coarctatus Gredler, 1863a: 75 (*Philhydrus*) E: AU BE BH BU BY CR CZ DE EN FI FR GB GE GR HU IR IT LA LT
 NL NR NT PL SK SV SZ A: FE TR WS
fulvipennis Westhoff, 1881: 57 (*Philhydrus*)
suturalis Sharp, 1872: 153 (*Philhydrus*)
crassus Régimbart, 1903b: 55 (*Philhydrus*) A: JIX ORR
esuriens Walker, 1858: 209 (*Philhydrus*) A: BT CHQ FUJ GUA GUX HAI HUB HUN IQ JA JIA JIX NP PA SA SC
 SCH YUN "India" AUR ORR
nigriceps Motschulsky, 1860a: 46 (*Pylophilus*)
nigriceps L. Redtenbacher, 1868: 26 (*Philhydrus*) [HN]
ornaticeps Sharp, 1884b: 454 (*Philhydrus*)
pullus Fauvel, 1883b: 354 (*Philhydrus*)
flavicans Régimbart, 1903b: 56 (*Philhydrus*) A: FUJ GUA HUB HUN JIA TAI YUN ORR
fragilis Sharp, 1890: 350 (*Philhydrus*) A: CHQ YUN ORR
fretus d'Orchymont, 1932c: 703 A: YUN ORR
haroldi Sharp, 1884b: 452 (*Philhydrus*) A: JA ORR
hesperidum Sharp, 1870a: 16 (*Philhydrus*) E: AB A: IS SA YE AFR
nitidulus Kuwert, 1888e: 290 (280) (*Philhydrus*)
reductus Régimbart, 1905: 215 (*Philhydrus*)
icterus Knisch, 1924b: 38 A: UP ORR
iteratus Sharp, 1890: 349 (*Philhydrus*) A: FE ORR
japonicus Sharp, 1873b: 59 (*Philhydrus*) A: FE GUA HEI JA JIA JIX ZHE ORR
latus Kuwert, 1888e: 291 (280) (*Philhydrus*) N: EG A: IN SA

- mesopotamiae* Kuwert, 1890a: 60 (*Philydrus*) A: IN IQ IS
morenae L. Heyden, 1870: 67 (*Hydrobius*) E: FR PT SP
natalensis Gemminger & Harold, 1868: 480 (*Hydrobius*) [RN] E: IT PT SP N: EG A: SY "India" AFR AUR ORR
assimilis Boheman, 1851: 600 (*Hydrobius*) [HN]
pumilio Sharp, 1904: 8 (*Philydrus*)
nigropiceus Motschulsky, 1861: 109 (*Philhydrus*) A: NP ORR
cheesmanae Balfour-Browne, 1939b: 475
rubrocinctus Régimbart, 1903b: 56
nigritus Sharp, 1873c: 262 (*Philhydrus*) E: AB AL AR BE BU CR FR GB GR IT LU MC ME NL PT RO SP ST TR UK
YU N: MO TU A: IN KZ TR
isotae Hebauer, 1981: 137
nitiduloides Kuwert, 1888e: 291 (280) (*Philydrus*) N: EG
pseudesuriens Jia & Wang, 2010: 377 A: HAI
puetzi Hebauer, 1995b: 32 A: FE
ragusae Kuwert, 1888a: 38 (*Philydrus*) E: IT
satomii Nakane & Matsui, 1986a: 78 A: JA
sauteri d'Orchymont, 1913: 6 A: TAI
schawalleri Hebauer, 1991b: 178 A: TD XIN
tetraspilus Régimbart, 1903c: 335 (*Philhydrus*) A: BT NP TR YE AFR ORR
uniformis Sharp, 1884b: 453 (*Philydrus*) A: FE JA SC
genus *Enochrus*, species *incertae sedis*
algarum Jia & Short, 2013: 610 A: FUJ
- genus *Notionotus* Spangler, 1972: 139 type species *Notionotus rosalesi* Spangler, 1972
attenuatus Jia & Short, 2011b: 55 A: GUA
fenestratus Hebauer, 2001: 10 A: YUN
notaticollis Hebauer, 2001: 11 A: HAI YUN
siklisi Hebauer, 2001: 12 A: NP

subfamily **Acidocerinae** Zaitzev, 1908

- genus *Agraphydrus* Régimbart, 1903a: 33 type species *Agraphydrus punctatellus* Régimbart, 1903
subgenus *Agraphydrus* Régimbart, 1903a: 33 type species *Agraphydrus punctatellus* Régimbart, 1903
Pseudohelochares Satô, 1960: 76 type species *Pseudohelochares narusei* Satô, 1960
Pseudopelthydrus Jia, 1998: 225 type species *Pseudopelthydrus longipalpus* Jia, 1998
ishiharai Matsui, 1994: 215 (*Enochrus*) A: JA
kempi d'Orchymont, 1922: 626 (*Helochares*) A: AP NP UP
longipalpus Jia, 1998: 229 (*Pseudopelthydrus*) A: HAI
minutissimus Kuwert, 1890a: 37 (*Helochares*) A: OM SA SY YE
narusei Satô, 1960: 77 (*Pseudohelochares*) A: JA
orientalis d'Orchymont, 1932c: 690 (*Helochares*) A: TAI YUN ORR
pauculus Knisch, 1924b: 36 (*Helochares*) A: NP UP

pygmaeus Knisch, 1924b: 38 (*Helochares*) A: UP

ryukyuensis Matsui, 1994: 217 (*Enochrus*) A: TAI JA

stagnalis d'Orchymont, 1937c: 37 (*Helochares*) A: NP PA UP

subgenus *Gymnelochares* d'Orchymont, 1932c: 692 type species *Helochares geminus* d'Orchymont, 1932

indicus d'Orchymont, 1932c: 694 A: NP UP

genus *Chasmogenus* Sharp, 1882: 73 type species *Chasmogenus fragilis* Sharp, 1882

Crepelochares Kuwert, 1890a: 38 type species *Helochares livornicus* Kuwert, 1890

abnormalis Sharp, 1890: 351 (*Philhydrus*) A: JA TAI ORR

ferrugatus Régimbart, 1903b: 57 (*Phylhydrus*)

nigritulus Régimbart, 1903b: 57 (*Phylhydrus*) [HN]

regimbarti Knisch, 1924a: 195 [RN]

livornicus Kuwert, 1890a: 38 (*Helochares*) E: BH CR GR IT SP YU A: IS TR TU

orbis N. Watanabe, 1987: 12 (*Helochares*) A: JA

genus *Helochares* Mulsant, 1844a: 197 [RN] type species *Dytiscus lividus* Forster, 1771

subgenus *Helochares* Mulsant, 1844a: 197 [RN] type species *Dytiscus lividus* Forster, 1771

Enhydrus W.S. Macleay, 1825: 35 [suppressed]

Neohydrobius Blackburn, 1898: 221 type species *Phylhydrus burruendiensis* Blackburn, 1890 (= *Stagnicola foveicollis* Montrouzier, 1860)

Peloxenus Motschulsky, 1845a: 549 [RN] type species *Hydrophilus griseus* Fabricius, 1787 (= *Dytiscus lividus* Forster, 1771)

Pylophilus Motschulsky, 1845a: 32 type species *Hydrophilus griseus* Fabricius, 1787 (= *Dytiscus lividus* Forster, 1771)

Stagnicola Montrouzier, 1860: 246 [HN] type species *Stagnicola foveicollis* Montrouzier, 1860

atropiceus Régimbart, 1903b: 53 A: GUA GUX HKG JA JIX NP ORR

ohkurai Satô, 1976: 21

dilutus Erichson, 1843: 228 (*Hydrobius*) A: YE (Suqutra) AFR

niloticus Sharp, 1904: 7

lividoides M. Hansen & Hebauer, 1988: 27 A: IS TR

lividus Forster, 1771: 52 (*Dytiscus*) E: AU BH BU BY CR CZ FR GB GE GR HU IT LU MC NL PL PT SL SP SZ UK

YU N: AG CI MO TU A: SY TR

fulvus Geoffroy, 1785: 65 (*Hydrophilus*)

chrysolinus Herbst, 1797: 313 (*Hydrophilus*) [HN] [DA]

griseus Fabricius, 1787: 189 (*Hydrophilus*)

lividus Herbst, 1797: 316 (*Hydrophilus*) [HN]

ludovici L.W. Schaufuss, 1869: 11

pallidetaceus Stierlin, 1900: 219

pallidus P. Rossi, 1792: 66 (*Hydrophilus*)

longipalpis Murray, 1859: 123 (*Phylhydrus*) N: EG A: IS AFR

filipalpis Sharp, 1904: 6

nigritulus Kuwert, 1889: 8 E: IT

obliquus Mart, İncekara & Karaca, 2010: 299 A: TR

- obscurus* O.F. Müller, 1776: 69 (*Hydrophilus*) E: AB AU BY CR CT CZ DE EN FI FR GB GE GG GR HU IT LA LT
LU ME NL NR NT PL SK ST SV SZ UK A: IN IS KZ TR WS XIN
erythrocephalus Fabricius, 1792a: 185 (*Hydrophilus*)
subcompressus Rey, 1885a: 14
substriatus J. Sahlberg, 1903b: 20
variegatus Herbst, 1797: 304 (*Hydrophilus*)
- pallens* W.S. Macleay, 1825: 35 (*Enhydrus*) N: EG A: FUJ GUA GUI GUX HAI HUB HUN IS JA JIX LE NP SA SCH
SHA TR YE YUN "India" AFR AUR ORR
dispar Sharp, 1904: 7
laeviusculus Régimbart, 1906: 261
lewisius Sharp, 1873b: 60
parvulus Reiche & Saulcy, 1856: 359
parvulus Guillebeau, 1896b: 226 (*Philhydrus*) [HN] [DA]
- punctatus* Sharp, 1869: 241 E: BY CT DE FR GB GE HU IR LT LU NL PT SP ST UK A: TR
subgenus *Helocharimorphus* Kuwert, 1890a: 62 (and 1890b: 306) type species *Helocharimorphus sharpi*
Kuwert, 1890
sharpi Kuwert, 1890a: 63 (*Helocharimorphus*) N: EG A: IS AFR
subgenus *Hydrobaticus* W.J. Macleay, 1873: 131 type species *Hydrobaticus tristis* W.J. Macleay, 1873
Graphelochares Kuwert, 1890a: 38 type species *Helophilus melanophthalmus* Mulsant, 1844
anchoralis Sharp, 1890: 352 A: FUJ GUA HAI HUB JA NP TAI YUN "India" ORR
andreinii d'Orchymont, 1939b: 320 A: OM SA YE AFR
crenatuloides d'Orchymont, 1943a: 2 A: OM UP ORR
crenatus Régimbart, 1903b: 54 A: YUN ORR
densus Sharp, 1890: 352 A: GUA HAI NP UP ORR
lentus Sharp, 1890: 352 A: GUA NP TAI XIZ YUN "India" ORR
mentinotus Kuwert, 1888e: 292 N: EG A: IS AFR
squalidus Sharp, 1904: 7
neglectus Hope, 1845: 16 (*Hydrobius*) A: FUJ GUA GUX HUB HUN JIX YUN ZHE ORR
negatus Hebauer, 1995a: 5 A: NP ORR
nipponicus Hebauer, 1995a: 6 [RN] A: JA SC
striatus Sharp, 1873b: 60 [HN]
sauteri d'Orchymont, 1943a: 6 A: GUA GUI HUB JIX SCH TAI
uenoi Matsui, 1995: 317 A: JA
- genus *Horelophopsis* M. Hansen, 1997: 109 type species *Horelophopsis avita* M. Hansen, 1997
hanseni Satô & Yoshitomi, 2004: 42 A: JA
- genus *Megagraphydrus* M. Hansen, 1999b: 137 type species *Megagraphydrus siamensis* M. Hansen, 1999
anhuianus Hebauer, 2000: 15 A: AHN
luteimarginalis Minoshima & Fujiwara, 2009: 55 A: JA
politus M. Hansen, 1999b: 138 A: TAI

puzhelongi Jia, 2010: 65 A: CE

wangi Hebauer, 2000: 15 A: TAI

subfamily **Sphaeridiinae** Latreille, 1802

tribe **Coelostomatini** L. Heyden, 1891

genus *Coelostoma* Brullé, 1835: 293 type species *Hydrophilus orbicularis* Fabricius, 1775

subgenus *Coelostoma* Brullé, 1835: 293 type species *Hydrophilus orbicularis* Fabricius, 1775

Cyclonotum Erichson, 1837: 212 type species *Hydrophilus orbicularis* Fabricius, 1775

fallaciosum d'Orchymont, 1936a: 19 A: FUJ GUA HKG NP TAI YUN ORR

hispanicum Küster, 1848a: no. 39 (*Cyclonotum*) E: AL FR GR IT PT SP N: CI MO TU

maroccanum Kuwert, 1890b: 176

montanum Mouchamps, 1958: 28 A: NP UP

orbiculare Fabricius, 1775: 229 (*Hydrophilus*) E: AB AR AU BE BU BY CR CT CZ DE EN FI FR GB GE GR HU IR
IT LA LT LU ME NL NR NT PL PT RO SK SL SP ST SV SZ UK YU A: BEI ES FE HEB HEN JA KZ TR WS

breve Sharp, 1874e: 419 (*Cyclonotum*)

brevitarse L. Heyden, 1870: 74 (*Cyclonotum*)

dalmatinum Küster, 1848a: no.40 (*Cyclonotum*)

graecum Kuwert, 1890b: 178

immaculatum P. Rossi, 1790: 48 (*Sphaeridium*)

minus Sharp, 1873c: 262 (*Cyclonotum*)

pilula O.F. Müller, 1776: 69 (*Hydrophilus*)

punctatum Goeze, 1777: 616 (*Dytiscus*) [RN]

puncticolle Reitter, 1906b: 32

subaereum Reitter, 1906b: 32

sulcatum Pu, 1963: 81 A: XIZ YUN

syriacum d'Orchymont, 1936a: 9 A: IS SY

vitalisi d'Orchymont, 1923b: 418 A: GUA GUX HAI HKG SHN YUN ORR

vividum d'Orchymont, 1936a A: GUA ORR

subgenus *Holocoelostoma* Mouchamps, 1958: 3 type species *Hydrobius stultus* Walker, 1858

bhutanicum Jayaswal, 1972: 409 A: BT NP UP

stultum Walker, 1858: 209 (*Hydrobius*) A: AE AF CHQ FUJ GUA GUX HUN JA JIX SCH NP OM SA SC SCH TAI
XIZ YE YUN AFR ORR

simplex Sharp, 1874e: 419 (*Cyclonotum*)

sulcatum Pu, 1963: 81

subgenus *Lachnocoelostoma* Mouchamps, 1958: 4 type species *Cyclonotum horni* Régimbart, 1902

bifidum Jia, Aston & Fikáček, 2014 A: GUA GUX JIX HKG

bipunctatum Jayaswal, 1972: 410 A: AP NP UP

coomani d'Orchymont, 1932c A: GUX YUN ORR

gentilii Jia, Aston & Fikáček, 2014 A: XIZ

hajeki Jia, Aston & Fikáček, 2014 A: GUA GUX

himalayanum Hebauer, 2002a: 29 A: NP

hongkongense Jia, Aston & Fikáček, 2014 A: HKG
horni Régimbart, 1902b: 474 (*Cyclonotum*) A: BT NP OM SA YE YUN "India" AFR ORR
huangi Jia, Aston & Fikáček, 2014 A: GUX JIX
martensi Hebauer, 2002a: 29 A: NP
medianum Hebauer, 2002a: 30 A: NP
phallicum d'Orchymont, 1940f: 158 A: GUA GUX HAI HUN JIX SN XIN ORR
rubens Hebauer, 2002a: 31 A: NP
surkhetensis Hebauer, 2002a: 32 A: NP
transcaspicum Reitter, 1906b: 32 A: IN OM SA SHN TM UZ TD TR ORR
turnai Hebauer, 2006: 15 A: HUB HUN
vagum d'Orchymont, 1940f: 159 A: ANH SHN YUN ORR
wui d'Orchymont, 1940f: 160 A: HUB HUN JIX SHA SHN XIN "Korea"

genus *Dactylosternum* Wollaston, 1854: 99 type species *Dactylosternum roussetii* Wollaston, 1854
 (= *Sphaeridium abdominale* Fabricius, 1792)

Macrocercyon Alluaud, 1899: 379 [RN] type species *Trichopoda cassidaeformis* Brullé, 1835

Trichopoda Brullé, 1835: 294 [HN] type species *Trichopoda cassidaeformis* Brullé, 1835

abdominale Fabricius, 1792a: 79 (*Sphaeridium*) Ei: AZ CR CZ FR GB GE GR IT SP SZ Ni: AG CI EG MR TU Ai:
 AE CY GUA JA SY YE "India" AFR AURi NARi NTRi ORRi

foveonitidum Kuwert, 1890b: 179

insulare Laporte, 1840b: 59 (*Coelostoma*)

mulsanti Murray, 1859: 352 (*Cyclonotum*)

natalense Gemminger & Harold, 1868: 495 (*Cyclonotum*) [RN]

nitidum Boheman, 1851: 602 (*Cyclonotum*) [HN]

perezdearcei Moroni, 2000: 23 (*Andotypus*)

roussetii Wollaston, 1854: 100

semistriatum L.W. Schaufuss, 1887: 108 (*Hydrobius*)

arabicum Balfour-Browne, 1951: 205 N: EG A: YE

hydrophiloides W.S. Macleay, 1825: 36 (*Sphaeridium*) A: BT FUJ GUA GUI GUX HAI NP SD TAI YUN AFRi AURi
 NTRi ORR

capense Mulsant, 1844b: 170 (*Cyclonotum*)

nitidum Laporte, 1840b: 58 (*Coelostoma*)

rubripes Boheman, 1858: 24 (*Cyclonotum*)

latum Sharp, 1873b: 64 (*Cyclonotum*) A: JA

pui Jia, 2002: 75 A: GUX

vitalisi d'Orchymont, 1925c: 271 A: FUJ HAI JIX YUN ORR

tribe Megasternini Mulsant, 1844

genus *Armustus* Sharp, 1890: 358 type species *Armustus optatus* Sharp, 1890

amplevatus Jia, 1995: 130 (*Cercyon*) A: GUA HUN

caudatus Hebauer, 2002a: 37 A: NP

crenulatus Régimbart, 1903c: 337 (*Cercyon*) A: JA NP UP ORR

cuneatus Hebauer, 2002a: 37 A: NP

nigricans Hoshina & Satô, 2006: 97 A: JA SC

ohyamatsensis Hoshina & Satô, 2006: 102 A: JA

optatus Sharp, 1890: 359 A: UP ORR

schenklingi d'Orchymont, 1914: 323 (*Cercyon*) A: GUA HKG MAC TAI ORR

genus *Cercyon* Leach, 1817: 95 type species *Dermestes melanocephalus* Linnaeus, 1758

subgenus *Acycreon* d'Orchymont, 1942a: 3 type species *Cercyon punctiger* Knisch, 1921

apiciflavus Hebauer, 2002a: 40 A: NP

punctiger Knisch, 1921a: 79 A: NP ORR

subgenus *Arcocercyon* Hebauer, 2003b: 8 type species *Cercyon dieganus* Régimbart, 1903

circumcinctus Reitter, 1889d: 254 E: AL GR YU A: IN IS TR

ostentum Shatrovskiy, 1999: 5

dieganus Régimbart, 1903a: 48 N: EG AFR

subgenus *Cercyon* Leach, 1817: 95 type species *Dermestes melanocephalus* Linnaeus, 1758

Cercyon Rey, 1886: 156 type species *Sphaeridium minutum* sensu Gyllenhal, 1808 (= *Sphaeridium triste* Illiger, 1801)

Cheilocercyon Seidlitz, 1888: [Arten] 112 type species *Scarabaeus quisquilius* Linnaeus, 1760

Cyceron Shatrovskiy, 1992: 362 (365) type species *Cercyon dux* Sharp, 1873

Epicercyon Kuwert, 1890b: 168 type species *Cercyon granarium* Erichson, 1837

Ercyon Rey, 1886: 129 type species *Sphaeridium littorale* Gyllenhal, 1808

Paraliocercyon Ganglbauer, 1904a: 274 type species *Cercyon depressum* Stephens, 1829

abeillei Guillebeau, 1896b: 231 A: IS TR

aequalipunctus Hebauer, 2002a: 40 A: UP

algarum Sharp, 1873b: 65 A: FE JA

alinae Ryndevich, 2004: 61 A: SCH

alpinus Vogt, 1969: 180 E: AU CZ GB GE IT RO UK YU

aptus Sharp, 1873b: 65 A: FE JA HEB

arenarius Rey, 1885a: 31 E: BU CR FR GR IT SP N: TU A: TR AURi

berlovi Shatrovskiy, 1999: 7 A: GAN QIN SCH XIZ

signifer Hebauer, 2002b: 8

bifenestratus Küster, 1851b: no.15 E: AR AU BU BY CT CZ DE EN FI FR GB GE HU IT LA LT LU NL NT PL SK ST

SV SZ UK A: ES FE KZ MG WS

palustris Thomson, 1853: 55

bononiensis Chiesa, 1964a: 118 E: CZ GE HU IT SK SL

hungaricus Endrödy-Younga, 1967: 67

borealis Baranowski, 1985: 341 E: FI NR SV A: ES FE

castaneipennis Vorst, 2009: 60 E: BY CI CT CZ LA NL PL SK ST SV

cavus Hebauer, 2002a: 40 A: NP

convexusculus Stephens, 1829c: 146 E: AU BY CZ DE EN FI FR GB GE HU IR IT LT NL NR NT PL SK SV SZ UK

"Caucasus" A: ES WS

alni Vogt, 1969: 186

intermixtus Sharp, 1918: 276

- costiventris* Hebauer, 2002a: 41 A: NP
costulipennis Nakane, 1966: 55 A: JA
cultriformis Wu & Pu, 1995: 125 A: GUA
depressus Stephens, 1829c: 138 E: DE EN FI FR GB GE IR NL NR NT SV UK AURi NARi NTRi
 dorsostriatus Thomson, 1853: 54
 uruguayanus Knisch, 1924c: 120
deserticola Fikáček, Gentili & Short, 2010: 156 A: AE
dilutus Régimbart, 1903c: 338 A: SD ORR
divisus Hebauer, 2002a: 42 A: NP
dux Sharp, 1873b: 65 A: FE JA
emarginatus Baranowski, 1985: 344 E: FI NR SV
fimbriatus Mannerheim, 1852b: 344 Ei: NT NAR
 paradoxus Kuwert, 1890b: 165 (321)
granarius Erichson, 1837: 221 E: AU BH BY CR CT CZ DE EN FR GB GE HU IT LA LT NL NT PL SK SL SZ YU
 "Caucasus" A: FE KZ XIX "South Siberia"
haemorrhoidalis Fabricius, 1775: 67 (*Sphaeridium*) E: AL AR AU AZ BH BU BY CR CT CZ DE EN FA FI FR GB
 GE GG GR HU IR IT LA LT ME NL NR NT PL PT SK SL SP ST SV SZ UK YU N: AG TU A: ES FE IS SY TR WS
 AURi NARi NTRi ORRi
 aquatilis Donisthorpe, 1932d: 129
 basillaris Notman, 1920: 187
 calthae Scopoli, 1763: 18 (*Dermestes*) [DA]
 erythropterus Mulsant, 1844a: 180
 erythropterus Küster, 1851a: no.8 [HN]
 femoralis Stephens, 1829c: 143
 flavipes Fabricius, 1792a: 81 (*Sphaeridium*)
 infuscatus Stephens, 1829c: 144
 nigricollis Say, 1825b: 190 (*Sphaeridium*)
 obscurus Fabricius, 1792a: 185 (*Hydrophilus*) [HN]
 picinus Marsham, 1802: 69 (*Dermestes*)
 similis Marsham, 1802: 68 (*Dermestes*)
 striatus Turton, 1802: 422 (*Hydrophilus*) [RN]
 suturalis Stephens, 1829c: 142
hebaueri Ryndevich, 2007: 309 A: "India"
impressus Sturm, 1807: 9 (*Sphaeridium*) E: AR AU BU BY CT CZ DE FI FR GB GE GG HU IR IT LA LT NL NR NT
 PL SK SP ST SV SZ TR UK NARi
 apicalis Dalla Torre, 1877: 73 [HN]
 melanocephaloides Kuwert, 1890b: 163
 piceus Marsham, 1802: 69 (*Dermestes*) [HN]
 xanthocephalus Stephens, 1829c: 143

- inquinatus* Wollaston, 1854: 103 Ei: AU AZ CR CZ IT Ni: CI MR A: GUA JA AFRi AURi NARi NTRi ORR
austriacus Vogt, 1974: 190
faeceus Balfour-Browne, 1954: 230
gebieni Knisch, 1925: 202
knischi J. Müller, 1924b: 77
rhombicus Jia, 1995: 128
- jonensis* Nakane, 1965: 54 A: JA
kabaki Ryndevich, 2004: 59 A: SCH
korbianus Kniž, 1912: (169) A: FE WS
kryzhanovskii Shatrovskiy, 1989: 284 A: FE
- lateralis* Marsham, 1802: 69 (*Dermestes*) E: AB AR AU BY CR CZ DE EN FI FR GB GE GG HU IR IT LA LT NL NR
 NT PL PT SK SP ST SV SZ UK YU A: ES FE KZ TD WS NARi
inermatus Notman, 1920: 186
- lencoranus* Kuwert, 1890b: 162 E: AB GG ST
- littoralis* Gyllenhal, 1808: 111 (*Sphaeridium*) E: AZ DE EN FA FI FR GB GE IR LA LT NL NR NT PL PT RO SP ST
 SV UK YU N: CI A: TR NAR
binotatus Stephens, 1829c: 137
dilatatus Stephens, 1829c: 138
normannus L. Benick, 1916: 204
ruficollis Schilsky, 1888: 190
ruficornis Stephens, 1829c: 137
- lividulus* d'Orchymont, 1926b: 204 A: BT ORR
- longulus* Hebauer, 2002a: 43 A: NP
- marinus* Thomson, 1853: 54 E: AU BY CT CZ DE EN FA FI FR GB GE HU IR IT LA LT LU NL NR NT PL SP ST SV
 SZ UK "Caucasus" A: ES FE GUA HEI JA KZ MG NMO NP TM TR WS XIN NAR
aquaticus Laporte, 1840b: 61 [HN]
heilongjiangensis Wu & Pu, 1995: 127
- medvedorum* Shatrovskiy, 1999: 5 A: QIN
- melanocephalus* Linnaeus, 1758: 356 (*Dermestes*) E: AR AU BH BY CR CT CZ DE EN FI FR GB GE GR HU IC IT
 LA LT NL NR NT PL SK SL SP ST SV SZ UK A: ES LE UZ WS
rubripennis Kuwert, 1890b: 164
- mirandulus* Hebauer, 2002a: 44 A: NP
- moroderi* Doderò, 1932: 14 E: SP
- nigriceps* Marsham, 1802: 72 (*Dermestes*) Ei: AL AU AZ BY CR CT CZ DE EN FI FR GB GE HU IR IT LA LT MA
 NL NR NT PL PT RO SK ST SV SZ UK N: CI MR TU Ai: BT GUA IN JA NP SA TAI TR YE "India" AFRi AURi
 NARi NTRi ORR
atricapillus Marsham, 1802: 72 (*Dermestes*)
atriceps Stephens, 1829c: 151
atriceps Gemminger & Harold, 1868: 496 [RN] [HN]
bimaculatus Stephens, 1829c: 152

- centrimaculatus* Sturm, 1807: 23 (*Sphaeridium*)
inustus Marsham, 1802: 76 (*Dermestes*)
laevis Marsham, 1802: 73 (*Dermestes*)
mundus Melsheimer, 1844b: 102
nigriceps Motschulsky, 1863: 445 [HN]
nubilipennis Stephens, 1835: 401
panamensis M. Hansen, 1999a: 286 [RN]
pulchellus Heer, 1841: 492
striatus Sharp, 1882: 108 [HN]
testaceus Stephens, 1829c: 152
ustulatus Stephens, 1829c: 152 [HN]
vicinalis Walker, 1859: 258
numerosus Shatrovskiy, 1989: 281 A: FE JA SC
obsoletus Gyllenhal, 1808: 107 (*Sphaeridium*) E: AR AU AZ BY CR CT CZ DE EN FI FR GB GE HU IT LA NL NR
 NT PL PT SK SL SP SV SZ UK N: AG
obscurus Dalla Torre, 1877: 73 [HN]
tristis Dalla Torre, 1877: 73 [HN]
olibrus Sharp, 1874e: 418 A: FE JA JIX TAI
omjenus Hebauer, 2002a: 45 A: NP
ovillus Motschulsky, 1860b: 129 A: ANH ES FE JA MG NMO WS XIN
paranigriceps Ryndevich & Hebauer, 2010: 335 A: FE ORR
parametricus Hebauer, 2002a: 45 A: NP
peltoides Hebauer, 2002a: 46 A: NP
pentatomicus Hebauer, 2002a: 46 A: NP
pseudodilutus Satô, 1979: 52 A: NP SD
pygmaeus Illiger, 1801: 40 (*Sphaeridium*) E: AR AU BY CR CT CZ DE EN FI FR GB GE HU IR IT LA LT ME NL
 NR NT PL SK SL SP ST SV SZ UK YU N: EG A: ES IN WS NARi
apicalis Say, 1823: 203 (*Sphaeridium*)
conspurcatus Sturm, 1807: 15 (*Sphaeridium*)
erythropus Stephens, 1829c: 148
fuscescens Stephens, 1829c: 150
merdarius Sturm, 1807: 26 (*Sphaeridium*)
stercorator Stephens, 1829c: 147
quisquilius Linnaeus, 1760: 138 (*Scarabaeus*) E: AR AU BU BY CR CZ DE EN FI FR GB GE GR HU IR IT LA LT
 NL NR NT PL PT RO SK SP SV SZ UK YU N: CI EG MR TU A: CY ES FE GUX IS JA JIX KI KZ MG NMO NP
 QIN SA SHG TD TR WS AURi NARi NTRi
dispar Paykull, 1798: 62 (*Sphaeridium*) [DA]
flavipennis Küster, 1848b: no.56
flavus Marsham, 1802: 71 (*Dermestes*)
guangxiensis Wu & Pu, 1995: 128

- minimus* Scopoli, 1763: 12 (*Scarabaeus*)
mulstanti Ganglbauer, 1904a: 280 [RN]
xantopterus Laicharting, 1781: 85 (*Sphaeridium*)
renneri Hebauer, 1997b: 73 E: GEi
rhomboidalis Perris, 1874: 3 E: FR (Corse) IT (Sardegna)
rotundulus Sharp, 1884b: 460 A: FE JA
rufinotus Hebauer, 2002a: 47 A: NP
rufosuturatus Hebauer, 2002a: 48 A: NP
saluki Ryndevich, 1998: 63 A: FE
scaevus Hebauer, 2002a: 48 A: NP
sculptus Hebauer, 2002a: 48 A: NP
sericatus Hebauer, 2002a: 49 A: NP
setiger Wu & Pu, 1995: 128 A: GUA GUI ORR
setulosus Sharp, 1884b: 458 A: FE JA NAR
shinanensis Nakane, 1965: 54 A: JA
spatiferides Newton, *nom. nov.* [see New Acts] A: NP
spatifer Hebauer, 2002a: 49 [HN]
sternalis Sharp, 1918: 276 E: AU AZ BY CR CT CZ DE FI GB GE GG IR IT NL PL SK ST SV UK A: IN WS
pumilio Sharp, 1918: 277
strandi Roubal, 1938: 56 E: AR ST A: TR
subopacipennis Nakane, 1965: 53 A: JA
subsulcatus Rey, 1885a: 32 E: BH BY CR CT FR GE IT SP ST UK
agnotus Kuwert, 1888a: 38
symbion Shatrovskiy, 1989: 281 A: FE JA
tabellarius Hebauer, 2002a: 50 A: NP
atricus Endrödy-Younga, 1967: 63 E: RO SK UK A: ES FE
exorabilis Shatrovskiy, 1989: 285
terminatus Marsham, 1802: 70 (*Dermestes*) E: AR AU BY CR CT CZ DE EN FI FR GB GE HU IR IT LA LT ME NL
 NR NT PL SK SP SV SZ UK N: AG CI EG MR TU A: FE IS KZ MG SHA WS NARi
basalis Dalla Torre, 1877: 73
exiguus Grimmer, 1841: 40 (*Cambrus*) [DA]
fimetarius Wollaston, 1854: 103
lepidus Wollaston, 1864: 94
marginecollis Dalla Torre, 1877: 73
nanus Melsheimer, 1844b: 102
plagiatus Erichson, 1837: 218
scutellaris Stephens, 1829c: 153
separandus Rey, 1886: 153
torquatus Hebauer, 2002a: 50 A: NP

- tristis* Illiger, 1801: 39 (*Sphaeridium*) E: AU BY CT CZ DE EN FI FR GB GE HU IR IT LA LT LU NL NR NT PL PT
SK SP ST SV SZ UK A: ES FE KZ MG WS
- boletophagus* Marsham, 1802: 72 (*Dermestes*)
- convexius* Stephens, 1829c: 145
- laevigatus* Stephens, 1829c: 140
- uenoi* Satô, 1984: 1 A: JA
- unipunctatus* Linnaeus, 1758: 364 (*Coccinella*) E: AR AU BY CR CT CZ DE EN FI FR GB GE HU IC IR IT LA LT
NL NR NT PL PT RO SK SL SP ST SV SZ UK A: ES FE HEI JA KZ WS NARi
- cordiger* Herbst, 1784: 122 (*Hydrophilus*)
- dispar* Paykull, 1798: 62 (*Sphaeridium*) [DA]
- impunctatus* Kuwert, 1890b: 166
- janssoni* Nyholm, 1952: 207
- unipustulatus* Nakane, 1982: 101 A: FE JA
- ustus* Sharp, 1874e: 418 A: FE JA TAI
- verus* Shatrovskiy, 1989: 282 A: FE WS
- wui* M. Hansen, 1999a: 293 [RN] A: GUA
- striatus* Wu & Pu, 1995: 129 [HN]
- yayeyama* Chûjô & Satô, 1970: 7 A: JA
- chujoi* Satô, 1985: 212
- subgenus** *Clinocercyon* d'Orchymont, 1942a: 2 type species *Cercyon grandis* Laporte, 1840
- aequalis* Sharp, 1884b: 459 A: JA
- placidoides* Zaitzev, 1908b: 411 [RN]
- hanseni* Jia, Fikáčec & Ryndevich, 2011: 42 A: GUI JIX
- incretus* d'Orchymont, 1941a: 9 A: FUJ
- lineolatus* Motschulsky, 1863: 444 (*Trichopoda*) A: AE GUA NP YUN TAI ORR AFRi
- nigrostriatus* Wu & Pu, 1995: 127
- nepalensis* Ryndevich, 2011: 399 A: NP
- placidus* Sharp, 1884b: 459 A: JA
- rubicundus* Sharp, 1884b: 460 A: JA
- subgenus** *Conocercyon* Hebauer, 2003b: 30 type species *Cercyon crenatostriatus* Régimbart, 1903
- sanaii* Hoshina, 2008: 2 A: JA
- vagus* Sharp, 1884b: 459 A: FE JA SC
- subgenus** *Dicyrtocercyon* Ganglbauer, 1904a: 274 type species *Sphaeridium ustulatum* Preysslser, 1790
- diversipunctus* Hebauer, 2002a: 41 A: NP UP
- ustulatus* Preysslser, 1790: 34 (*Sphaeridium*) E: AU BY CR CZ DE EN FI FR GB GE HU IR IT LA LT LU MC NL NR
NT PL PT RO SK SP ST SV SZ UK YU A: TR NARi
- haemorrhoidalis* Fabricius, 1792a: 185 (*Hydrophilus*) [HN]
- haemorrhoum* Gyllenhal, 1808: 107 (*Sphaeridium*) [RN]
- xanthorhoeus* Stephens, 1829c: 143
- subgenus** *Himalcercyon* Hebauer, 2002a: 39 type species *Cercyon mirus* Hebauer, 2002
- mirus* Hebauer, 2002a: 39 A: NP

subgenus *Paracercyon* Seidlitz, 1888: [Gattungen] 23 type species *Hydrophilus analis* Paykull, 1798
analis Paykull, 1798: 187 (*Hydrophilus*) E: AU BU BY CR CT CZ DE EN FI FR GB GE HU IC IR IT LA LT NL NR
 NT PL RO SK SL SP ST SV SZ TR UK YU "Caucasus" N: AG A: ES FE KZ TR WS AURi NARi

acutus Stephens, 1829c: 139

apicalis Stephens, 1829c: 140

aquaticus Stephens, 1829c: 138

maculatus Melsheimer, 1844b: 101

honorabilis Shatrovskiy, 1999: 7 A: QIN

subgenus *Paracycreon* d'Orchymont, 1942a: 3 type species *Cercyon hova* Régimbart, 1903

laminatus Sharp, 1873b: 66 Ei: AL AR AU BE BU BY CT CZ DE EN FI FR GB GE GG GR HU IT LT MD NL PL SP
 ST SV SZ TR UK A: FE GUA GUX HKG HUB HUN IS JA JIL KI KZ NP SCH SHA SHG TAI TR WS ZHE AURi
 ORR PACi NTRi

sharpi Harold, 1878: 68

tropisternus Wu & Pu, 1995: 129

vicinaloides d'Orchymont, 1925c: 278

maculosus Hebauer, 2002a: 44 A: NP

noctuabundus Shatrovskiy, 1992: 367 A: FE GUI

subsolanus Balfour-Browne, 1939c: 4 A: SA GUA JIX TAI "India" ORR

linearis Wu & Pu, 1995: 127

genus *Cercyon*, species incertae sedis

scitus Walker, 1836: 413 N: CI

genus *Cercyon*, nomen dubium

elegans Betta, 1847: 25 E: IT

genus *Cryptopleurum* Mulsant, 1844a: 188 type species *Sphaeridium minutum* Fabricius, 1775

crenatum Kugelann, 1794: 543 (*Sphaeridium*) E: AR AU BE BY CR CT CZ DE EN FI FR GB GE GG HU IT LT NL
 NR NT PL RO SK SL SP SV SZ TR UK YU A: KZ TR

vaucherii Tournier, 1868: 566

ferrugineum Motschulsky, 1863: 448 A: GUA NP SA TAI "India" ORR

minutum Fabricius, 1775: 68 (*Sphaeridium*) E: AR AU BE BU BY CR CT CZ DE EN FI FR GB GE HU IT LA LT NL
 NR NT PL PT RO SK SL SP SV SZ UK YU A: ES FE KI KZ NMO WS NARi

pulicarium Thunberg, 1784: 7 (*Hister*) [DA]

sordidus Marsham, 1802: 69 (*Dermestes*)

pygmaeum d'Orchymont, 1913: 15 A: TAI ORR

subtile Sharp, 1884b: 461 Ei: AU BE BY CH CZ DE FI GB GE GG IT NL NR PL SV SZ UK A: BEI ES FE JA JIX KI
 KZ NP TAI ZHE "India" NARi

sulcatum Motschulsky, 1863: 448 A: NP ORR

genus *Emmidolium* d'Orchymont, 1937e: 466 type species *Emmidolium excavatum* d'Orchymont, 1937

excavatum d'Orchymont, 1937e: 467 A: JA TAI ORR AFR

- genus *Megasternum* Mulsant, 1844a: 187 type species *Dermestes obscurus* Marsham, 1802 (= *Dermestes concinnus* Marsham, 1802)
- concinnum* Marsham, 1802: 74 (*Dermestes*) E: AR AU BE BY CR CT CZ DE EN FA FI FR GB GE GG GR HU IT LT MC ME NL NR NT PL PT RO SK SL SP ST SV SZ UK N: AG TU A: AHN ES FE TR WS NARI
- acutum* Stephens, 1829c: 139 (*Cercyon*) [DA]
- algericum* J. Sahlberg, 1903d: 17 [DA]
- aquaticum* Stephens, 1829c: 138 (*Cercyon*) [DA]
- brunneum* Dalla Torre, 1877: 73 [DA]
- calabricum* Kuwert, 1890b: 172 (324)
- castaneum* Heer, 1841: 492 (*Cercyon*) [DA]
- caucasicum* Kuwert, 1890b: 171 (323) [DA]
- contaminatum* Stephens, 1829c: 149 (*Cercyon*) [DA]
- convexior* Stephens, 1829c: 146 (*Cercyon*) [DA]
- ferrugineum* Dalla Torre, 1877: 73 [DA]
- immune* Stephens, 1829c: 140 (*Cercyon*) [DA]
- obscurum* Marsham, 1802: 72 (*Dermestes*) [HN]
- pusillum* Kuwert, 1890b: 173 (325) (*Pachysternum*) [DA]
- stercorarium* Marsham, 1802: 76 (*Dermestes*) [DA]
- testaceum* Stephens, 1829c: 152 (*Cercyon*) [DA]
- immaculatum* Stephens, 1829c: 147 (*Cercyon*) E: GB
- japonicum* Shatrovskiy, 1989: 286 A: FE JA
- prometheus* Shatrovskiy, 1990: 83 E: GG ST

- genus *Nipponocercyon* Satô, 1963b: 267 type species *Nipponocercyon shibatai* Satô, 1963
- shibatai* Satô, 1963b: 267 A: JA
- monticola* Nakane, 1968: 86 A: JA
- oyamanum* Nakane, 1968: 86
- sichuanicus* Ryndevich, 2005: 244 (*Cryptopleurum*) A: SCH

- genus *Oosternum* Sharp, 1882: 112 type species *Oosternum costatum* Sharp, 1882 (= *Oosternum sharpi* M. Hansen, 1999)
- Pemelus* Horn, 1890b: 309 type species *Megasternum costatum* LeConte, 1855
- atramentarium* Hebauer, 2002a: 54 A: NP
- okinawaense* Hoshina, 2011: 231 A: JA
- robiginosum* Hebauer, 2002a: 55 A: NP
- rudicolle* Hebauer, 2002a: 56 A: NP
- sericicolle* Hebauer, 2002a: 56 A: NP
- sharpi* M. Hansen, 1999c: 242 [RN] Ei: AZ AFRi NAR NTR ORRi
- costatum* Sharp, 1882: 113 [HN]
- shigehisai* Hoshina & Satô, 2004: 11 A: JA
- soricoides* d'Orchymont, 1941a: 13 A: FUJ JIX JA
- sugitai* Hoshina, 2009: 2 A: JA

takedai Hoshina & Satô, 2005: 2 A: JA

toshiiei Hoshina & Satô, 2004: 9 A: JA

genus *Oreocyon* Hebauer, 2002a: 35 type species *Oreocyon frigidus* Hebauer, 2002

frigidus Hebauer, 2002a: 36 A: NP ORR

genus *Pachysternum* Motschulsky, 1863: 446 type species *Pachysternum nigrovittatum* Motschulsky, 1863

Pigrillum Knisch, 1921a: 72 type species *Cercyon villosus* Régimbart, 1907

apicatum Motschulsky, 1863: 448 A: HAI ORR

brunneum Balfour-Browne, 1951: 209 A: YE

capense Mulsant, 1844c: 381 (*Cryptopleurum*) Ei: FR GR HU IT RO Ni: CI MR AFR AURi NTRi

figuratum Gerstaecker, 1867: 26 (*Cercyon*)

rufocaudatum Fairmaire, 1893b: 526 (*Cercyon*)

scapulare Boheman, 1851: 608 (*Cercyon*)

cardoni d'Orchymont, 1926b: 220 A: AP CE GUI NP SD SE SW ORR

haemorrhoum Motschulsky, 1866: 168 A: ES FE JA MG NMO NO NE KZ WS "Korea"

distinctum Sharp, 1873b: 66 (*Megasternum*)

gibbulum Motschulsky, 1866: 169 (*Megasternum*)

sibiricum Kuwert, 1890b: 172 (324)

kubani Fikáček, Jia & Prokin, 2012: 31 A: SCH ORR

nigrovittatum Motschulsky, 1863: 447 A: CE FUJ GUA GUX HAI HKG NP SD SE SW UP ORR

rugosum Fikáček, Jia & Prokin, 2012: 38 A: GAN SHA

stevensi d'Orchymont, 1926b: 220 A: FUI GUA GUX YUN CE SE SW NP SD UP ORR

nigrum Jia, Wu & Pu, 1998: 125 (127)

genus *Pacrillum* d'Orchymont, 1941a: 14 type species *Pacrillum chinense* d'Orchymont, 1941

Aгнаеformia Shatrovskiy, 1989: 286 type species *Aгнаеformia lucida* Shatrovskiy, 1989

chinense d'Orchymont, 1941a: 16 A: FUJ SCH

cyrilloideum Fikáček & Hebauer, 2006: 60 A: NP

lucidum Shatrovskiy, 1989: 286 (*Aгнаеformia*) A: FE

manchuricum d'Orchymont, 1941a: 17 A: "Southern Manchuria"

genus *Paroosternum* Scott, 1913: 220 type species *Paroosternum degayanum* Scott, 1913

Anchorosternum Jia, Wu & Pu, 2001: 155 type species *Anchorosternum sinensis* Jia, Wu & Pu, 2001

saundersi d'Orchymont, 1925c: 289 (*Oosternum*) A: NP ORR

sorex Sharp, 1874e: 418 (*Cercyon*) A: GUA GUX HKG JA TAI AFRi AURi ORR

horni d'Orchymont, 1914: 326 (*Oosternum*)

sinense Jia, Wu & Pu, 2001: 157 (*Anchorosternum*)

genus *Pelosoma* Mulsant, 1844a: 184 type species *Pelosoma lafertei* Mulsant, 1844

Merosoma Balfour-Browne, 1939b: 472 type species *Pelosoma eremita* Knisch, 1925

lafertei Mulsant, 1844a: 185 Ei: FR IT NTR

meridionale Bruch, 1915: 468

tribe Omicrini Smetana, 1975

genus *Microgioton* d'Orchymont, 1937e: 463 type species *Mirogioton coomani* d'Orchymont, 1937

Ischyromicrus Malcolm, 1981: 264 type species *Ischyromicrus julieae* Malcolm, 1981

grandis Bameul, 1994b: 134 A: SD

genus *Noteropagus* d'Orchymont, 1919: 132 type species *Noteropagus politus* d'Orchymont, 1919

politus d'Orchymont, 1919: 134 A: UP AUR ORR

genus *Oreomicrus* Malcolm, 1980: 186 type species *Oreomicrus explanatus* Malcolm, 1980

tristis Bameul, 1994a: 80 A: NP

genus *Paromicrus* Scott, 1913: 206 type species *Paromicrus carinatus* Scott, 1913

affinis d'Orchymont, 1919: 127 A: JA

annandalei d'Orchymont, 1919: 130 A: AP BT

genus *Peratogonus* Sharp, 1884b: 461 type species *Peratogonus reversus* Sharp, 1884

grandis Malcolm, 1981: 263 A: SD

reversus Sharp, 1884b: 461 A: JA TAI

genus *Psalitrus* d'Orchymont, 1919: 123 type species *Psalitrus vandenbosscheae* d'Orchymont, 1919

fallax Balfour-Browne, 1948b: 384 A: UP

masatakai Hoshina, 2007c: 42 A: JA

sauteri d'Orchymont, 1929a: 92 A: TAI

smetanae Bameul, 1992: 103 A: NP

temperei Bameul, 1992: 105 A: NP

yamatensis Hoshina & Satô, 2005: 15 A: JA

tribe Protosternini M. Hansen, 1991

genus *Protosternum* Sharp, 1890: 356 type species *Protosternum atomarium* Sharp, 1890

Blanodium d'Orchymont, 1926a: 99 type species *Dactylosternum abnormale* d'Orchymont, 1913

abnormale d'Orchymont, 1913: 10 (*Dactylosternum*) A: TAI ORR

arunvallense Hebauer, 2002a: 34 A: NP

tribe Sphaeridiini Latreille, 1802

genus *Sphaeridium* Fabricius, 1775: 66 type species *Dermestes scarabaeoides* Linnaeus, 1758

Sphaeridiolinus Minozzi, 1921: 54 type species *Sphaeridium bipustulatum* Fabricius, 1781

bipustulatum Fabricius, 1781a: 78 E: AR AU AZ BE BH BU BY CR CT CZ DE EN FI FR GB GE HU IT LA LT MC

MD NL NR NT PL PT SK SL SP ST SV SZ UK YU N: AG CI EG TU A: AF ES IS KZ MG TD TR WS NARi

basalis Dalla Torre, 1877: 72 [DA]

bimaculatum Kuwert, 1890b: 174 [HN] [DA]

daltoni Stephens, 1829c: 156 [DA]

haemorrhoum Schrank, 1781: 26 (*Dermestes*)

- humerale* Westhoff, 1881: 61 [DA]
lunulatum Stephens, 1829c: 155 [DA]
marginatum L.G. Scriba, 1790b: 164 [HN] [DA]
quadrinaculatum Herbst, 1783: 30 [HN] [DA]
renipustulatum Heer, 1841: 488 [DA]
semistriatum Laporte, 1840b: 60 [DA]
tauricum Motschulsky, 1849: 94 [HN]
testaceum Heer, 1841: 488 [HN] [DA]
testudinarium Geoffroy, 1785: 24 (*Dermestes*) [HN]
caffrum Laporte, 1840b: 60 A: YE AFR
apicale Boheman, 1851: 606
densepunctatum Berlov & Shatrovskiy, 1989: 277 A: FE "North China"
dimidiatum Gory, 1834: pl. 20 [fig. 15] A: JA SD TAI UP ORR
cameroni d'Orchymont, 1926b: 202
dimidiatum Laporte, 1840b: 60 [HN]
discolor d'Orchymont, 1933a: 298 A: GUA GUX TAI UP AUR ORR
exile Boheman, 1851: 607 A: YE AFR
lunatum Fabricius, 1792a: 78 E: AR AU BE BU BY CR CT CZ DE EN FI FR GB GE IR IT LA LT NL NR NT PL SK
 SL SP SV SZ UK YU N: AG A: FE IS JO KZ MG NW SY TD WS NARi
bimaculatum Ragusa, 1891: 136 [HN] [DA]
marginatum Fabricius, 1787: 43 E: BH BU BY CR CT CZ DE FI FR GB GE HU IR IT MC PL RO SK SL SP ST SZ TR
 UK N: AG TU A: CY TD TR UZ WS "Middle East" "Near East" NARi
quinquemaculatum Fabricius, 1798: 39 A: FUJ GUA GUX JA JIA JIX NP SA TAI "India" ORR
chinense J. Frivaldszky, 1889: 197
tricolor Walker, 1858: 209 [HN]
vicinum Laporte, 1840b: 60
reticulatum d'Orchymont, 1929b: 410 E: TR A: HP GUA JIX SCH SHN TAI UP ORR
scarabaeoides Linnaeus, 1758: 356 (*Dermestes*) E: AB AR AU BE BH BU BY CR CT CZ DE EN FI FR GB GE GG
 HU IR IT LA LT MC NL NR NT PL PT RO SK SL SP SV SZ N: TU A: ES FE HEI IS JA KI KZ NMO TD TR UK
 UZ WS AFRi AURi NARi
crenatum Palisot de Beauvois, 1817: 158 [HN]
pictum Ménétrés, 1832: 172
pictum Faldermann, 1835a: 235 [HN]
quadrinaculatum Schrank, 1781: 25 (*Dermestes*)
quadrinaculatum Marsham, 1802: 66 (*Dermestes*) [HN]
quadrinaculatum Küster, 1845: no.23 [HN]
striolatum Heer, 1841: 487
testudinarium De Geer, 1774: 345 (*Hister*) [RN]
tricolor Geoffroy, 1785: 24 (*Dermestes*)
senegalense Laporte, 1840b: 61 A: YE AFR
zavattarii Marcuzzi, 1941: 107
seriatum d'Orchymont, 1913: 12 A: NP FUJ GUA HAI HUN "India" ORR
severini d'Orchymont, 1919: 116 A: HKG NP SD YUN ORR

substriatum Faldermann, 1838: 8 E: AB AR AU AZ BH BU CR CZ DE FR GE GR HU IT LT MC ME PL SK ST UK
N: AG EG TU A: ES FE IS KA KZ LIA MG NE NMO SHX TD TM TR WS

atratum Ragusa, 1891: 136

genus *Sphaeridium*, **nomina dubia** (possibly not Hydrophiloidea)

bipunctatum Thunberg, 1794c: 102 [DA] E: SV

bipustulatum Thunberg, 1794c: 102 [HN] [DA] E: SV

inquinatum Kugelann, 1798: 69 [DA] E: PL

pellucidum P. Rossi, 1794: 83 [DA] E: IT

plagiatum Thunberg, 1794c: 101 [DA] E: SV

punctiforme Schrank, 1798: 444 [DA] E: GE

rubrum Thunberg, 1794c: 100 [DA] E: SV

ruficolle Frölich, 1792: 121 [HN] [DA] E: GE

rufipes Schrank, 1785: 315 [DA] E: GE

rufipes Thunberg, 1794c: 101 [HN] [DA] E: SV

testudineum P. Rossi, 1794: 83 [DA] E: IT

vaccarium Kugelann, 1798: 69 [DA] E: PL

family SPHAERITIDAE Shuckard, 1839

genus *Sphaerites* Duftschmid, 1805: 205 type species *Hister glabratus* Fabricius, 1792

dimiduatus Jureček, 1934: 45 A: GAN SCH SHA

glabratus Fabricius, 1792a: 73 (*Hister*) E: AU BE BU BY CT CZ DE EN FI FR GB GE HU IT LA LS LT LU NL NR

NT PL RO SK SL SV SZ UK A: ES FE JA JIL MG WS

involutilis Gusakov, 2004: 182 A: SCH

nitidus Löbl, 1996: 196 A: GAN SCH

opacus Löbl & Háva, 2002: 179 A: SHA

family SYNTELIIDAE Lewis, 1882

genus *Syntelia* Westwood, 1864: 11 type species *Syntelia indica* Westwood, 1864

davidis Fairmaire, 1889a: 11 A: SCH

histeroides Lewis, 1882: 137 A: FE JA

indica Westwood, 1864: 11 A: NP SD

mazuri Zhou, 2003: 269 A: SCH

sinica Zhou, 2003: 267 A: SCH

family HISTERIDAE Gyllenhal, 1808

subfamily Abraeinae W.S. Macleay, 1819

tribe Abraeini W.S. Macleay, 1819

genus *Abraeus* Leach, 1817: 76 type species *Hister globosus* Hoffmann, 1803 (= *Hister perpusillus* Marsham, 1802)

subgenus *Abraeus* Leach, 1817: 76 type species *Hister globosus* Hoffmann, 1803 (= *Hister perpusillus* Marsham, 1802)

Habraeus Agassiz, 1846: 170 [unjustified emendation]

areolatus Reitter, 1884a: 7 E: AB A: IN

loebli Gomy & Ôhara, 2001: 3 A: JA