

CLASSIC REPRINT SERIES

---

MITTEILUNGEN AUS DER  
ENTOMOLOGISCHEN  
GESELLSCHAFT ZU HALLE A S

---



by  
Entomologische Gesellschaft Zu Halle

Forgotten Books

---

# Forgotten Books

## MITTEILUNGEN AUS DER ENTOMOLOGISCHEN GESELLSCHAFT ZU HALLE A S

*by*

Entomologische Gesellschaft Zu Halle

Published by Forgotten Books 2013

Originally published 1909

PIBN 1100136962

[www.ForgottenBooks.org](http://www.ForgottenBooks.org)

Copyright © 2013 Forgotten Books

*Carl 4.*

# Mitteilungen

aus der

# Entomologischen Gesellschaft zu Halle a. S.

**Heft 8/9**

Im Auftrage des Vereins herausgegeben

von

**Curt Daehne**



Berlin, W. Junk  
1915

# Inhalt.

---

	Seite
Daehne, Aus dem Vereinsleben 1913/14 . . . . .	3
<i>Lepidoptera:</i>	
Bauer, Über das Vorkommen von <i>Tinea pallescentella</i> bei Naumburg . . . . .	10
<i>Coleoptera:</i>	
Urban, Verzeichnis der in der Umgebung von Magdeburg auf- gefundenen Staphyliniden . . . . .	12
<i>Varia:</i>	
Daehne, Aus den Sitzungen 1913 . . . . .	1—72

## Verzeichnis der in der Umgebung von Magdeburg aufgefundenen Staphyliniden.

Von Dr. C. Urban, Schönebeck a. E. [3. II. 14]

Seit dem Jahre 1905 habe ich im Magdeburgischen gesammelt und dabei in erster Linie Staphyliniden nachgespürt. Der verflossene Zeitraum konnte freilich nicht ausreichen, die vorkommenden Arten einer so umfangreichen Käferfamilie sämtlich aufzufinden. Wenn ich trotzdem daran gehe, ein Verzeichnis zusammenzustellen, so hat dies vor allem darin seinen Grund, daß ich mich seit einigen Jahren voraussichtlich für immer von der eingehenderen Beschäftigung mit den Kurzflüglern abgewendet habe und daher nicht hoffen kann, die Zahl der aufgefundenen Arten noch wesentlich zu vermehren. Ferner ist für absehbare Zeit keine Aussicht vorhanden, daß ein anderer sich der Sache annimmt, und erscheint mir ein verbesserungsbedürftiges Verzeichnis immer noch besser als gar keines. Zuletzt und nicht zum wenigsten wurde ich aber dadurch zur Ausführung meines Vorhabens ermutigt, daß die älteren Magdeburger Sammler mir ihre Beobachtungen zur Verfügung stellten. Insbesondere hat mich der bekannte Erforscher der Käferfauna Magdeburgs, Herr Lehrer Hahn (H.), durch freundliche Mitteilung der Ergebnisse seiner langjährigen Sammeltätigkeit in den Stand gesetzt, eine gewisse Vollständigkeit zu erreichen. Von älteren Veröffentlichungen konnten für den vorliegenden Zweck nur in Betracht kommen das Verzeichnis der im Gebiete des Aller-Vereins zwischen Helmstedt und Magdeburg aufgefundenen Käfer von Wahnschaffe, Neuhaldensleben 1883, und das Verzeichnis der Käfer Deutschlands von Schilsky, Stuttgart 1909. Das von Wahnschaffe (W.) behandelte Gebiet bleibt zwar mit seiner Ostgrenze an 20 km von Magdeburg und der Elbe entfernt, doch hat Wahnschaffe auch in der unmittelbaren Umgebung Magdeburgs gesammelt und die Funde aus dieser Gegend in Form von Anmerkungen mitveröffentlicht; wo es nötig erschien, wurden seine Angaben durch Untersuchung der Belegstücke seiner Sammlung nachgeprüft, welche im Städtischen Museum

Sorry, this page is  
unavailable to Free Members

You may continue reading on the following page



Upgrade your  
Forgotten Books Membership  
to view this page now  
with our  
**7 DAY FREE TRIAL**

[Start Free Trial](#)

unzureichend betriebenen Untersuchung ihrer Wohnungen zuzuschreiben sein dürfte, wenn gewisse Arten wie *Omalium septentrionis* Thoms.,<sup>3</sup> *Coprophilus piceus* Solsky, *Oxytelus Saulcyi* Pand., *Quedius talparum* Dev., *Oxypoda longipes* Rey, *Aleochara spadicca* Er., deren Vorkommen in benachbarten Gebieten festgestellt ist, noch nicht gefunden wurden. Die Durchforschung von Vogelnisthöhlen steht noch gänzlich aus.

Im ganzen wurden aus dem Gebiete 473 Arten und 13 Varietäten aufgeführt. Über Zeit und Ort der Funde konnten mehrfach nur unvollständige Mitteilungen gemacht werden. Ich habe früher an die Herausgabe eines Verzeichnisses nicht gedacht und bin in den Aufzeichnungen oft lässig gewesen. So wichtig übrigens solche Angaben für die Angehörigen mancher anderen Käferfamilie sind: für die Kurzflügler, die mehr oder weniger das ganze Jahr hindurch anzutreffen und deren Lebensbedingungen im allgemeinen bekannt sind, finde ich sie einigermassen entbehrlich.

Für die Mithilfe bei den Bestimmungen bin ich den Herren Dr. Bernhauer und Rektor W. Kolbe zu Dank verpflichtet, ganz besonders aber Herrn Pfarrer Hubenthal, welcher die Güte hatte, noch neuerdings zwecks Aufstellung des Verzeichnisses eine ganze Reihe von mir zweifelhaft gebliebenen Arten nachzuprüfen.

Die mitangeführten, aber nicht dem Gebiet angehörenden Arten (auch ältere irrtümliche Bestimmungen) sind durch einen vorangesetzten \* kenntlich gemacht.

Schönebeck a. E., 2. Febr. 1914.

Dr. U.

### *Staphylinidae.*

#### *Piestinae.*

#### *Prognatha* Latr.

*quadricorne* Kby. Von Wahnschaffe bei Magdeburg und Sülldorf, von Hahn bei Mgdb. unter Baumrinden mehrfach gefunden.

\**humerale* Germ. Irrtümlich für *M.* angegeben. Die Stücke der Sammlung W. gehören sämtlich zu *quadricorne*.

*Oxytelinae.**Micropeplus* Latr.

*porcatus* F. An Glasveranden gefunden. Roteshorn b. Mgdb.  
(H.), Olvenstedt (H.).

*Phloeocharis* Mannh.

*subtilissima* Mannh. Unter trockener Kiefernrinde häufig.

*Metopsia* Woll.

*clypeata* Müll. Tochheim b. Barby (H.).

*Megarthrus* Steph.

*sinuatocollis* Lac. Herrenkrug b. M. in Kompost einer Gärtnerei  
zahlreich 30. X. 08.

*denticollis* Beck. Bei Mgdb. 1 Stück anfliegend.

*Proteinus* Latr.

*brachypterus* F. In Pilzen nicht selten.

*macropterus* Gyll. Desgl. häufig.

*Anthobium* Steph.

*minutum* I. Magdeburg (H.). Plötzky.

*Acrolocha* Thoms.

*striata* Grav. Unter verwesenden Pflanzenstoffen häufig.  
Barby 6. XII. 07 auf dem Felde unter verwesenden  
Rübenblättern zahlreich.

*Phyllodrepa* Thoms.

*floralis* Payk. Überall, aber nicht gerade häufig. Auch auf  
Taubenböden und zuweilen an Fenstern angefliegen.

*melanocephala* F. Biederitzer Busch (Paul Breddin), Toch-  
heim bei *Lasius fuliginosus* (H.). Plötzky.

*ioptera* Steph. Nicht selten. Olvenstedt (H.), Bied. Busch,  
Kreuzhorst in Baumpilzen 21. IX. 13.

*Omalius* Grav.

*rivulare* Payk. Überall sehr häufig.

*caesum* Grav. Nicht selten.

*Phloeonomus* Heer.

*planus* Payk. Herrenkrug unter Nadelholzrinde (H.).

*lapponicus* Zett. Möser unter Kiefernrinde einzeln.

*pusillus* Grav. Unter Kiefernrinde sehr häufig.

*Xylodromus* Heer.

*concinus* Marsh. Häufig.



*depressus* Grav. Roteshorn (H.), Sülldorf.

*testaceus* Er. Unter Laub stellenweise nicht selten. Bied. Busch, Wolmirstedt.

*Orochares* Kr.

*angustata* Er. Schönebeck 1 Stück am Hause, Januar 1913.

*Lathrimaeum* Er.

*atrocephalum* Gyll. Häufig. Bied. Busch, Schönebeck, Wolmirstedt.

*Olophrum* Er.

\**piceum* Gyll. Von Reinecke bei Neuahaldensleben, 24 km von Magdeburg, an laufenden Baumstüken gefunden.

*assimile* Payk., An feuchten Stellen unter verwesendem Schilfe, nicht häufig. Dodendorf (H.), Bied. Busch, Sülldorf.

*Arpedium* Er.

*quadrum* Grav. Lebt in Sümpfen an Waldrändern und ist schon im Januar bei mildem Wetter auf dem Eise zu bemerken. Am 14. II. 08 fand ich das Tier gegen Mittag in großer Zahl über einem Sumpfe im Sonnenschein fliegend. In manchen Jahren stellenweise sehr häufig, in anderen anscheinend fehlend. Bied. Busch, Kreuzhorst.

*Acidota* Mannh.

*crenata* F. Möser unter Moos 1 Stück 13. IX. 08.

*Lesteva* Latr.

*longelytrata* Goeze. Bied. Busch (H.). — Seehausen Kr. Wanzleben (H.).

*punctata* Er. Lostau 18. V. 86 zahlreich an Quellwasser (H.).

*Anthophagus* Grav.

\**abbreviatus* F. Im Gebiete nicht gefunden. — Hakelforst, 35 km von Mgdb. 2 Stck. 30. VI. 09 (Manzek).

*caraboides* L. Herrenkrug (H.), Kalenberge 1 Stück von Gebüsch geklopft 12. IX. 10.

*praeustus* Müll. Sülldorf 1 Stück 12. IX. 07 (Manzek).

*Deleaster* Er.

*dichrous* Grav. Bei Magd. zuweilen abends in Menge schwärmend (H.), Bied. Busch mehrfach (Pohl).

*Coprophilus* Latr.

*striatulus* F. Im Frühjahr nicht selten. Im Bied. Busch öfter unter saftfeuchten Eichholzspähnen gefunden.

*Acrognathus* Er.

*mandibularis* Gyll. Nicht selten. Herrenkrug (H.), Barby (H.), Tochheim (H.), Schönebecker Busch, Grünwalde, Plötzky. An Sumpfrändern gegen Abend vom Grase zu streichen. Mai und Oktober.

*Planeustomus* Duv.

*palpalis* Er. Mgdb. unter einem Steine im Garten (H.), Zackmünde bei Schönebeck gegen Abend anfliegend (H.).

*Thinobius* Kiesw.

*brunneipennis* Kr. An der Elbe bei Mgdb. (W., H.)

*longipennis* Heer. Alte Elbe bei M. (H.), an der Elbe beim Schönebecker Busch 1 Stück 15. VIII. 09.

*atomus* Fauv. Magdeburg. Rothensee, Schönebeck. An beiden Ufern der Elbe nicht selten (Best. Hbth.).

*brevipennis* Kiesw. An der Elbe bei Magdeburg (W.).

Die *Thinobius* scheinen nicht selten, werden aber wegen ihrer Kleinheit leicht übersehen. Im Gesiebe habe ich sie nie gefunden, wahrscheinlich überstehen die zarten Tiere das Sieben nicht. Unter dem gröberem Flussauswurfe sind sie auch nicht zu entdecken. Wo die Elbe aber beim Zurücktreten einen Rand von feinem Schmutze hinterlassen hat, siedeln sie sich unter diesem Überzuge an und können hier bei aufmerksamem Nachsuchen gefunden werden. Man schabt den Schmutz samt einer dünnen Schicht des darunter liegenden feinen Sandes mit einem Löffel ab und wirft die Masse auf einem weissen Tuche auseinander. Dabei muß man gut aufpassen, denn die Käfer sind schwer zu sehen und fliegen gerne fort. Auch unter Blättern, die sich platt auf den feuchten Ufersand gelagert haben, kann man die Tierchen entdecken. Schönwetter und namentlich Windstille dürften Vorbedingungen für erfolgreiche Suche sein, ferner ist Geduld vonnöten, denn man kann unter Umständen stundenlang vergeblich suchen. Ich fand die Tiere im August, doch werden sie wohl während der ganzen warmen Jahreszeit zu erbeuten sein.

*Trogophloeus* Mannh.

*bilineatus* Steph. An der Elbe häufig.

*rivularis* Motsch. Nicht selten.

*memnonius* Er. Weniger häufig. Magdeburg 07, Kreuzhorst  
4 Stek. 17. IV. 08, Sülldorf 2 Stek. 4. X. 08.

*fuliginosus* Grav. Herrenkrug in Kompost 2 Stek. 30. X. 08,  
Schönebeck 1 Stück Mai 09 (Bestimmung Hbth.).

*elongatulus* Er. Nicht sehr häufig.

*corticinus* Grav. Häufigste Art.

*halophilus* Kiesw. Bei Mgdb. und Schönebeck mehrfach ge-  
funden, doch nur einzeln (Best. Hbth.).

*pusillus* Grav. Magdeburg mehrfach (H.), Schönebeck 2 Stek.  
August und September 09 (Best. Hbth.).

*gracilis* Mannh. An der Elbe nicht selten, aber wegen seiner  
Kleinheit schwer zu bemerken. Ich fand ihn wieder-  
holt unter halbtrockenen Schlammstückchen, auch unter  
fest dem Ufersande aufliegenden Blättern und zwischen  
den Halmen einzeln stehender Grasbüschel. Gegen abend  
fliegend.

*exiguus* Er. Magdeburg 1 Stück (Best. Hbth.).

*Haploderus* Steph.

*caelatus* Grav. Nicht selten.

*Oxytelus* Grav.

*rugosus* F. Sehr häufig.<sup>1)</sup>

*rugifrons* Hochh. Magdeburg (Pohl), Tochheim (II.).

*insecatus* Grav. Nicht selten, im Frühjahr oft in Gärten.

*piceus* L. Magdeburg (H.).

*sculptus* Grav. Sülldorf (W.). — Westeregeln 18. X. 09 und  
24. IV. 11 (Manzek).

*inustus* Grav. Nicht gerade häufig, aber einzeln überall zu finden.

*sculpturatus* Grav. Nicht selten.

*nitidulus* Grav. Sehr häufig.

*tetracarinatus* Block. Sehr häufig.

*Platystethus* Mannh.

*arenarius* Geoffr. Nicht selten.

<sup>1)</sup> Auch die von W. für *opacus* Kr. gehaltenen Stücke gehören  
hierher. Das Vorkommen von *opacus* im Allergebiete ist nicht erwiesen.

\**laevis* Kiesw. Nicht gefunden. Die von W. zu dieser Art gerechneten Stücke sind *nitens*.

*cornutus* Grav. An Ufern stellenweise sehr häufig.

*capito* Heer. Mgdb. (W.), Schönebeck 1 Stück 17. IV. 08.

*nitens* Sahlb. Nicht selten. Mgdb., Schönebeck, Mühlinger Berge.

#### *Bledius* Mannh.

*furcatus* Ol. Bei Sülldorf sehr häufig.

v. *Skrimshiramus* Curt. Dasselbst häufig.

*tricornis* Hbst. Sülze bei Mgdb. Neustadt (Feuerstacke), Sülldorf (II.). Am Gradierwerke des Bades Elmen bei Schönebeck häufig.

*unicornis* Germ. Sülldorf (Feuerst., H.). Bad Elmen sehr häufig.

*bicornis* Germ. Sülldorf (H.).

*pallipes* Grav. An der Elbe bei Magedburg (H.).

*longulus* Er. Sülldorf 4. X. 96 (Pohl).

*opacus* Block. Mühlinger Berge 1 Stück 7. IX. 09.

v. *sinuatocollis* Gerh. Schönebecker Busch 1 Stück anfliegend (Bestimmung Hbth.).

*atricapillus* Germ. Sülldorf (H.), Mgdb. Neustadt in dünnen Tonschichten einer Kiesgrube zahlreich (Feuerstacke).

v. *nanus* Er. Vereinzelt mit vorigem 25. VI. 96 (F.).

*fracticornis* Payk. Mgdb. (H.), Mühligen (H.), Schönebecker Busch 1 Stück anfliegend 22. IV. 11.

*erraticus* Er. Schnarslebener Berge häufig (H.).

*pygmaeus* Er. Gleichfalls bei Schnarsleben (II.).

*subterraneus* Er. An der Elbe häufig.

#### *Oxyporinae.*

##### *Oxyporus* Fbr.

*rufus* L. In Pilzen nicht selten. Mgdb. Neustadt (Pohl), Rogätz (Pohl), Ronney (II.), Barby (H.), Tochheim 18. VII. 09.

*maxillosus* F. Herrenkrug August 98 (Pohl).

#### *Steninae.*

##### *Stenus* Latr.

*biguttatus* L. Häufig.

*bipunctatus* Er. Gleichfalls häufig.

*guttula* Müll. Von Wahnschaffe für Magedburg angegeben. Nicht in Sammlung W.

*bimaculatus* Gyll. Sehr häufig.

*Juno* Payk. An stehendem Wasser sehr häufig.

*ater* Mannh. Weniger häufig. Elbenau bei gelben Ameisen  
1 Stück 11. IX. 09.

*calcaratus* Scriba gehört mit zu den häufigsten Arten und  
ist an Rinnsalen in der Nähe der Elbe überall zu finden.  
Im ersten Frühjahr unter Laub am Fusse alter Eichen in  
der Kreuzhörst mit anderen Arten zusammen oft in Menge.

*clavicornis* Scop. Sehr häufig.

*providus* Er. Schönebeck 17. X. 09 ein ♂.

*scrutator* Er. Bei Mgdb. 1 ♂ (Best. Hbth.).

*silvester* Er. Nicht selten.

*aterrimus* Er. In der Klus bei *Formica rufa* (H.).

*palposus* Zett. Rothensee am Wasser in einer Kiesgrube  
27. VIII. 13 (Feuerstacke), einzeln bei Mgdb. und  
Schönebeck.

*bupthalmus* Grav. Überall an Ufern, wohl die häufigste Art.

*canaliculatus* Gyll. Roteshorn Juni 08 (H.), Herrenkrug 3 Stck.  
einzeln zu verschiedenen Zeiten, Schönebeck.

*morio* Grav. Nicht selten.

*melanarius* Steph. Häufig.

*melanopus* Mrsh. Sülldorf (W., H.).

*incanus* Er. Magdeburg, mehrfach gefunden.

*pusillus* Steph. Möser 2 Stck. 13. IX. 08, Schönebeck 1 Stck.  
Mai 1910.

*circularis* Grav. Magdeburg 1 Stück 05.

*fuscipes* Grav. Sehr häufig.

*Argus* Grav. Häufig.

*humilis* Er. Nicht selten.

*carbonarius* Gyll. Gleichfalls nicht selten.

*nigritulus* Gyll. Ebenso.

*latifrons* Er. Häufig.

*tarsalis* Lj. Sülldorf (W.). — Erxleben (Reinecke).

*similis* Hbst. Sohlener Berge 1 ♀ 16. X. 10., Schönebeck 1 ♀  
1913. — Erxleben 1 ♀ (Reinecke).

Vorbringer (D. E. Z. 1909. 640) berichtet, dafs er unter  
vielen Hunderten des in Ostpreussen häufigen Käfers kein  
Männchen gefunden habe. Gerhardt (D. E. Z. 1911, 340)  
fand die ♂ zwar häufiger, aber immer noch selten genug:

Sorry, this page is  
unavailable to Free Members

You may continue reading on the following page



Upgrade your  
Forgotten Books Membership  
to view this page now  
with our  
**7 DAY FREE TRIAL**

[Start Free Trial](#)

*picipes* Steph. Schönebecker Busch 1 Stück 3. VI. 13.

*nitidiusculus* Steph. Lostau im Erlengebüsch in Anzahl  
19. V. 86. (H.).

*flavipes* Steph. Mgdb. mehrfach (W.), Altefähre Okt. 1910,  
Schönebecker Busch 22. IV. 12. In Wäldern vom Grase  
zu streifen.

*palustris* Er. Magdeburg 1 Stück 05 (Best. Hbth.).

*impressus* Er. Möser 1 Stück 13. IX. 08.

*Erichsoni* Rye. Häufig in Eichenwäldern unter Laub.

*pallipes* Grav. Gleichfalls in Wäldern, aber nicht häufig.  
Bied. Busch 2. III. 08, Grizehne b. Calbe a. S. 5. III. 08,  
Elbenau 20. III. 10 je 1 Stück.

#### *Dianous* Sam.

*coerulescens* Gyll. Woltersdorf am Mühlenwehr Juli 85 und  
6. VI. 86 (H.). — Alvensleben 15. VI. 89 (H.).

#### *Euaesthetinae.*

##### *Euaesthetus* Grav.

*bipunctatus* Lj. Im Frühjahr an sumpfigen Orten nicht selten.

*ruficapillus* Lac. Ebenso.

*laeviusculus* Mannh. Magdeburg 1 Stück.

#### *Paederinae.*

##### *Astenus* Steph.

*angustatus* Payk. Ziemlich häufig.

##### *Paederus* Fbr.

*riparius* L. Mgdb. — Westeregeln (Manzek).

*fuscipes* Curt. Häufig, Mgdb., Calbe a. S., Schönebeck.

*litoralis* Grav. Überall häufig.

##### *Stilicus* Serv.

*angustatus* Geoffr. An der Elbe bei Mgdb. (H.).

*subtilis* Er. Magdeburg (H.).

*rufipes* Germ. Häufig.

*similis* Er. Nicht häufig. Mgdb. (W.), Sülldorf (W.). Eggers-  
dorf 25. III. 10, Sohlener Berge 16. X. 10 je 1 Stück.

*orbiculatus* Payk. Nicht selten.

*Eichsoni* Fauv. Nur einzeln gefunden. Möser 3. V. 08 und  
13. IX. 08, Elbenau 27. III. 10.

*Scopaeus* Kr.

*minimus* Er. Magdeburg 1907 (Best. Bernh.).

\**gracilis* Sperk. Nicht gefunden. Die Stücke der Sammlung W. waren *laevigatus* (Best. Hbth.).

*laevigatus* Gyll. Im Angeschwemnten der Elbe nicht selten.

*Lithocharis* Lac.

*ochracea* Grav. Sülldorf (W.), M. Nordfriedhof 1 Stück 2. V. 08.

*Medon* Steph.

*castaneus* Grav. Mgdb. mehrfach unter Steinen bei *Lasius flavus* (H.).

*fuscus* Mannh. Sülldorf (W.), Roteshorn 4. V. 08 (H.), Zenser Berge (H.).

\**rufiventris* Nordm. Nicht aufgefunden. Das von W. für diese Art gehaltene Stück aus Sülldorf gehört zu *fuscus*.  
*bicolor* Ol. Mühlingener Berge 4. IX. 09 und Eggersdorf 25. III. 10 je 1 Stück (Best. Hbth.).

*melanocephalus* F. Überall in einzelnen Stücken zu finden.

*obsoletus* Nordm. Magdeburg 2 Stück, Grünewalde 9. III. 13 und Plötzky 24. III. 13 je 1 Stück.

*Lathrobium* Grav.

*quadratum* Payk. An sumpfigen Ufern häufig.

*terminatum* Grav. Mit vorigem, nicht selten.

*elongatum* L. Häufig.

*geminum* Kr. Nicht selten.

*laevipenne* Heer. Schönebeck 1 Stück 12. IX. 09 (Best. Hbth.).

*fulvipenne* Grav. Nicht selten.

var. *Letzneri* Gerh. Häufig.

*brunnipes* F. Nicht selten.

v. *luteipes* Fauv. Roteshorn 10. IV. 10. (H.), Herrenkrug 2. III. 08.

*fovulum* Steph. Elbe bei Mgdb. (W.), Bied. Busch (H.), Herrenkrug 2. III. 08, Kreuzhorst 8. III. 08.

*filiforme* Grav. Überall sehr häufig.

*longulum* Grav. Mit vorigem, sehr häufig.

*pallidum* Nordm. Bei Mgdb. und Schönebeck in Hamsterbauen einzeln gefunden. September.

*Achenium* Curt.

\**depressum* Grav. Nicht nachgewiesen, in der Sammlung W. nur die folgende Art.



*humile* Nic. Elbe beim Herrenkrug, Kreuzhorst 6. IV. 13.  
Nur einzeln. — Westeregeln 12. V. 12 (Manzek).

*Cryptobium* Mannh.

*fracticorne* Payk. An Ufern überall.

*Staphylininae.*

*Leptacinus* Er.

*bathychrus* Gyll. Herrenkrug in Kompost 2 Stek. 30. X. 08.

*formicetorum* Märk. Rogätz (II.), Tochheim 17. VII. 10.

*Xantholinus* L.

*punctulatus* Payk. Häufig.

*angustatus* Steph. Häufig. Ein Stück im Winterschlaf in der  
Wurzel von *Artemisia vulgaris* zusammengerollt gefunden  
19. III. 11.

*glabratus* Grav. In Mgdb. auf dem Wochenmarkte gefunden  
(H.). — Bei Eilsleben (H.).

*glaber* Nordm. Zenser Berge 12. IV. 87 (H.), Mgdb., Eggers-  
dorf 12. IV. 09.

*tricolor* F. Mgdb. mehrfach, auch bei Sülldorf (H.).

*procerus* Er. Hierher gehört nach frdl. Mitteilung des Herrn  
Prof. H. Kolbe ein im Kgl. Zool. Museum in Berlin be-  
findliches Stück, welches W. im Elbangerölle bei Magde-  
burg gefunden und in seinem Verzeichnisse als „*X. elegans*  
Oliv. (nicht die *var. elegans* Grav. des *X. tricolor* F.)“  
aufgeführt hat.

*linearis* Ol. Überall häufig, im ersten Frühjahr oft auf  
Wegen laufend.

*v. longiventris* Heer. Mgdb. (H.), Grünewalde auf dem Elb-  
damme mehrfach.

*Baptolinus* Kr.

*affinis* Payk. Mgdb. (1 Stück in Sammlung W.), Tochheim  
18. VII. 09. — Hohes Holz b. Eggenstedt (H.), Erxleben  
(Reinecke).

*Othius* Steph.

*punctulatus* Goeze. Biederitzer Busch 1 Stück 10. V. 08.

*myrmecophilus* Kiesw. Wahlitz 6. VI. 06 (H.), Möfer 14. II. 08.

*Actobius* Fauv.

*cinerascens* Grav. Nicht selten. Mgdb., Schönebeck, Plötzky.

*signaticornis* Rey. Sülldorf (1 Stück in Samml. W.).

*Neobisnius* Ganglb.

- villosulus* Steph. Mgdb. 5. VII. 08, Schönebeck Mai 09.  
*procerulus* Grav. Mgdb. (H.), Schönebeck Mai 09, Eggersdorf 25. III. 10.  
*v. prolixus* Er. Mgdb. und Sülldorf (W.), Mgdb. 1 Stück 05.

*Philonthus* Steph.

- \**splendens* F. Nur bei Bischofswalde 35 km von M. gefunden (H.).  
*intermedius* Lac. Magdeburg (H.).  
*laminatus* Creutz. Magdeburg (H.).  
*aeneus* Rossi. Mgdb., Herrenkrug, Barby (H.).  
*chalceus* Steph. Bei Mgdb. und Schönebeck nicht selten.  
*carbonarius* Gyll. Ziemlich häufig. 10. V. 08 im Bied. Busch 8 Stück gefunden.  
*atratus* Grav. An der Elbe häufig auf feuchtem Schlamm laufend, dabei den Hinterleib aufgekümmert tragend.  
*rotundicollis* Mén. Sülldorf (H. Best. Reitter). — Westeregeln mehrfach (Manzek).  
*ebeninus* Grav. Ziemlich häufig (H.).  
*coruscus* Grav. Magdeburg (W., H.).  
*concinus* Grav. Häufig.  
*sanguinolentus* Grav. Nicht häufig. Bied. Busch.  
*immundus* Gyll. Bei M. nicht selten (H.).  
*debilis* Grav. Nicht selten, doch nur einzeln.  
*decorus* Grav. Bied. Busch unter Laub mehrfach.  
*fuscipennis* Mannh. Sehr häufig.  
*varius* Gyll. Gleichfalls häufig.  
*lepidus* Grav. Magdeburg (H.).  
*varians* Payk. Nicht selten.  
*v. agilis* Grav. Sülldorf (H.).  
*fimetarius* Grav. Häufig unter Laub.  
*cephalotes* Grav. Schönebeck 1 ♂ Sept. 1913.  
*sordidus* Grav. Roteshorn 10. IV. 10 (H.), Herrenkrug in Kompost 2 Stck. 30. X. 08. — Westeregeln (Manzek).  
*spermophili* Ganglb. Häufig in Maulwurfsnestern.  
*Scribae* Fauv. Mgdb. Nordfriedhof (H.), Schnarsleben (H.), Mgdb. Neustadt (Pohl). In Hamsterbauen häufig.  
*fuscus* Grav. Barby (H.),  
*umbratilis* Grav. Bied. Busch 1 Stück 1907.

- ventralis* Grav. Schönebeck 2 Stück.  
*discoideus* Grav. Herrenkrug in Kompost 2 Stck. 30. X. 08. —  
 Westeregeln 5. VIII. 09 (Manzek).  
*quisquiliarius* Gyll. An der Elbe häufig.  
*v. inquinatus* Steph. Bied. Busch 2 Stück 07.  
*fumarius* Grav. Mgdb. 05, Schönebecker Busch 21. III. 13. —  
 Eilsleben 2 Stück 07.  
*micans* Grav. Sehr häufig.  
*fulvipes* F. Kreuzhorst 1 Stück 7. VIII. 10, Schönebecker  
 Busch 7. VI. 13.  
*salinus* Kiesw. Sülldorf (H.), Mgdb. Zuwachs 05.  
*puella* Nordm. Nach Hahn beim Herrenkrug gefunden.  
*punctus* Grav. An der Elbe, nicht häufig.  
*tenuis* F. Herrenkrug mehrfach 11. IX. 90 (H.).  
*vernalis* Grav. Bei M. und Schö. nicht selten.  
*astutus* Er. Magdeburg (W.).  
*nigritulus* Grav. Sehr häufig.  
*v. trossulus* Nordm. Mgdb. (H.), Sülldorf (H.).  
*splendidulus* Grav. Untsr Kiefernrinde häufig.

### *Staphylinus* L.

- stercorarius* Ol. Mgdb. (H.), Salze (H.), Tochheim (H.).  
 Ronney 18. VII. 09.  
*chalcocephalus* F. Mgdb. Markt (H.), Rogätz 26. V. 07 (Pohl).  
*caesareus* Cederh. Nicht selten.  
*erythropterus* L. Nicht selten.  
*olens* Müll. Wahlitz (H.), Tochheim 18. VII. 09.  
*ophthalmicus* Scop. Im Frühjahr auf Wegen nicht selten.  
*similis* F. Wie voriger.  
*brunnipes* F. Auch nicht selten.  
*fuscatus* Grav. Bei M. und Schö. recht häufig.  
*picipennis* F. Schönebeck Okt. 09.  
*aeneocephalus* Deg. Häufig. Mgdb., Möser, Schönebeck, Sülldorf.  
*fulvipennis* Er. Schönebeck Okt. 09, Okt. 13 und Dez. 13  
 je 1 Stück auf dem Wege, ein weiteres 7. III. 14.  
*pedator* Grav. Biederitz April 08 (Pohl).  
*ater* Grav. Sülldorf (H., P. Breddin). — Westeregeln 17. VI. 11  
 (Manzek).  
*globulifer* Geoffr. Nicht selten.

*Ontholestes* Ganglb.

*tessellatus* Geoffr. Nicht selten.

*murinus* L. Nicht selten.

*Emus* Curt.

*hirtus* L. Magdeburg von P. Breddin in einem Ziegenstalle gefunden (nach H.).

*Creophilus* Mannh.

*maxillosus* L. Überall an größeren Äsern besonders in der Nähe von Waldungen (H.), Eggersdorf Sept. 10.

*Quedius* Steph.

*longicornis* Kr. Magdeburg (H.).

*brevis* Er. Rogätz (H.),

*lateralis* Grav. Neustädter Feld (Pohl), Möser (Pohl), Bied. Busch. — Hillersleben (H.).

*vexans* Epp. Beim Hamster sehr häufig. Auch wiederholt auf freiem Felde in der Nähe der Baue bemerk.

*ochripennis* Mén. Mit *vexans* zusammen beim Hamster. Bei Möser unter am Boden liegenden Kiefernrinde, bei Calbe a. S. im Mulme alter Kirschbäume gefunden.

*ventralis* Arag. Roteshorn bei M. 3 Stück Sept. 1911 (H.). Diese Art scheint durchaus verbreitet, führt aber ein derart verborgenes Leben, daß sie wenig gefunden wird und als Seltenheit gilt. In der Sammlung W. befinden sich 2 Stücke aus Weferlingen, 2 andere stammen aus einer hohlen, mit *Lasius fuliginosus* besetzten alten Schwarzpappel von Graditz bei Torgau. Ich fing im Juni 1890 ein Stück im Strausberger Walde bei Berlin.

*mesomelinus* Mrsh. Roteshorn 26. IX, 08 (H.), Sülldorf (H.). Herrenkrug in Kompost 30. X. 08.

*maurus* Sahlb. Bied. Busch 1 ♂ 10. V. 08 (Best. Hbth.).

*scitus* Grav. Mgdb. 1906 unter Rinde, Bied. Busch 2 Stck. 10. V. 08.

*cinctus* Payk. Herrenkrug, Bied. Busch nicht selten.

*laevigatus* Gyll. Magdeburg 1 Stück 1905.

*fuliginosus* Grav. Unter Laub nicht selten.

*molochinus* Grav. Schönebeck 17. X. 09.

*umbrinus* Er. Nicht häufig. Bied. Busch 10. V. 08.

*nigriceps* Kr. Bied. Busch, Möser. Mehrfach gefunden.

*obliteratus* Er. Lostau häufig (H.), Herrenkrug, Wolmirstedt  
Möser.

*maurorufus* Grav. Sülldorf (W., H.).

*scintillans* Grav. Herrenkrug zahlreich in Kompost 30. X. 08,  
Kreuzhorst.

*picipennis* Heer. Lostau (H.), Bied. Busch, Kreuzhorst 8. III. 08.

*boops* Grav. Bied. Busch 12. IV. 08, Möser 13. IX. 08,  
Herrenkrug 30. X. 08. Auch bei Schönebeck.

*Velleius* Mannh.

*dilatatus* F. Früher zahlreich in Dodendorf (W.), Herren-  
krug 1895 (H.).

*Heterothops* Steph.

*praevia* Er. In Maulwurfsnestern häufig.

*dissimilis* Grav. Nicht selten gesiebt. Herrenkrug, Barleben,  
Schönebeck.

*quadripunctula* Grav. An der Elbe häufig.

*Tachyporinae.*

*Mycetoporus* Mannh.

*splendidus* Grav. Unter Laub, Gras, Schilf häufig.

*Baudueri* Rey. Schönebecker Busch 1 Stück 27. IX. 13  
(Manzek). Calbe a. S., Schönebeck, Zens. Im Sept. und  
Okt. 1914 nicht selten vom Gras gestreift.

*brunneus* Marsh. Desgl., weniger häufig.

*longulus* Mannh. Schönebeck 1 Stück Mai 1910.

*clavicornis* Steph. Möser 3 Stck. unter Moos 13. IX. 08.

*splendens* Marsh. Magdeburg (H.), Sülldorf (H.).

*rufescens* Steph. Magdeburg (Reinicke nach W.). — Dön-  
stedt 1 Stück 23. IV. 08.

*punctus* Gyll. Klappermühle bei Woltersdorf (H.).

*Bryoporus* Kr.

*cernuus* Grav. Bied. Busch zahlreich an Eichenschwämmen  
(W.). — Wellenberge bei Dönstedt (H.).

*Bolitobius* Mannh.

*striatus* Ol. Stellenweise in Pilzen sehr häufig. Kreuzhorst,  
Grünwalde.

\**trinotatus* Er. Bisher nur Dönstedt, 22 km von Mgdb.,  
2 Stück 23. IV. 08.

*exoletus* Er. Roteshorn 26. IX. 07 (H.).

Sorry, this page is  
unavailable to Free Members

You may continue reading on the following page



Upgrade your  
Forgotten Books Membership  
to view this page now  
with our  
**7 DAY FREE TRIAL**

[Start Free Trial](#)

*Tachinus* Grav.

*flavipes* F. Roteshorn (H.), Sülldorf (H.), Bied. Busch häufig.

*subterraneus* L. Möser (H.). — Hohes Holz bei Eggenstedt (H.)

*v. bicolor* Grav. Bied. Busch an Baumsaft 7. V. 08.

*bipustulatus* F. Magdeburg (Pohl).

*fimetarius* Grav. Nicht selten.

*rufipes* Deg. Häufig.

*collaris* Grav. Ziemlich häufig. Bied. Busch, Wolmirstedt, Schönebeck.

*Leucoparyphus* Kr.

*silphoides* L. In Dünger nicht selten.

*Hypocyptus* Mannh.

*longicornis* Payk. Nicht selten. Auch von Gebüsch zu klopfen.

*laeviusculus* Mannh. Sülldorf (1 Stück in Sammlung W., Best. Hbth.).

*Habrocerus* Er.

*capillaricornis* Grav. Nicht häufig. Bei Möser unter schimmeligem Holze zahlreich 12. IX. 08.

*Aleocharinae.**Dinopsis* Matth.

*erosa* Steph. Am Rande von Gewässern nicht selten. Zuwachs bei M., Kreuzhorst, Grünewalde.

*Gymnusa* Grav.

*brevicollis* Payk. Grünewalde am Rande eines Sumpfes vom Grase gestreift.

*Myllaena* Er.

*dubia* Grav. Magdeburg. — Erxleben (Reinecke).

*intermedia* Er. Überall an feuchten Stellen zu sieben.

*brevicornis* Matth. Magdeburg, nicht häufig.

*minuta* Grav. Überall häufig.

*infuscata* Kr. Schönebeck 1 Stück 27. II. 10.

*Pronomaea* Er.

*rostrata* Er. Bied. Busch (H.), Möser 13. IX. 08, Schönebeck 27. II. 10.

*Hygronoma* Er.

*dimidiata* Grav. An schilfigen Ufern häufig.

*Oligota* Mannh.

- atomaria* Er. Kreuzhorst am Fufse von einzeln stehenden  
Bäumen häufig 10. X. 09 (Best. Hbth.).  
*pusillima* Grav. Nicht selten.

*Gyrophæna* Mannh.

- pulchella* Heer. Ramstedt 4. X. 13 (Manzek).  
*affinis* Sahlb. In Pilzen häufig.  
*nana* Payk. Desgl. häufig.  
*fasciata* Marsh. Häufig.  
*laevipennis* Kr. Kreuzhorst 1 ♂ 18. IX. 10.  
*lucidula* Er. Häufig.  
*minima* Er. Von W. für Mgdb. angegeben. War nicht nach-  
zuweisen.  
*manca* Er. Häufig.  
*strictula* Er. Schönebeck 25. IV. 09.  
*boleti* L. Mgdb. in Rüsternschwämmen (H.).

*Thectura* Th.

- cuspidata* Er. Unter Baumrinde nicht selten.

*Silusa* Er.

- rubiginosa* Er. An Baumsaft nicht selten. Roteshorn (H.),  
Sülldorf (Manzek), Schönebeck, Kreuzhorst an Rüstern,  
Calbe a. S. an Rofskastanien. — Auch im Hakelforst  
(Manzek).

*Euryusa* Er.

- castanoptera* Kr. Nach Hahn bei Tochheim unter Ameisen  
gefunden. Das Stück scheint verloren.  
*optabilis* Heer. M. Neustadt im Garten (Pohl). Sülze bei  
Barleben 25. II. 08, Kreuzhorst unter Rinde bei Ameisen.  
— In Aschersleben auf dem alten Friedhofe unter Ahorn-  
rinde bei *Lasius brunneus* nicht selten, Aug. 09.

*Bolitochara* Mannh.

- lunulata* Payk. Tochheim (H.), Möser in Pilzen häufig.  
*bella* Märk. Bei Schönebeck gefunden. — Marienborn bei  
Helmstedt 20. VII. 08.

*Autalia* Mannh.

- impressa* Ol. In Pilzen häufig.



*Falagria* Mannh.

*sulcata* Payk. Unter Laub usw. häufig.

*sulcatula* Grav. Magdeburg 25, II. 08.

*thoracica* Curt. M. Nordfriedhof (H.), Barby auf einem Hofe unter Ziegelsteinen zahlreich (H.), Calbe a. S. zwischen Ameisen auf dem Wege laufend 6. VIII. 08.

*nigra* Grav. Zenser Berge (H.), Tochheim (H.).

*obscura* Grav. Häufig.

*Tachyusa* Er.

*atra* Grav. Überall auf Schlamm häufig.

*leucopus* Marsh. Nicht selten, auf Schlamm.

*umbratica* Er. Ebenso.

\**scitula* Er, Nicht im Gebiete gefunden. Die beiden von Magdeburg stammenden Stücke der Sammlung W. waren *Calodera uliginosa* (Best. Hbth.).

*coarctata* Er. Auf Schlamm häufig.

*constricta* Er. Magdeburg (H.).

*Gnypeta* Thoms.

*carbonaria* Mannh. An Ufern, nicht häufig.

*velata* Er. An der Elbe überall sehr häufig, gern im Sonnenscheine auf feuchtem Schlamme laufend. Man fängt die flinken Tiere, wie auch die anderen Schlammfläufer, am besten, indem man sie mit Hilfe eines Löffels auf ein ausgebreitetes Tuch wirft.

*Brachyusa* Rey.

*concolor* Er. Gleichfalls auf Schlamm zu finden, nicht selten.

*Aleuonota* Thoms.

*atricapilla* Rey. An der Elbe bei Schönebeck 1 Stück 20. V. 09 (Best. Hbth.).

*gracilentata* Er. Schönebecker Busch 1 Stück 22. IV. 11 (Best. Hbth.).

*Atheta* Thoms.

*longula* Heer. An der Elbe bei M. 28. VII. 08, Schönebecker Busch im feinen Elbsande 7. VIII. 09 (Best. Hbth.).

*fragilis* Kr. Bei Magdeburg 1 Stück (Best. Hbth.).

*luteipes* Er. Magdb. mehrfach z. B. 2. III. 08.

*gregaria* Er. Im Angeschwemmten der Elbe sehr häufig.

- cambrica* Woll. An der Elbe bei M. wiederholt gefunden (Best. Bernh.).
- languida* Er. M. und Schö. im Frühjahr nicht selten.
- v. longicollis* Rey. Ebenso. 29. II. 08, 8. III. 08, 9. III. 08, 17. IV. 08.
- luridipennis* Mannh. Roteshorn (H.), Sülldorf (H.), Magdeburg, Schönebeck 17. V. 09.
- terminalis* Grav. Bei M. und Schö., nicht häufig. 20. III. 08, 29. III. 08, 17. IV. 08, 28. VII. 08.
- melanocera* Thoms. Diese im Ansehen recht veränderliche Art ist häufig. Einmal fand ich sie zu Hunderten an einem in einer eingetrockneten Pfütze liegenden Baumzweige (Herrenkrug 2. III. 08).
- sequanica* Bris. Überall an der Elbe unter Steinen usw. zu finden. Rothensee Juli 08 in großer Zahl unter dem Algenüberzuge eines eingetrockneten Tümpels in der Nähe der Elbe.
- elongatula* Grav. Häufig.
- gemina* Er. Mehrfach bei M. gefunden.
- meridionalis* Rey. Sülldorf 1 Stück 4. X. 08 (Best. Hbth.).
- debilis* Er. Magdeburg (H.), Herrenkrug mehrfach.
- vilis* Er. Mgdb. 2 Stück (Best. Hbth.).
- angustula* Gyll. Im Angeschwemmten der Elbe häufig.
- aequata* Er. Unter Eichenrinde häufig.
- linearis* Grav. Auch unter Rinde, seltener.
- nigella* Er. Nicht häufig. Mgdb., Schönebeck.
- incana* Er. Überall an schilfigen Ufern. Der Käfer lebt, wie schon Wahnschaffe angibt, in den verlassenen Gängen der Nonagrienraupen. Im Winter am Ufer unter Blättern.
- brunnea* F. M. und Schö., nicht häufig. Einmal gegen Abend vom Grase gestreift.
- hepatica* Er. Tochheim 1 Stück (H., Best. Hbth.).
- occulta* Er. Bied. Busch 1 Stück 11. X. 08, Herrenkrug in Kompost 1 Stück 30. X. 08.
- corvina* Thoms. Bei M. nicht selten. Bied. Busch in Pilzen 11. X. 08.
- picipes* Thoms. M. auf Taubenschlag 1. X. 08 (Feuerstacke), Kreuzhorst 1 Stück 6. III. 10.
- angusticollis* Thoms. Mgdb. 20. IX. 08, Bied. Busch 27. IX. 08, Barby 24. IV. 09.

- ravilla* Er. Bied. Busch in Pilzen nicht selten, z. B. 27. IX. 08 (Best. Hbth., W. Kolbe). Reitter, *Fauna germanica*, sagt von dieser Art: „Bei uns nicht sicher nachgewiesen. Was dafür angesehen wurde (*ravilla* Kr.), ist das ♂ von *angusticollis*.“ Bei den ♂ meiner Stücke ist das Endglied der Fühler fast so lang wie die drei vorhergehenden Glieder zusammen, also wie es bei *ravilla* Er sein soll.
- palustris* Kiesw. Sehr häufig.
- inquinula* Grav. An trockenem Miste nicht selten.
- amicula* Steph. Häufig.
- subtilis* Scriba. M. Nordfriedhof 1 Stück 15. IV. 08 (Best. Hbth.).
- dilaticornis* Kr. In Sammlung W. 3 Stck. aus Sülldorf (Best. Hbth.).
- clancula* Er. Magdeburg (H.), bei Mgdb. 2 Stck. (Best. Bernh.).
- divisa* Märk. Mgdb. auf Taubenschlag 1. X. 08 (Feuerstake), ein weiteres Stück bei M.
- oblita* Er. Nicht selten.
- coriaria* Kr. Mgdb. 1 Stück.
- gagatina* Baudi. Nicht selten.
- sodalis* Er. Nicht häufig.
- pallidicornis* Thoms. Sülldorf (W.), Schönebeck 14. VIII. 09.
- nigritula* Grav. Bei M. nicht häufig.
- boletophila* Thoms. Schönebeck 1 Stück 23. V. 09 (Best. Hbth.).
- crassicornis* F. In Pilzen, eine der häufigsten Arten.
- xanthopus* Thoms. Bei M. im April mehrfach gefunden.
- trinotata* Kr. Sehr häufig.
- \**triangulum* Kr. Soll nach W. bei Sülldorf vorkommen, die Belegstücke sind aber *trinotata* Kr, (Best. Hbth.). — Sonst am Meeresstrande, doch auch im Binnenlande Ich fand die Art im Herbste 1903 im Duisburger Walde (Rheinland) sehr zahlreich in faulenden Pilzen (Best. Bernh., Hbth., W. Kolbe).
- euryptera* Steph. Häufig.
- castanoptera* Mannh. Nicht selten. Mehrfach in Hamsterbauen gefunden.
- nitidula* Kr. Mgdb. und Schö. einzeln.
- oblonga* Er. Mgdb. 3 Stück (Best. Hbth.).
- graminicola* Grav. Schilfsümpfe, nicht häufig.

- \**vestita* Grav. Im Gebiete nicht beobachtet. Die Stücke der Sammlung W. aus Sülldorf waren *castanoptera*.  
*cadaverina* Bris. Mgdb. 28. X. 08 (Best. Hbth.).  
*atramentaria* Gyll. Bied. Busch mehrfach.  
 \**putrida* Kr. Die Angabe für Magdeburg bei W. beruht auf falscher Bestimmung.  
*marcida* Er. In Pilzen häufig.  
*parvula* Mannh. Bied. Busch 11. X. 08.  
*sordidula* Er. Bied. Busch 11. X. 08.  
*celata* Er. Möser in Pilzen.  
*hodierna* Sharp. Dasselbst in Pilzen im Herbst 1907 nicht selten (Best. Bernh.).  
*zosteræ* Thoms. Häufig.  
*paradoxa* Rey. Beim Hamster sehr häufig.  
*longicornis* Grav. Häufig.  
*sordida* Mrsh. Häufig.  
*pygmaea* Grav. Nicht selten.  
*orphana* Er. Magdeburg 1 Stück (Best. Hbth.).  
*fungi* Grav. Gemeinste Art.  
*v. orbata* Er. Mgdb. (Best. Bernh.), Schönebeck. Hält sich nach W. Kolbe (Zeitschr. f. Ent. 1907, 15) ausschließlich auf trockenem Sandboden auf.  
*laticollis* Steph. Häufig.  
*subsinuata* Er. Magdeburg 2 Stk. (Best. Hbth.).  
*analis* Grav. Sehr häufige Art.  
 \**soror* Kr. Nach W. bei Sülldorf, die Stücke waren aber *dilaticornis* Kr. (Best. Hbth.).  
*exilis* Er. Nicht selten.

#### *Sipalia* Rey.

- circellaris* Grav. Sehr häufig.  
 \**caesula* Er. Nicht nachgewiesen. Das von W. hierher gerechnete Stück aus dem Elbangerölle bei Magdeburg war *exilis* Er.

#### *Notothecta* Thoms.

- flavipes* Grav. Magdeburg 1 Stück.

#### *Callicerus* Grav.

- obscurus* Grav. An der Elbe beim Herrenkrug 1 Stück gesiebt; Kreuzhorst 1 Stück gestreift 17. V. 14. Im

Biederitzer Busche sah ich am 20. IV. 08 ein Stück auf einem Eichenstumpfe laufen, dann fand ich beim Sieben noch mehrere unter Laub am Boden. Schliesslich entdeckte ich das hübsche Tierchen, welches man mit bloßem Auge an der Art wie es seine zierlichen Fühler trägt und mit ihnen wedelt erkennen kann, in gröfserer Anzahl an auf dem Boden liegenden, halb unter Blättern vergrabenen durren Eichenzweigen. Die Zweige wurden über einem ausgebreiteten Sammeltuche abgeklopft, mit *Callicerus* fand sich an ihnen *Atheta aequata* Er.

*rigidicornis* Er. Nach Hahn in Barby unter einem Steine gefunden. Der Verbleib des Stückes war nicht zu ermitteln.

*Thamiaraea* Thoms.

*cinnamomea* Grav. Mgdb. 1 Stück 15. VI. 07 (Manzek).

*Astilbus* Steph.

*canaliculatus* F. Häufig.

*Zyras* Steph.

*collaris* Payk. Möser (H.), Tochheim (H.).

*Haworthi* Steph. M. Nordfriedhof (H.), Klappermühle bei Woltersdorf 6. VI. 86 (H.).

*funestus* Grav. Herrenkrug (H.).

*cognatus* Märk. Herrenkrug (H.).

*humeralis* Grav. Herrenkrug (H.).

\**erraticus* Hagens. Das bei W. erwähnte Stück hat sich als *Atheta hepatica* Er. erwiesen (Best. Hbth.).

*limbatus* Payk. Im Angeschwemnten (H.). Je ein Stück Bied. Busch, Eggersdorf und Röte bei Schönebeck gesiebt.

*lugens* Grav. Herrenkrug (H.).

*laticollis* Märk. Herrenkrug (H.), Möser (Pohl).

*Phloeopora* Er.

*testacea* Mannh. Unter Kiefernrinde häufig.

*corticalis* Grav. Unter Eichenrinde, seltener. Kreuzhorst 21. V. 10, Elbenau 1. XI. 13.

*Ilyobates* Kr.

*nigricollis* Payk. Tochheim (H.). — Hohes Holz bei Eggenstedt (H.).

Sorry, this page is  
unavailable to Free Members

You may continue reading on the following page



Upgrade your  
Forgotten Books Membership  
to view this page now  
with our  
**7 DAY FREE TRIAL**

[Start Free Trial](#)

*exoleta* Er. Magd. 5. IV. 08, Nordfriedhof 2. V. 08.

*praecox* Er. Möser 3 Stück 13. IX. 08.

*alternans* Grav. In Pilzen häufig.

*abdominalis* Mannh. Möser unter schimmligem Holze in  
Anzahl 13. IX. 08, Schönebeck 1 Stück 17. X. 09.

*filiformis* Redt. Bei Mgdb. 3 Stck. einzeln gefunden (Best.  
Bernh.).

*annularis* Mannh. Magdeburg mehrfach.

*ferruginea* Er. Kreuzhorst 2 Stück 18. IV. 09, Schönebeck  
1 Stück Mai 09.

*brachyptera* Steph. Schönebeck Mai 09.

*Stichoglossa* Fairm.

*corticina* Er. Möser 22. III. 13 (Manzek), Mgdb. 1 Stück

*prolixa* Grav. Herrenkrug 21. III. 08, Elbenau 29. V. 13.

*Thiasophila* Kr.

*angulata* Er. Rogätz b. Ameisen (H.).

*Microglossa* Kr.

*pulla* Gyll. Magdeburg 15. V. 10 (Manzek).

*nidicola* Fairm. Magdeburg (H.). — Westeregeln 10. V. 07  
(Manzek).

*gentilis* Märk. Herrenkrug bei *Lasius fuliginosus* (H.).

*marginalis* Grav. Magdeburg 1 Stück.

*Dinarda* Mannh.

*dentata* Grav. Rogätz (H.).

*Aleochara* Grav.

*curtula* Goeze. Häufig.

*crassicornis* Lac. Roteshorn 4. V. 08 (H.), Herrenkrug mehr-  
fach, Elbe b. Schönebeck 15. VIII. 09. — Westeregeln  
(Manzek).

\**lata* Grav. Die Angabe für Mgdb. bei W. beruht auf Irrtum.  
Auch im Allergebiete ist die Art nicht festgestellt.

*brevipennis* Grav. Roteshorn 2 Stück 4. V. 08 (H.), Mgdb.  
2 Stück, Schönebeck 2 Stück 21. VIII. 09.

*morion* Grav. M. Nordfriedhof (H.), Tochheim (H.).

*moesta* Grav. M. in Taubenmist 1. X. 08 (Feuerstacke).

*sparsa* Heer. Im Frühjahr und Herbst an Baumsaft nicht  
selten. Bied. Busch, Kreuzhorst, Schönebeck, Grizehne.

- lanuginosa* Grav. Magdeburg 1 Stück.
- vagepunctata* Kr. Schönebeck November 1910. Das einzige Stück befindet sich jetzt in der Sammlung Hubenthal.
- sanguinea* L. Mgdb. in Taubenmist 1. X. 08 (Feuerstacke, . Best. W. Kolbe).
- moerens* Gyll. Möser 1 Stück 13. IX. 08.
- laevigata* Gyll. Schnarsleben 3 Stück 19. II. 97 (H.), Magdeburg 3 Stück, Eggersdorf 3 Stck. 28. III. 11.
- cuniculorum* Kr. In Hamsterbauen sehr häufig.
- ruficornis* Grav. Biederitzer Busch (H.). — Saures Holz bei Seehausen Kr. Wanzleben (H.).
- bilineata* Gyll. Sülldorf (H.). Calbe a. S., Schönebeck im Sept. und Oct. mehrfach gestr.
- verna* Say. Sülldorf (H.), Magdeburg.
- bipustulata* L. Häufig.