

Hémiptères-Hétéroptères nouveaux de la faune paléarctique.

Par

B. E. Jakowleff (Eupatoria).

***Tarisa ciliaris*, n. sp.**

Entièrement d'un jaunâtre très pâle, couvert des longs cils blanchâtres sur toute la surface. Tête bombée sur le vertex; yeux d'un brunâtre pâle; antennes à premiers articles presque blanchâtres, 4^e et 5^e d'un brun rougeâtre. Pronotum avec un fort tubercule subconique au milieu de son bord antérieur et quatre, plus arrondis, sur le disque. Ecusson avec deux forts tubercules unis à la base et un autre, très élevé et conique, au milieu du disque; bord extérieur de l'écusson convexe, renflé et plus grossièrement et irrégulièrement ponctué dans sa partie apicale; carène médiane du pronotum et de l'écusson plus marquée vers l'extrémité de celui-ci. Bec dépassant les hanches postérieures, noirâtre au sommet. Tranche abdominale avec de très petits tubercules concolores; ventre marqué sur les flancs d'une bande longitudinale brunâtre. Pattes épaisses, entièrement flaves, tibias roussâtres; ongles d'un jaunâtre pâle.

Long. $4\frac{3}{4}$, larg. $3\frac{1}{2}$ mm.

Transcaspienne: station Кааhка (С. А. H n g e r! 27. VI. 1896).

Относится къ небольшой группѣ формъ, у которыхъ передне-спинка и основаніе щитка снабжены высокими бугорками; такихъ

видовъ до сихъ поръ извѣстно только два: *T. flavescens* A. S. (изъ Испаніи) и *T. leprasa* Put. (изъ Алжира), отъ которыхъ нашъ видъ отличается длинными щетинистыми волосками, раскиданными по всей поверхности и вздутымъ боковымъ краемъ щитка въ его конечной половинѣ.

***Phimodera argillacea*, n. sp.**

Assez convexe, ovale, sabparallèle aux côtés, d'un gris jaunâtre pâle, unicolore, avec de rares tubercules blancs peu distincts. Corps densément poilu. Tête plus courte que large (y compris les yeux), très convexe, avec les bords latéraux profondément échancrés, largement arrondis au sommet; tylus convexe, graduellement courbé sur toute sa longueur; lames rostrales larges, devenant plus hautes et arrondies en arrière; antennes brunâtres, plus pâles à la base, à 2^e article d'un quart plus long que le 3^e et plus court que le 4^e. Yeux petits. Pronotum un peu plus large que les élytres avec le bord antérieur plus large que la tête, fortement échancré en triangle dans la partie antérieure du bord latéral, largement arrondi dans la partie humérale, avec une faible incision près des angles postérieurs, qui sont munis d'une bosse saillante. Ecusson ovale, plus long que l'abdomen, sans carène longitudinale et avec les convexités normales, peu développées concolores. Dessous ponctué de brun noirâtre, marbré d'une nuance pâle; stigmates noirâtres; tubercules du connexivum assez saillants. Pattes inermes, plus ou moins maculées de noir.

Lang. 7³/₄; larg. 4¹/₄ mm.

Mongolie: oasis de Sadjéou (expéd. Roborowsky & Kozlow 25. IV. 1894).

Видъ близкій по внѣшности къ *Ph. fumosa* Fieb., но отличающійся болѣе короткимъ 2-мъ членикомъ усиковъ, небольшими глазами и носовымъ валikomъ (tylus) не прямымъ, а постепенно загибающимся внизу.

***Cellobius gentilis*, n. sp.**

D'un vert sale, couvert de points fins, concolores; côtés de pronotum, base de l'exocorie et connexivum d'un flave rougeâtre; dos

de l'abdomen noir, d'un vert pâle au tiers apical. Tête avec l'épistome profondément enclos par les joues; lames rostrales longues, fortement dentées en avant, formant des lobes arrondis postérieurement; yeux grands; antennes à 2^e article d'un quart plus long que le 3^e; les articles médians rougeâtres, le 1^{er} d'un vert très pâle, le 5^e brun-noirâtre; bec prolongé jusqu'aux pattes postérieures, entièrement d'un vert pâle, même à dernier article concolore. Ecusson concolore; membrane plus longue que l'abdomen; connexivum avec une petite tache noire sur chaque intersection. Orifice odorifique étroit, épineux.

Long. 12, larg. 6¹/₄ mm.

Mongolie occid.: Bougas (Khami) (expédition. Roborowsky & Kozlow! 6. IX. 1895).

Единственный до сихъ поръ извѣстный видъ этого рода, *C. abdominalis* Jak. изъ Закаспійской области, отличается инымъ соотношеніемъ члениковъ усиковъ, краснымъ цвѣтомъ спинной стороны брюшка, щиткомъ на концѣ съ красноватымъ оттѣнкомъ и формою скуловыхъ отростковъ.

***Serenthia brevirostris*, n. sp.**

Tête et dessous du corps noirs, pronotum et les élytres d'un jaunâtre pâle, antennes et pattes d'un testacé roussâtre. Bec très court, n'atteignant que les hanches antérieures; antennes à 3^e article plus long que les deux premiers réunis et à 4^e article brunâtre au sommet. Pronotum finement caréné au milieu sur toute sa longueur. Elytres avec la marge latérale unisériée et une côte humérale distincte.

Long. 2²/₃, larg. à peu près 1 mm.

Cours inférieur de l'Amou-daria: Noukous (C. Rossikow!).

По блѣдному цвѣту переднеспинки видъ этотъ близокъ къ *S. atricapilla* Spin.; но онъ нѣсколько короче и шире послѣдняго, а, главное, имѣетъ очень короткій хоботокъ, который только немного длиннѣе головы, тогда какъ у остальныхъ видовъ этого рода хоботокъ достигаетъ до половины среднегруди.