

О новыхъ для русской фауны жесткокрылыхъ.

Андрея Семенова (С.-Петербургъ).

I.

1. *Calosoma lugens* Chaud. 1869, видъ извѣстный до сихъ поръ только изъ кигайскихъ провинцій: Шань-си и Гань-су (Г. Н. Потанины!)¹⁾, изъ южнаго Хингана (экспед. Д. В. Путяты!) и Манчжуріи (В. Л. Комаровъ! VII. 1896), найденъ въ предѣлахъ Россіи въ Сидеми бл. Владивостока (Г. Л. Суворовъ! 17. VI. 1900; экземпляръ въ колл. собирателя) и въ Никольскѣ на Уссури (Я. И. Корольковъ! 12. VII. 1900; экз. въ колл. П. П. Семенова).

2. *Dicranoncus femoralis* Chaud. 1850 (= *Loxocrepis coelestinus* Motsch. 1864, teste Н. W. Bates 1873), извѣстный до сихъ поръ изъ сѣв. Индіи, Бирмы и Японіи (Нагасаки)²⁾, найденъ М. И. Янковскимъ и Г. Л. Суворовымъ въ Сидеми бл. Владивостока (одинъ экземпляръ любезно предоставленъ мнѣ В. Е. Яковлевымъ³⁾, другой видѣлъ въ колл. (Г. Л. Суворова). Я имѣю этотъ видъ кромѣ того изъ Кореи [Чаанса (П. Ю. Шмидтъ! 3. VII. 1900)].

¹⁾ Ср. A. Sémenow: Horae Soc. Ent. Ross., XXI, 1887, p. 427.—Chaudoir указываетъ несуществующую провинцію „Tchéfon“.

²⁾ См. Schönfeldt, Cat. Col. Jap. (Jahrb. Nassau. Ver. Naturk., XL), 1887, p. 13.

³⁾ Ср. Horae Soc. Ent. Ross., XXXII, 1898, p. 572, nota 11

3. *Peronomerus auripilis* H. W. Bates 1883, известный только изъ Японіи (о. Ниппонъ)⁴), найденъ въ предѣлахъ Россіи по р. Уссури, верстахъ въ 20 ниже Никольска (Кирилловъ! VI. 1899; экземпляры мнѣ любезно предоставлены Г. Л. Суворовымъ) и въ 60 верстахъ ниже впаденія Имана (Кирилловъ!; 1 экз., доставленный Г. Л. Суворовымъ, въ колл. Д. К. Глазунова).

4. *Bolboceras nigroplagiatum* Waterh. 1875 известенъ былъ до сихъ поръ только изъ Японіи (Нагасаки, Токио, Иокогама, Кобе)⁵); В. Е. Яковлевъ великодушно предоставилъ мнѣ 1 экземпляръ этого вида, найденный въ южной части Приморской области около Ян-чи-хе (на Корейской границѣ).

5. *Apalimna liturata* H. W. Bates 1884, красивый дровосѣкъ, имѣющій совершенно тропическій обликъ и описанный изъ Японіи, былъ указанъ для о-ва Аскольда v. Heyden'омъ въ Deutsche Ent. Zeitschr. 1884, p. 283 (безъ приведенія названія). Въ новѣйшее время видъ этотъ найденъ еще въ южной части Приморской области около Ян-чи-хе на границѣ Кореи (любезно доставленный мнѣ В. Е. Яковлевымъ экземпляръ находится въ колл. П. П. Семенова) и, слѣдовательно, несомнѣнно входитъ въ составъ фауны Россіи.

6. *Lamiomimus gottschei* Kolbe 1886 (= *Lamia adelpha* Ganglb. 1887)⁶), описанный изъ Кореи (оригинальные экземпляры найдены были между Сеуломъ и Пинганомъ и въ Пун-тунѣ)⁷), принадлежитъ также фаунѣ Россіи: недавно В. Е. Яковлевымъ доставленъ мнѣ 1 экземпляръ и этого вида, найденный, вмѣстѣ съ предыдущимъ, у Ян-чи-хе (южн. ч. Приморской обл., на Корей-

⁴) См. Schönfeldt, l. c., p. 6.

⁵) См. Schönfeldt, l. c., p. 74; id., III. Nachtr. (Jarb. Nassau. Ver. Naturk., L), 1897, p. 104.

⁶) Описание Ganglbauer'a (Horae Soc. Ent. Ross., XX, 1887, p. 137), хотя и очень поверхностное, не оставляетъ сомнѣнія въ тождествѣ его *Lamia adelpha* съ *Lamiomimus gottschei* Kolbe, описаннымъ почти одновременно.

⁷) Ср. Kolbe: Arch. f. Naturg., 52. Jahrg., I, 1886, pp. 223—225 (*Lamiomimus gottschei*); Ganglbauer: Horae Soc. Ent. Ross., XX, 1887, pp. 132, 137—138 (*Lamia adelpha*). Я имѣю экземпляры этого вида еще изъ Гензана въ Корей (П. Ю. Шмидтъ! 24. V и 1 VI. 1900) и изъ Манчжуріи (В. Л. Комаровъ! VII. 1896). Ср. также H. W. Bates: Proceed. Zool. Soc. Lond. 1888, p. 370.

ской границѣ); кромѣ того я имѣю нѣсколько экземпляровъ *Lamotinus gottschei* изъ окрестностей Владивостока и изъ Никольска на Уссури (Д. Л. Ивановъ! 1890). Изъ этого можно заключить, что въ южной части Приморской области *L. gottschei* даже не рѣдокъ.
