

— Ал. Ив. Яновлевъ (адр.: и. отд. Бурмакино, Ярослав. у.) взялъ на себя редактирование „Определителя жуковъ Европ. Россіи“ и будетъ очень благодаренъ за сообщеніе всякихъ новыхъ свѣдѣній касающихся состава фауны жестокрылыхъ Европ. Россіи.

— Имѣя въ виду издать, когда накопится для этой работы достаточно, матеріала, обзоръ уховертокъ (*Dermatoptera* s. *Forficulidae*) русской фауны, Андр. Петр. Семеновъ (СПБ., В. О., 8 л., 39) будетъ очень благодаренъ всякому, кто доставитъ ему коллекціонный матеріалъ по этимъ насѣкомымъ. Особенно желательно получить побольше матеріала изъ Крыма, Кавказа и Закавказья (особенно же—съ Черноморскаго побережья) и изъ восточной Сибири. Такъ какъ личиночныя стадіи однихъ уховертокъ на первый взглядъ весьма похожи на совершенныхъ (взрослыхъ) насѣкомыхъ другихъ видовъ, необходимо собирать уховертокъ въ возможно большемъ числѣ экземпляровъ. Не слѣдуетъ при этомъ пренебрегать даже самыми обыкновенными въ Европ. Россіи формами (какъ *Forficula auricularica* L. или *Anechura bipunctata* F.), прелѣлы распространенія которыхъ, напр. въ сѣверномъ направленіи, далеко еще не выяснены. Сохранять и присылать уховертокъ можно какъ въ спирту или формалинѣ, такъ и на ватѣ,—въ сухомъ видѣ; послѣдній способъ для пересылки даже удобнѣе; необходимо только позаботиться о возможно полной сохранности пересылаемыхъ экземпляровъ (уховертки отличаются *крайней хрупкостью усиковъ*). Экземпляры безъ точныхъ данныхъ о мѣстѣ и времени ихъ находенія (имѣетъ съ именемъ собирателя) не имѣютъ никакого научнаго значенія и не могутъ принести ни малѣйшей пользы.

— Приступая къ обработкѣ кавказскихъ и сибирскихъ представителей рода *Nebria* Latr. (Coleoptera, Carabidae), Дм. Конст. Глазуновъ (СПБ., Казанская, 10) будетъ очень благодаренъ за сообщеніе матеріала по этому роду съ Кавказа, изъ Закавказья и изъ Сибири.

— Занимаясь постепенной разработкой видовъ *Chysididae* и *Evaniidae* преимущественно русской фауны, Андр. Петр. Семеновъ (СПБ., В. О., 8 л., 39), обращается съ усердной просьбой о доставленіи ему матеріала по означеннымъ двумъ семействамъ перепончатокрылыхъ. Особенно желателенъ матеріалъ съ южныхъ окраинъ Имперіи, съ крайняго востока Сибири, а также изъ странъ сопредѣльныхъ съ Россіею въ Азіи. Собирать этихъ насѣкомыхъ слѣдуетъ на вату; на ней-же и пересылать ихъ.

— А. П. Семеновъ (СПБ., В. О., 8 л., 39) будетъ также очень благодаренъ всякому за сообщеніе біологическихъ данныхъ о степныхъ *Prionidae* (Coleoptera, *Cerambycidae*) русско-азиатской фауны, именно о степныхъ представителяхъ рода *Prionus* Geoffr. и *Polyarthron* Serv. Желательны и экземпляры совершенныхъ насѣкомыхъ, при чемъ, при ловлѣ, особенное вниманіе должно быть обращено на самокъ, у большинства видовъ гораздо болѣе рѣдкихъ тѣмъ самцы, а у нѣкоторыхъ видовъ и вовсе еще неизвѣстныхъ.

— Собираясь издать дополненіе къ напечатанной имъ въ 1896 г. ревизіи видовъ р. *Abia* Leach Старого Свѣта (*Hymenoptera, Tenthredinidae*), А. П. Семеновъ (В. О., 8 лин., 39) очень проситъ о доставленіи ему матерьяловъ по означенному роду; особенно желательны экземпляры *Abi*'й съ Кавказа, изъ Закавказья, изъ Азіатской Россіи (особенно-же—изъ Семирѣчья), но также и изъ Европ. Россіи, особенно изъ западныхъ губерній. Виды р. *Abia* попадаются въ солнечные дни на цвѣтущихъ растеніяхъ, особенно въ началѣ лѣта. Благодаря ихъ значительной вялости и далеко не быстрому полету ловить ихъ очень легко даже безъ помощи сачка или сѣтки.

— А. П. Семеновъ (СПБ., В. О., 8 л., 39) усердно проситъ доставлять ему русскихъ, а также азіатскихъ представителей семейства перепончатокрылыхъ *Siricidae* (рогохвосты) особенно же группы *Xiphydriidae*, которыми онъ занимается спеціально; желательно въ то-же время имѣть и ихъ паразитовъ (всѣ *Xiphydriidae* попадаютъ, вмѣстѣ со своими паразитами, на старыхъ, обыкновенно уже полусухихъ, деревьяхъ, въ которыхъ протачиваютъ ходы). Весьма желателенъ матерьялъ съ Кавказа, изъ всей Азіатской Россіи, но также и изъ всей Европ. Россіи.

— Подготовляя къ печати монографическій обзоръ видовъ рода *Apatophysis* Chev. (*Coleoptera, Cerambycidae*), представленнаго у насъ въ фаунѣ восточн. Закавказья и южныхъ окраинъ Азіатской Россіи (Закаспійская область, Туркестанъ, Семирѣчье, вѣроятно также южная окраина Киргизскихъ степей и границы Монголіи), А. П. Семеновъ (СПБ., В. О., 8 лин., 39) усердно проситъ о доставленіи ему матерьяла по этому роду; особенно желательно получить экземпляры рѣдко встрѣчающихся самокъ вмѣстѣ съ болѣе обыкновенными самцами. Весьма желательны біологическія данныя о представителяхъ этого рода. Виды *Apatophysis* ловятся начиная съ конца мая, но обыкновенно позже (въ іюнѣ, іюлѣ, августѣ и даже сентябрѣ) въ открытыхъ (нерѣдко степныхъ) мѣстностяхъ на кустахъ цвѣтущаго гребенщика (*Tamarix*) а можетъ быть и другихъ растеній; самцы прилетаютъ обыкновенно, еще въ сумеркахъ (до наступленія полной темноты), на свѣтъ фонаря или лампы.

Замѣченные опечатки.

Стран.	Строка.	Напечатано.	Слѣдуетъ читать.
8	11 св.	<i>D. euxina</i>	Слѣдовательно <i>D. euxina</i>
9	3 "	съ нимъ	съ ними
11	10 " примѣч.	<i>Oreoxenus</i>	<i>Oreolyperus</i>
27	11 "	<i>Isadelphus</i>	<i>Isadelphus</i> (дважды)
"	" "	<i>altribuendum</i>	<i>attribuendum</i>
44	23 "	<i>espèce</i>	<i>espèce</i>
52	22 * "	<i>ontraire</i>	<i>contraire</i>
57	20 "	<i>Suodan</i>	<i>Soudan</i>

Редакторъ Н. Кокуевъ.