

Замѣтка о нахожденіи въ Закаспійской области *Lucanus ibericus* Motsch. (Coleoptera, Lucanidae).

Андрея Семенова (С.-Петербургъ).

Лѣтъ 7 тому назадъ покойнымъ Ф. Ф. Моравицомъ мнѣ былъ переданъ 1 экземпляръ ♂ *Lucanus ibericus* Motsch. (*orientalis* Krtz.) закаспійскаго происхожденія; экземпляръ этотъ, найденный въ западной части Копетъ-дага близъ укрѣпленія Ходжакала, происходитъ изъ сборовъ М. Д. Померанцева 1893 г. Я долго ждалъ повторенія этой интересной находки, но пока еще не дождался, главнымъ образомъ вѣроятно потому, что въ западной части Копетъ-дага никто послѣ г. Померанцева съ энтомологическими цѣлями не экскурсировалъ, а названный *Lucanus* въ предѣлахъ Закаспійской области только тамъ и встрѣчается.

Закаспійскій экземпляръ *L. ibericus* Motsch. принадлежитъ къ той персидской формѣ этого вида, которая охарактеризована и изображена (безъ особаго названія) въ новѣйшемъ монографическомъ очеркѣ L. Planet¹⁾ и которую можно назвать f. **cas-pica** (вѣроятно subspecies)²⁾. Ея отношенія къ основной формѣ *L. ibericus* могутъ выясниться только послѣ изученія значительнаго числа экземпляровъ изъ зап. Персіи и Закаспійской области;

¹⁾ Planet, Essai monogr. sur les Coléopt. des genres *Lucane* et *Pseudolucane*, Paris (1898), pp. 83—85, fig. 26, 27.

²⁾ *Lucanus ibericus* Motsch. (*orientalis* Krtz.) f. (verisimiliter subspecies) **cas-pica** n.: differt a f. typicâ imprimis mandibulis brevioribus apice simplicibus

она характеризуется прежде всего короткими, нераздвоенными на концах челюстями у ♂, а также и другими указанными Planet признаками³⁾.

Lucanus ibericus Motsch. былъ до сихъ поръ извѣстенъ съ Кавказа, изъ Закавказья, изъ разныхъ мѣстъ Малой Азіи вплоть до Босфора и изъ западной Персіи⁴⁾. Нахожденіе его въ Туркмено-Хорасанскихъ горахъ весьма интересно уже потому, что сем. *Lucanidae* не имѣло, насколько до сихъ поръ было извѣстно, ни одного представителя въ фаунѣ туранской зоогеографической провинціи⁵⁾, за исключеніемъ восточно-бухарскаго *Dorcus sewertzowi* Sem., что является яркой отрицательной чертой въ характерѣ этой провинціи. Какъ *Dorcus sewertzowi*, такъ и *Lucanus ibericus* въ предѣлахъ туранской провинціи должны быть разсматриваемы какъ реликтовые формы; ихъ нахожденіе здѣсь обуславливается существованіемъ остатковъ находящихся въ дегенераціи третичныхъ лѣсовъ, особенно сохранившихся въ нѣкоторыхъ пунктахъ восточной Бухары⁶⁾, но ясныхъ также, несмотря на значительно бѣольшую степень дегенераціи, въ нѣкоторыхъ ущельяхъ Копетъ-дага⁷⁾, особенно же—въ западной его части⁸⁾. Это свойство западной части Туркмено-Хорасанскихъ горъ вводитъ въ фауну туранской провинціи рядъ видовъ, вполне ей чуждыхъ и отсутствующихъ на всемъ остальномъ ея протяженіи, на что отчасти уже указано въ предъидущей замѣткѣ „Къ распространенію *Forficula auricularia* L.“.

(haud bifidis), antennarum clavâ breviorе, pronoto lateribus magis rotundato, margine basali magis elevato (cf. etiam Planet, l. c., p. 84 et fig. 26, 27).—Hab. in Persia occid. (testibus Kraatz et Planet), etiam in finibus provinciae nostrae Transcaspicae: Chodzha-kala in parte occidentali montium Kopet-dagh (M. Pomerantzev! 1893).

³⁾ Ср. примѣч. 2.

⁴⁾ Ср. Planet, l. c., p. 76.

⁵⁾ Изъ ея предѣловъ мы, какъ извѣстно, исключаемъ Семирѣчье и Китайскую Джунгарію, выдѣляемая нами въ особую *Джунгарскую провинцію*.

⁶⁾ См. Коржинскій: Энциклоп. Словарь Брокгауза и Ефрона, XXVII а, 1899, Россія, стр. 48.

⁷⁾ Ср. Коржинскій, Очерки растительности Туркестана (Зап. Имп. Акад. Наукъ по Физ.-мат. отд., IV, 4) 1896, стр. 16. На основаніи собственныхъ впечатлѣній 1888 г. я вполне присоединяюсь къ тому, что говоритъ здѣсь акад. Коржинскій.

⁸⁾ Покойнымъ С. И. Коржинскимъ не посѣщенной.