

Обзоръ литературы, касающейся русской фауны.

I n s e c t a.

Путеводитель по Зоологическому Музею Императорской Академіи Наукъ. С.-Петербургъ. 1901. 8°. (301-стр.).

Отдѣлъ, посвященный объясненію выставленныхъ въ музеѣ коллекцій и объектовъ по насѣкомымъ и занимающій стр. 234—290 названной книжки, составленъ гг. Аделунгомъ (прямокрылыя, сѣтчатокрылыя, перепончатокрылыя, цикады и тли), Біянки (клопы), и Якобсономъ (блохи, двукрылыя, жуки и бабочки). Онъ принадлежитъ къ наиболѣе удачнымъ страницамъ книжки, страдающей вообще отсутствіемъ единства редакціи, мѣстами полнымъ ея отсутствіемъ и разнаго рода промахами, совершенно недопустимыми въ подобномъ изданіи. Объясненіе коллекцій по всѣмъ отрядамъ насѣкомыхъ составлено удовлетворительно; жаль только, что количество видовъ отдѣльныхъ семействъ указано лишь въ рѣдкихъ случаяхъ и не дано схемы классификаціи насѣкомыхъ для общей оріентировки. Можно было бы также болѣе выдвинуть представителей русской фауны. Въ объясненіяхъ отдѣла Hemiptera-Heteroptera замѣчаются странныя выраженія и рядъ опечатокъ. Цѣна книжки (1 рб.) намъ кажется слишкомъ высокой, не оправдываемой и внѣшнимъ видомъ изданія.

Якобсонъ, А. Поѣздка въ Абаканскія горы. [Труды Русскаго Энтомологическаго Общества, XXXV, № 1—2, 1901, стр. V—XIV] (по отд. оттиску, появивш. въ мартѣ 1901 г.).

Краткій отчетъ о совершенной въ 1897 г. авторомъ совместно

съ Ю. Н. Вагнеромъ и г. Казанцевымъ при содѣйствіи Русскаго Энтомологическаго Общества побѣздѣ въ Абаканскія горы (Зап. Сибирь), съ характеристикой въ энтомологическомъ и отчасти ботаническомъ отношеніяхъ посѣщенныхъ мѣстностей и упоминаніемъ наиболѣе интересныхъ находокъ по Coleoptera и Lepidoptera. Говоря о такихъ находкахъ, авторъ приводитъ между прочимъ условія нахожденія (повидимому, однако, случайныя) извѣстныхъ своей рѣдкостью жуковъ семейства *Melandryidae*: *Phryganophilus ruficollis* F. и *Stenotrachelus aeneus* Payk. Въ отчетѣ разсѣяно немало и другихъ интересныхъ наблюдений.

Мазараній, В. В. Экскурсія въ окрестностяхъ С.-Петербурга весною 1900 г. [Труды Русскаго Энтомологическаго Общества, XXXV, № 1—2, 1901, стр. XL—XLVII] (по отд. оттиску, появивш. въ мартѣ 1901 г.).

Описаніе весны 1901 г. въ окрестностяхъ столицы въ видѣ матерьяла для „энтомологическаго календаря“. Въ качествѣ новыхъ для фауны Петербургской губерніи указаны жуки: *Dichrotrichus deutschii* Gyll., *Limonius (Pheletes) aeneoniger* Deg. и *Calididium sanguineum* L., а также клопъ *Charthoscirta cincta* H.-S. Изъ другихъ интересныхъ находокъ назовемъ: *Aphodius (Acrosus) bimaculatus* Lachm. (16. V, во множествѣ), *Carabus menetriesi* Fisch. W. (1 экз. ♀) и особенно — *Lado jelskii* Wankow. (1 экз.).

А. Семеновъ (С.-Петербургъ).

C o l e o p t e r a.

Belon, le R. P. Le genre *Cortilena* Motsch. (*Lathridiidae*) et synopse de toutes les espèces actuellement connues. [Annales de la Société Entomologique de Belgique, XLV, 2, 1901 (mars), pp. 86—89].

Критическія замѣтки о видовомъ составѣ названнаго въ заглавіи рода и обстоятельная аналитическая таблица его видовъ, изъ которыхъ только одинъ (*C. fuscipennis* Mannerh.) принадлежитъ палеарктической фаунѣ.

Bernhauer, Max, Dr. Neue Staphyliniden aus Centralasien. [Verhandlungen der k. k. zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien, LI, 2. Heft, 1901 (März), pp. 106—115].

Обстоятельное описаніе (по-нѣмцки) слѣдующихъ новыхъ ви-

довъ семейства *Staphylinidae* изъ сборовъ Leder'a въ пограничной съ Китаемъ части русскаго Алтая (заглавіе статьи, слѣдовательно, неточно): *Ocalea pulcherrima*, *Ocyusa mirabilis*, *Ocyusa grossa*, *Atheta (Oreostiba) oreophila*, *Atheta (Dimetrota) altaica*, *Atheta (Xenota) lederi*, *Atheta (Metaxya) bang-haasi*, *Atheta (Phylhygrra) (sic) difficulta (sic!)*, *Phloeocharis gigantea*; кромѣ того характеризуются дополнительно по алтайскимъ экземплярамъ *Atheta (Dimetrota) allocera* Ерр. и *Atheta (Homalota) pachycera* Ерр. и описывается новая *Atheta (Tachynota, subg. nov.) thinodromoides* Rtttr. in litt. изъ Ауліэ-ата (сѣв. Туркестанъ). Можно порадоваться, что такъ быстро явился преемникъ недавно умершему д-ру Erpelshcim'y, извѣстному знатоку сем. *Staphylinidae*, и пожелать ему дальнѣйшихъ успѣховъ въ разработкѣ этого обширнаго семейства жесткокрылыхъ.

Jacobson, G. Symbola ad cognitionem Chrysomelidarum Rossiae asiaticae. [Öfvertryck af Finska Vet.-Soc. Förhandlingar, B. XLIII, 1901, pp. 1—49].

Статья эта состоитъ изъ введенія, заключающаго маршруты всѣхъ финляндскихъ путешественниковъ, собиравшихъ насѣкомыхъ въ предѣлахъ Азіатской Россіи ¹⁾, и изъ перечня видовъ сем. *Chrysomelidae*, собранныхъ финляндцами въ разныхъ пунктахъ Сибири, Туркестана и Семирѣчья; включены въ списокъ и нѣкоторые виды изъ сборовъ г. Ангера въ Закаспійской обл. Въ такомъ видѣ списокъ является весьма пестрымъ и не даетъ никакой фаунистической картины; но онъ содержитъ рядъ интересныхъ въ зоогеографическомъ отношеніи данныхъ, а также цѣнныя замѣтки по систематикѣ отдѣльныхъ формъ, при чемъ авторъ нерѣдко пользуется также матерьялами Зоол. Музея Академіи Наукъ. Въ качествѣ новыхъ описываются слѣдующія формы: *Donacia sahlbergi* et v. *caeruleo-violacea* (Исыкъ-куль), *D. thalassina rufovariegata* s. v. *coerulea* (Минусинскъ), *D. vulgaris issykkensis* (Исыкъ-куль), *Crioceris 5-punctata* Scop. v. *nigerrima* (Сарепта; въ примѣч.), *Labidostomis sibirica* Gebl. v. *transitoria* (Красноярскъ) et v. *fallacissima* (Забайкалье), *Chilotoma musciformis* Goeze v. *orientalis* (Минусинскій окр.), *Gynandrophthalma aurita* L. v. *hammarstroemi* (Минус. окр., Забайк.), *G. stenroosi* (Семирѣчье), *G. sahlbergi* (Забайкалье), *Clytra arida* Wse. v. *ehnbbergi* (Минус. окр.), *Cryptocephalus scapulitarsis* Jacobs. v. *correspondens* (р. Чу) et v. *apicimaculatus* (Семирѣчье), *Cr. cordiger* v. *completus* (Минус. окр.), *Cr. tataricus* Gebl. v. *ephippiatus*

¹⁾ Отмѣтимъ тутъ одну неточность: странно видѣть такія мѣстности и пункты, какъ Ауліэ-ата, Вѣрный, берега оз. Исыкъ-куля и пр., подъ рубрикой: „In Turkestanâ occidentali“.

(Фергана; въ примѣч.), *Cr. stschukini* Fald. v. *externopunctatus* (Забайк.), *Cr. sarafschanensis* Solsky v. *stenroosi* (Токмакъ), *Cr. crux* Gebl. v. *incompletus* (Забайк.), *Cr. limbellus* Suffr. v. *obscurior* (Забайк.), *Cr. regalis* Gebl. v. *cuprescens* (Забайк.), *Cr. sibiricus* Marg. v. *flavomixtus* (Забайк.), *Cr. wasastjernae adocetus* (Минус. окр., Забайк.), *Cr. tschimganensis* Wse. v. *ahingeri* (Туркменія), *Cr. dilutellus* (Исыкъ-куль) и (въ примѣч.) v. *fedschenkoi* (Искандеръ-куль), *Pachybrachys distictopygus* (Забайк.), *P. sexsignatus issykensis* (Исыкъ-куль), *Aphilenia parvula* Wse. v. *nigrescens* (Закасп. обл.), *Entomoscelis adonidis hammarstroemi* (Семирѣчье), *Oreomela chlypealis* (Александровскій хреб.), *Crosita* (*Pezocrosita*) *sahlbergiana* (Минусинскій окр.), *Chrysomela convexicollis* (р. Енисей въ монгольск. предѣлахъ), *Chr. rufilabris* Fald. v. *perfecta* и v. *discriminata* (Забайк.), *Chr. staphylaea* L. v. *palliat*a (Охотскъ), *Ambrostoma 4-impressum* Motsch. v. *viridicyaneum* et v. *purpureo-cupreum* (Забайк.), *Phytodecta sibirica* Wse. v. *sundmani* (Енисей), *Phyt. linneana bergrothi* c. v. *correspondens* et v. *simplex* (З. Сибирь), *Cercyonops caraganae* Gebl. v. *simplex*, v. *sesquialtera*, v. *hieroglyphica*, v. *limbata* (З. Сибирь), *Sternoplatys fausti* Wse. v. *completus* (Охотскъ), *St. clementzi* (с. Монголія; въ примѣч.), *St. tolli* (Верхоянскъ; въ примѣч.), *St. fulvipes* Motsch. v. *picipes* (Буря и Уссури; въ примѣч.), *St. motschulskyi* (Забайк.), *Gastrolina peltoides* Gebl. v. *cimex* (Забайк.), *Lyperus ehnbegi* (р. Чу), *Galeruca nigrolineata major* (с. Туркестанъ), *Chaetocnema ahingeri* (Мервъ), *Phyllotreta misella* (Забайк.), *Aphthona hammerstroemi* (Минус. окр., Красноярскъ, Забайк.), *A. sundmani* (р. Чу и Вѣрный), *Longitarsus weisei* (с. Туркестанъ). Кромѣ того предложены новыя названія для нѣсколькихъ формъ и сдѣланы слѣдующія синонимическія замѣтки, болѣею частью не имѣющія отношенія къ обработанному матерьялу: *Cryptocephalus praticola* Wse. 1898=*Cr. curda* Jacobs. 1897; *Cr. praticola* Wse. 1889=*Cr. rugulipennis* Suffr.; gen. *Fabricianus* Wse. 1895=*Diachus* Lec. 1880; *Chrysomela aeruginosa* (non. Fald.) Wse. 1887=*Chr. ussuriensis* n. n., *Chrysomorpha quadrangulata* Motsch. 1860=*Chrysomela aurichalcea* v. *angusticollis* Wse. 1887; *Ambrostoma angusticollis* Motsch. 1860=*Chrysomela japona* Baly 1874; *Chrysomela angusticollis* Jacobs.=*Chr. lineigera* n. n.; *Emmetrus auratus* Motsch.=*Ph. cochleariae* v. *neglectus* Sahlb.; *Ischyronota salsolae* Beck. 1871 (*jakowlewii* Rttg. 1889)=*I. desertorum* Gebl. 1833 (предположительно), а *Isch. nitidula* Wse. 1890=*I. elevata* Rttg. 1890 (тоже); *Cassida tinctoria* Wse.=*C. thoracica* Panz. (тоже). Очень жаль, что при редактированіи этой работы проскользнуло значительное количество опечатокъ и другихъ погрѣшностей.

Якобсонъ, Г. Иванъ Станиславовичъ Обертъ (28. VIII. 1809—18. II. 1900). [Труды Русскаго Энтомологическаго Общества, XXXV, № 1—2, 1901, стр. XXXVII—XXXIX] (по отд. оттиску, появивш. въ мартѣ 1901 г.).

Некрологъ энтомофила, извѣстнаго главнымъ образомъ изслѣдованіемъ фауны жесткокрылыхъ Петербургской губерніи.

Якобсонъ, Г. Владиміръ Александровичъ Баласогло (24. VII. 1841—21. II. 1900). [Труды Русскаго Энтомологическаго Общества, XXXV, № 1—2, 1901, стр. LI—LVI] (по отд. оттиску, появивш. въ апрѣлѣ 1901 г.).

Очень подробно составленный некрологъ энтомолога, извѣстнаго своими путешествіями по Европейской и, особенно, Азіатской Россіи и обильными сборами насѣкомыхъ (преимущественно жесткокрылыхъ) во время этихъ путешествій. Особенно надо быть благодарнымъ автору за обстоятельное изложеніе маршрутовъ В. А. Баласогло; маршруты эти выясняютъ многія мѣсто-нахожденія насѣкомыхъ сбора покойнаго, отдѣльные экземпляры которыхъ разсѣяны по разнымъ коллекціямъ.

Якобсонъ, Г. Листоѣды западной Сибири, собранные А. Г. Якобсономъ въ 1897 и 1898 гг. (Труды Русскаго Энтомологическаго Общества, XXXV, № 1—2, 1901, стр. LVII] (по отд. оттиску, появивш. въ апрѣлѣ 1901 г.).

Нѣсколько словъ, сказанныхъ, въ собраніи Русск. Энтомологич. Общества, о коллекціи листоѣдовъ (*Chrysomelidae*), обработанной въ другой, уже прореферированной нами статьѣ (см. это „Обозрѣніе“ 1901, № 1 и 2, стр. 60.

Мазараній, В. В. Экскурсіи въ окрестностяхъ ст. Преображенской, Лужскаго уѣзда С.-Петербургской губ., съ указаніемъ наиболѣе интересныхъ жуковъ, найденныхъ за послѣднее время въ названной мѣстности. [Труды Русскаго Энтомологическаго Общества XXXV, № 1—2, 1901, стр. XXVII—XXXVII] (по отд. оттиску, появивш. въ мартѣ 1901 г.).

Краткій очеркъ окрестностей ст. Преображенской (Варшавск. ж. д.) и перечень наиболѣе интересныхъ находокъ по Coleoptera за періодъ 1894—99 гг. въ этой мѣстности; среди нихъ слѣдую-

ція новинки для фауны Петербургской губ.: *Licinus depressus* Payk., *Feronia* (*Pseudomaseus*) *gracilis* Dej., *Amara lunicollis* Schiödte, *Harpalus hirtipes* Panz., *Bembidium* (*Notaphus*) *obliquum* Strm. v. *immaculata* Sahlb., *Bemb.* (*Principidium*) *ruficollis* Panz., *Onthophagus ovatus* L., *Potosia floricola* Hrbst. v. *rubrocuprea* Müll., *Osmoderma eremita* Scop., *Dicercia* (*Argante*) *moesta* F., *Saprinus 4-striatus* Hoffm., *Heterhelus solani* Heer, *Epuraea* (*Dadopora*) *10-guttata* F., *Meligethes lumbaris* St., *Cryptarcha strigata* F., *Helodes minuta* L. v. *laeta* Panz., *Anthicus* (*Eonius*) *bimaculatus* Ill., *Tomicus proximus* Eichh., *Cleonus* (*Plagiographus*) *nebulosus* L. Cl. (*Plag.*) *turbatus* Schönh., *Brachytarsus scapularis* Gebl., *Acmaeops marginata* F., *Monoctonus saltuarius* Gebl., *Cryptocephalus sanguinolentus* Scop., *Cr. pusillus* F. v. *marshami* Weise, *Cassida murraea* L. v. *immaculata* Desbr., *Psylliodes affinis* Payk., *Epitrix pubescens* Koch., *Syneta betulae* Payk.; кромѣ того *Uloma*, приведенная въ списокъ Оберта какъ *U. culinaris* L., признана за *U. perroudi* Muls. Значительное количество прибавокъ къ фаунѣ Петерб. губерніи объясняется отчасти тѣмъ, что, большая часть сборовъ, послужившихъ для списка Оберта (1876), произведена была въ ближайшихъ окрестностяхъ столицы. Изъ наиболѣе интересныхъ находокъ уже ранѣе показанныхъ для губерніи видовъ назовемъ: *Calitys scabra* Thunb., *Cis petropolitanus* Jacobs. и особенно *Phryganophilus ruficollis* F. Всѣ эти находки дѣлають честь настойчивости, съ которой авторъ изслѣдуетъ фауну жуковъ Петербургской губерніи.

Pic, Maurice. Sur quelques variétés de *Zonabris*, du Turkestan (Col.). [Bulletin de la Société Entomologique de France, 1901, pp. 110—111 (février)].

Описание, сопровождаемое рисунками, двухъ аналогичныхъ разновидностей *Zonabris chodshentica* Ball. (v. *ataënsis* Pic) и *Z. scabiosae* Ol. (v. *auliensis* Pic) изъ сѣв. ч. Туркестана (Аулія-ата).

Reitter, Edm. Uebersicht der Arten der Coleopteren-Gattung *Pachnephorus* Redt. aus der palaearctischen Fauna. [Wiener Entomologische Zeitung, XX. Jahrg., III. Heft, 1901 (März), pp. 53—54].

Аналитическая табличка для опредѣленія видовъ названнаго рода сем. *Chrysomelidae*. Указанія на литературу почти отсутствуютъ. Въ табличкѣ описывается (кратко) 1 новый видъ (*Pachnephorus lateralis*, sp. n.) съ Кавказа со слѣдующимъ оригиналь-

нымъ обозначеніемъ мѣстонахожденія: „Kaukasus. Mlok.“ Позволимъ себѣ высказать догадку, что „Mlok.“ есть сокращеніе фамилии Л. Ф. Млокосѣвича; въ такомъ случаѣ новый *Fachnephorus* найденъ въ восточной части Тифлисской губ., а экземпляръ происходитъ изъ коллекціи П. И. Семенова.

Reitter, Edm. Coleopterologische Notizen. [Wiener Entomologische Zeitung, XX. Jahrg., III. Heft, 1901 (März), pp. 57—59].

Замѣтки 581—592 о палеарктическихъ жесткокрылыхъ; изъ нихъ имѣютъ отношеніе къ русской фаунѣ слѣдующія: 581: о разновидностяхъ *Rosalia alpina* L.; 582: предположеніе о тождествѣ *Athous villosus* Fourc. var. *caucasicus* Buys. 1900 и *A. rosti* Schwarz 1897 съ зап. Кавказа; 583: о нахожденіи въ восточномъ Закавказьи (Ордубадъ, Эривань) описанныхъ только въ прошломъ году *Hydrophilus sartus* Sem. и *H. profanifuga* Sem., что представляетъ значительный интересъ; 584: сомнѣніе въ томъ, что *Onthophagus felschei* Rtttr.=*O. oreas* Mén.,—сомнѣніе напрасное, такъ какъ установившій эту синонимію г. Олсуфьевъ имѣлъ передъ глазами оригинальные экземпляры, послужившіе для описанія Ménétries; 585: попытка доказать, что *Cyrtotriplax jakowlewi* Sem. 1898=*C. subbasalis* Rtttr. 1896 (замѣтимъ кстати, что такого вида не существуетъ, а есть лишь *Cyrtotriplax bipustulata* F. var. *subbasalis* Rtttr. 1896) и предложеніе удержать за этимъ видомъ названіе *C. subbasalis* Rtttr., съ чѣмъ мы позволимъ себѣ не согласиться и къ чему вернемся въ специальной замѣткѣ; 588: указаніе мѣстонахожденія *Geodromicus lestevoides* Rtttr. 1900 („Бухара“; гдѣ?); 592: отождествленіе *Lochmacea ornaticollis* Rtttr. 1900 и *Diorrhabda rickmersi* Wse. 1900 (остается неяснымъ, за какимъ названіемъ нужно признать приоритетъ и къ какому роду долженъ быть отнесенъ видъ).

Reitter, Edm. Ueber *Throscus*-Arten mit ganz ungetheilten Augen, aus der Gruppe des *brevicollis* Bonv. [Wiener Entomologische Zeitung, XX. Jahrg., III. Heft, 1901 (März), p. 60].

Опредѣлительная табличка 3-хъ охарактеризованныхъ въ заглавіи видовъ р. *Throscus* Latr.: *Thr. laticollis* Rybinski 1896, *Thr. dilatatus*, sp. n., и *Thr. brevicollis* Bonv. Первый изъ этихъ видовъ принадлежитъ къ интереснѣйшимъ находкамъ М. Рыбинск'аго которыми такъ богаты сборы этого энтомолога въ Галиціи; видъ этотъ, очевидно, встрѣчается и въ предѣлахъ Рос-

си, почему на него должно быть обращено особое вниманіе русских энтомологовъ; *Throscus dilatatus* Rtt. описывается какъ новый изъ долины Аракса у Ордубада.

Reitter, Edm. Ueber die turkestanischen Arten der Coleopteren-Gattung *Laena* Latr. [Wiener Entomologische Zeitung, XX. Jahrg., III. Heft., 1901 (März), pp. 61—63].

Опредѣлительная табличка для слѣдующихъ „туркестанскихъ“ видовъ рода *Laena* Latr.: *L. dilutella* „Erschoff“ (встрѣчающаяся, по Reitter'у, кромѣ зап. Туркестана и Бухары также бл. Асхабада), *L. hirtella* „Erschoff“ (Кокандъ), *L. bifoveolata* Rtt. (Гань-су!), *L. dentitibia*, sp. n. („Бухара“; гдѣ?), *L. turkestanica* Rtt. (Маргеланъ), *L. brevipennis*, sp. n. (Вѣрный, Алтай, д. б. Заилійскій?), *L. robusta* Rtt. (Самаркандъ); послѣдніе 3 вида составляютъ подродъ *Catolaena* Rtt. Замѣтимъ по этому поводу слѣдующее: 1) виды жесткокрылыхъ, приписываемые заграничными энтомологами Ершову, описаны на самомъ дѣлѣ Сольскимъ, въ посмертномъ трудѣ, изданномъ лишь подъ редакціей покойнаго Ершова; 2) Гань-су есть провинція Китая, ничего общаго съ Туркестаномъ не имѣющая; 3) указанія вродѣ „Вучага“, въ виду разнообразія рельефа и физико-географическихъ условій въ Бухарскомъ ханствѣ, совершенно неудовлетворительны; гг. иноземные энтомологи оказываютъ намъ плохую услугу, вводя въ литературу массу неточныхъ, а отчасти и ошибочныхъ данныхъ о распространеніи насѣкомыхъ нашей фауны.

Reitter, Edm., Uebersicht der Arten der Coleopteren-Gattung *Triplax* Payk. aus Europa und den angrenzenden Ländern. [Wiener Entomologische Zeitung, XX. Jahrg., IV. Heft, 1901 (April), pp. 73—76].

Опредѣлительная таблица 24 палеарктическихъ видовъ названнаго рода семейства *Protylidae* съ одними лишь общими, болѣею частью весьма неточными указаніями географич. распространенія и почти безъ всякихъ ссылокъ на литературу; авторъ не упоминаетъ почему-то также ни словомъ о существованіи подрода *Platichna* Thoms., Ganglb., который соответствуетъ его III-й группѣ. Въ этой таблицѣ впервые характеризуются (кратко) слѣдующія новыя формы: *Triplax apicipennis*, sp. n. (Кавказъ: Сурамскій перевалъ), *Tr. subtilissima*, sp. n. (Алтай, безъ указанія, гдѣ) и *Tr. rufipes* F. var. ? *swanetica* (Кавказъ и Славонія). Родъ этотъ въ русской фаунѣ представленъ довольно богато.

Reitter, Edm. Uebersicht der Arten der Coleopteren-Gattung *Strangalia* Serv. aus der Verwandtschaft der *St. melanura* L. und *bifasciata* Müll. [Wiener Entomologische Zeitung, XX. Jahrg., IV. Heft, 1901 (April), pp. 77—80].

Краткій обзоръ въ видѣ діагностической таблицы 25 формъ названной въ заглавіи группы, изъ которыхъ многія представлены въ русской фаунѣ или даже исключительно ей свойственны. Къ сожалѣнію, и эта работа имѣетъ слишкомъ конспективный и предварительный характеръ; въ ней, напр., вполне отсутствуютъ ссылки на литературу, нигдѣ не указаны измѣренія, во многихъ случаяхъ расы (subspecies) не отличены отъ разновидностей, а географическія данныя слишкомъ общи. Въ такомъ видѣ работа имѣетъ мало научнаго значенія, преслѣдуя исключительно практическія цѣли. Въ качествѣ новыхъ кратко и недостаточно охарактеризованы (въ таблицѣ) слѣдующія формы: *Strangalia pubescens* F. var. *perobscura* n. (зап. Европа), *Str. melanura* L. var. *rubellata* (sic!) n. (Испанія) и var. *melanurella* n. (Сибирь: Усть-Вилюйскъ и центр. Алтай), *Str. novercalis*, sp. n. (центральный и западный Кавказъ, русско-армянское нагорье), *Str. jägeri* Humm. var. *fenestrata* n. (Кубанск. обл.). Въ заключеніе замѣтимъ, что *Strangalia* Serv. принято считать только за подродъ рода *Lepidura* L.

Reitter, Edm. Uebersicht der *Coeliodes*-Arten aus dem Coleopteren-Subgenus *Cidnorrhinus* Thoms. [Wiener Entomologische Zeitung, XX. Jahrg., IV. Heft, 1901 (April), pp. 86—88].

Дихотомическая табличка для различенія 5 видовъ названной группы, изъ которыхъ 4 принадлежатъ русской фаунѣ, и описаніе (отдѣльно) двухъ новыхъ среди нихъ видовъ: *Cidnorrhinus kaufmanni*, sp. n. (изъ Венгріи; Scabolics) и *C. rhinoncoides* (изъ Александровскаго хребта у Токмака).

Какъ видно изъ разбора послѣднихъ работъ неутомимаго австрійскаго энтомолога, главный источникъ неописанныхъ еще формъ—русская фауна.

Шрейнеръ, Я. Ѳ. Наблюденія надъ оленкой или мохнатой бронзовкой (*Epicometis hirta* Poda). [Труды Русскаго Энтомологическаго Общества XXXV, № 1—2, 1901, стр. XXIV—XXVI] (по отд. оттиску, появивш. въ мартѣ 1901 г.).

Наблюденія, произведенныя въ Верхнеднепровскомъ у. Ека-

теринославской губ. лѣтомъ 1899 г., надъ личиночной и кукольной стадіями названнаго жука и временемъ появленія его imago.

Sumakow, A. Species novae generis *Donacia* F. a b. — Сумаковъ, А. Новый видъ изъ рода *Donacia* F. a b. [Протоколы засѣданій Общества Естествоиспытателей при Юрьевскомъ Университетѣ, XII, 3, 1901 (по отд. оттиску, появивш. въ январѣ 1901 г.)].

Обстоятельное описаніе (по-латыни и по-русски) новой *Donacia transcaucasica* (♂) изъ Батума и дихотомическая табличка, выясняющая отличія новаго вида отъ близкихъ формъ; въ описаніи новая *Donacia* сравнивается съ *D. bactriana* W se. Автору остались, какъ кажется, неизвѣстными новые виды рода *Donacia*, описанные недавно гг. Я ко б со н о м ъ (Ежегодн. Зоол. Муз. Имп. Акад. Наукъ, 1899, стр. 1—8) и Weise (Arch. f. Naturgesch., 1898, I, 2, pp. 177—179).

Тарнани, И. К. Паразиты майскаго хруща (*Melolontha vulgaris* F.). (Предварительное сообщеніе). [Труды Русскаго Энтомологическаго Общества, XXXV, № 1—2, 1901, стр. LXIX—LXX] (по отд. оттиску, появивш. въ сентябрѣ 1901 г.).

Краткое сообщеніе о наблюденіяхъ надъ паразитизмомъ, въ личинкахъ *Melolontha melolontha* L. (*vulgaris* F.), личинокъ мухъ: *Dexia rustica* F., *D. vacua* Fall. и *D. canina* F., изъ которыхъ двѣ послѣднія не были еще извѣстны какъ паразиты майскаго хруща.

Tschitschérine, T. Genera des Harpalini des régions paléarctique et paléanarctique. [Horae Societatis Entomologicae Rossicae; XXXV, № 1—2, 1901, pp. 217—251 (по отд. оттиску, появивш. въ апрѣлѣ 1901 г.)].

Въ прошломъ (1900) году появился „Mémoire sur la tribu des Harpalini“ того-же автора (Horae Soc. Ent. Ross., XXXIV, pp. 335—370), представляющій критическую ревизію классификаціи названной группы сем. *Carabidae*; въ этой работѣ авторомъ были впервые указаны существенные признаки для установленія группъ низшаго порядка (subtribus), всѣ извѣстные роды расположены въ 9 такихъ группъ, а многіе роды впервые точно очерчены и охарактеризованы, при чемъ впервые выяснилось естественное

положеніе отдѣльныхъ родовъ въ системѣ и ихъ генетическія отношенія. Новый трудъ автора представляетъ переработку,—точнѣе новое, улучшенное изданіе прошлогодняго мемуара. Автору удалось за послѣднее время пересмотрѣть цѣлый рядъ видовъ, бывшихъ ему раньше неизвѣстными въ натурѣ, и на основаніи этого окончательно установить положеніе въ системѣ нѣсколькихъ родовъ. Существеннымъ улучшеніемъ въ очеркѣ системы группы (tribus) *Harpalini* является разработка родовъ группы (subtribus) *Ditomini*, для которыхъ дана обстоятельная аналитическая таблица, а также подро́довъ громаднаго и полиморфнаго рода *Harpalus* (Latr.) Tschitsch., также разобранныхъ въ таблицѣ; кромѣ того введены въ обзоръ роды *Platymetopus* Dej. и *Oxycentrus* Chd., имѣющіе по 1 представителю въ палеанарктической фаунѣ, родъ *Dichirotrichus* J.-Duv. сближенъ съ родомъ *Trichocellus* Ganglb., Tschitsch., что и намъ представляется вполне правильнымъ, роды *Tachycellus* A. Mor. и *Tetraplatus* Tschitsch. приняты въ новомъ объемѣ, а родъ *Asmerinx* Tschitsch. признанъ подро́домъ р. *Trichotichnus* A. Mor. Вновь установлены роды: *Carterocarus* и *Eriocypas* (subtrib. *Ditomini*), *Pelagophilus* (subtrib. *Acupalpini*), а затѣмъ предложенъ цѣлый рядъ новыхъ подро́довъ рода *Harpalus* (sensu Tschitsch.). Въ примѣчаніяхъ описаны слѣдующіе новые виды: *Penthophonus antonowi* (Закасп. обл.), *Harpalus* (*Pseudophonus*) *cous* (Манчжурія и Японія) и *Harpalus* (*Cephalotypsis*, subg. n.) *semenowi* (с.-в. Тибетъ), а также новый родъ *Liocellus* (subtrib. *Acupalpini*), свойственный неарктической фаунѣ.

Въ такомъ видѣ разсмотрѣнная работа является между прочимъ надежнѣйшимъ опредѣлителемъ родовъ *Harpalini* палеарктической и палеанарктической фаунъ, а, слѣдовательно, и всѣхъ русскихъ родовъ группы *Harpalini*, находившейся въ полномъ запущеніи до самаго послѣдняго времени.

Xambeau, capitaine. Mœurs et métamorphoses des Insectes. [Revue d'Entomologie, publiée par la Société Française d'Entomologie, XX, 1901, № 2, pp. 13—44].

Продолженіе статьи, начатой въ предъидущемъ № того-же журнала. Первые стадіи и нѣкоторыя черты изъ жизни слѣдующихъ видовъ жуковъ: *Dermestes undulatus* Brahm., *Chlaenius fulgidicollis* Duf., *Magdalinus cerasi* L., *Cryptophagus subdepressus* Gyll., *Sisyphus schaefferi* L., *Smicronyx cyaneus* Gyll. var. *lallemandi* Faust, *Ochthebius quadricollis* Muls., *Heliopathes abbreviatus* Oliv., *Aphodius merdarius* F., *Agrilus solieri* Cast., *Aphodius vernus* Muls., *Cryptophagus scanicus* L., *Dorcus parallelepipedus* L., *Amphimallus rufescens* Latr., *Limonius minutus* L., *Brachyderes lusitanicus* F., *Bolboceras gallicus* Muls., *Malacogaster*

passerinii Bassi, *Carpophilus hemipterus* L., *Labidostomis longimana* L., *Osmoderma eremita* Scop., *Quedius laevigatus* Gyll.

А. Семеновъ (С.-Петербургъ).

H y m e n o p t e r a.

Kohl, Franz Friedrich. Zur Kenntniss der paläarktischen *Diodontus*-Arten. [Verhandlungen der k. k. zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien, LI, 2. Heft, 1901 (März), pp. 120—134, tab. II].

Подробное описаніе новыхъ и малоизвѣстныхъ видовъ этого рода (среди нихъ только одинъ,—*Diodontus parvulus* Rad.,—изъ русской фауны) и обстоятельная аналитическая таблица 13 извѣстныхъ автору палеарктическихъ видовъ рода *Diodontus* Curt., который имѣетъ въ фаунѣ Россіи не менѣе 6 представителей. На приложенной таблицѣ изображены характерныя части описанныхъ видовъ.

Kokujew, N. *Celor semenowi*, gen. et sp. nov. (Hymenoptera, Ichneumonidae). [Horae Societatis Entomologicae Rossicae, XXXV, № 1—2, 1901, pp. 210—216 (по отд. оттиску, появивш. въ апрѣлѣ 1901 г.)].

Подробное описаніе (на латинск. и русск. языкахъ) представителя весьма интереснаго новаго рода группы *Ophionidae*, найденнаго, къ сожалѣнію въ одномъ только экземплярѣ, пишущимъ эти строки въ 1888 г. въ пескахъ Закаспійской области (Репетекъ).

Konow, Fr. W. p. Eine neue Tenthredinide aus Norwegen (Hym.). [Zeitschrift für systematische Hymenopterologie und Dipterologie, I. Jahrg., 2, 1901, p. 92].

Описаніе *Lygaeonematus strandi*, sp. n. изъ Норвегіи; видъ этотъ можетъ со временемъ найтись и на сѣверѣ Россіи.

Konow, Fr. W. p. Revision der Nematiden-Gattung *Pontania* Costa (Hym.). [Zeitschrift für systematische Hymenopterologie und Dipterologie, I. Jahrg., 2, 1901, pp. 81—91].

Аналитическая таблица видовъ рода *Pontania* Costa и кри-

тическія замѣтки объ отдѣльныхъ видахъ, при чемъ описываются и новые виды. Статья еще не окончена.

Konow, Fr. W. p. Systematische Zusammenstellung der bisher bekannt gewordenen *Chalastogastra* (Hymenopterorum subordo tertius), bearbeitet von. [Zeitschrift für systematische Hymenopterologie und Dipterologie, I, Jahrg., 2, прилож. съ особ. пагинаціей].

Продолженіе опредѣлительной таблицы до сихъ поръ извѣстныхъ личинокъ *Tenthredonidea*.

Kriechbaumer, Dr. Bemerkungen über Ophioniden. Fortsetzung. [Zeitschrift für systematische Hymenopterologie und Dipterologie, I. Jahrg., 2, 1901, pp. 73—79].

Продолженіе уже прореферированной статьи.

А. Семеновъ (С.-Петербургъ).

L e p i d o p t e r a.

Draudt, M. Die Raupe von *Eupithecia conterminatana* Z. [Deutsche Entomologische Zeitschrift herausgeg. v. d. Gesellschaft Iris Zu Dresden, Jahrgang 1900, 2. lepidopterolog. Heft, 1901 (Februar), pp. 161—188].

Описаніе раннихъ стадій названной въ заглавіи бабочки по наблюденіямъ въ Вост. Пруссіи.

Kennel, J., Professor Dr. Neue Wickler des palaearctischen Gebietes aus den Sammlungen der Herren O. Staudinger und A. Bang-Haas. [Deutsche Entomologische Zeitschrift herausgegeben von der Gesellschaft Iris zu Dresden, Jahrgang 1900, 2. lepidopterolog. Heft, 1901 (Februar), pp. 205—305].

Подробное и обстоятельное описаніе (по-нѣмецки) 114 новыхъ палеарктическихъ видовъ сем. листовертокъ (*Tortricidae*); изъ нихъ слѣдующіе принадлежатъ фаунѣ Россіи: *Rhacodia staudingeri* (Су-

чанъ, ю. ч. Приморск. обл.), *Rh. paradiseana* („Амуръ“), *Rh. (Teras) pretiosana* („Baranowsky“¹⁾), *Rh. (T.) excusana* (Сучанъ), *Dichelia* (? *Capua*) *illotana* (то-же), *D. inconditana* (то-же и Уссурй), *Dichelia* или *Capua* (sic) *foederatana* (Владивостокъ), *Cacoecia capsigerana* (о. Аскольдъ), *C. critica* („Амуръ“), *C. evanidana* (о. Аскольдъ), *C. disparana* (Сучанъ и Хабаровскъ²⁾), *C. micantana* (Уссурй), *Pandemis inopinatana* (о. Аскольдъ), *Tortrix arquatana* (то-же), *T. perpulchrana* („Biskin“¹⁾), *T. congruentana* (о. Аскольдъ), *Cnephasia (Sciaphila) marcidana* (Курукъ-дагъ), *Cn. personatana* (верхн. теч. Амура), *Conchylis ineptana* (то-же), *C. suppositana* („Амуръ“), *Euxanthis uncinatana* (Маргеланъ), *E. meridiolana* (Маргеланъ, Наманганъ), *E. declivana* („Помпеевка“, безъ объясненія, гдѣ; д. б. въ южн. ч. Приморск. обл.), *Phtheochroa dilectana* (Сарепта, Саратов. губ.), *Penthina crassiveniana* (Уссурй), *P. semiassana* (ю. ч. Приморской обл.), *P. lutosana* (Маргеланъ), *P. perspicuana* (Владивостокъ, Аскольдъ), *P. purpurissatana* (Сучанъ), *P. cuscuminana* (то-же), *P. dolosana* (то-же), *P. ineptana* (Аскольдъ, „Амуръ“), *P. fraudulentana* („Амуръ“), *P. electana* (Сучанъ), *Acrolita exartemana* (о. Аскольдъ), *Steganoptycha corpulentana* (Сучанъ, Уссурй), *Palatea confictana* (Александровскій хреб.), *Bactra (Aphelia) fumosana* (Маргеланъ), *Semasia fraudulentana* (Алатау; который?), *S. affectana* („южн. Кавказъ“), *S. bactrana* (Маргеланъ, но также и Малага [?]), *Epiblema succineana* (Маргеланъ), *E. chanana* (Алай), *E. evermanni* (Еленендорфъ въ Закавказьи, Узгентъ въ Туркестанѣ и Улясутай въ сѣв. Монголіи), *E. (?) arheliana* (Сарепта, Саратов. губ., и р. Лепса въ Семирѣчьи), *E. coagulana* („ю. Кавказъ“=повидимому турецкій Курдистанъ), *E. haberhameri* (Наманганъ), *E. denigratana* (Сучанъ), *E. inignana* (Благовѣщенскъ на Амурѣ), *E. angulatana* (Сучанъ), *E. (?) pentagonana* (то-же), *E. banghaasi* (то-же), *E. (?) infuscatana* („ю. Кавказъ“), *Grapholitha adjunctana* (Кульджа, Маргеланъ, Красноводскъ, Амазія), *Gr. hamatana* („Амуръ“), *Pammene petulantana* („Амуръ“), *P. (Phthoroblastis) glaucana* (о. Аскольдъ), *Ancylix (Phoxopteryx) repandana* („Амуръ“), *Dichrorampha cancellatana* (то-же), *Lipoptycha sericana* (Ахалцыхъ въ Закавказьи); кромѣ того описаны: *Pandemis praefloratana*, *Tortrix accuratana*, *T. fucosana*, *Semasia malitiosana*, *Epiblema disquei* изъ Улясутая въ сѣв. Монголіи, *Epiblema idotatana* изъ Кульджи и переописана амурская *Eudemis lascivana* Chr., принадлежащая къ роду *Acroclita* Ld.

¹⁾ Ничего не говорящее обозначеніе мѣстонахожденія!

²⁾ Въ энтомологическомъ мірѣ повидимому далеко не всѣмъ извѣстно, что главный городъ Приморской области давно переименованъ изъ Хабаровки въ Хабаровскъ.

Pagenstecher., A., Dr. Libytheidae. (Das Tierreich. Eine Zusammenstellung und Kennzeichnung der rezenten Tierformen, 14. Lieferung), Berlin, Februar 1901.

14-й выпускъ капитальнаго изданія, предпринятаго Нѣмецкимъ Зоологическимъ Обществомъ вмѣстѣ съ Прусскою Академіею Наукъ въ Берлинѣ, заключаетъ въ себѣ полную, хотя, согласно плану изданія, и сжатую, обработку семейства чешуекрылыхъ *Libytheidae*, занимающую IX+18 страницъ текста in 8° maj. съ 4 рисунками. Всего въ этой работѣ охарактеризовано 10 видовъ единственнаго, составляющаго семейства, рода *Libythea* F. съ нѣкоторымъ количествомъ расъ и разновидностей; родъ этотъ, какъ извѣстно, представленъ въ русской, равно какъ и во всей палеарктической фаунѣ однимъ только видомъ—*Libythea celtis* (F ü s s l.), встрѣчающимся у насъ на южномъ берегу Крыма и въ Закавказьи. Странно видѣть въ этой обстоятельной монографіи слѣдующую неточность: всѣ таксономическія единицы ниже вида названы здѣсь разновидностями (Varietäten), между тѣмъ какъ несомнѣнно, что по крайней мѣрѣ нѣкоторыя изъ нихъ составляютъ вполне опредѣлившіяся расы (Unterarten= subspecies),—понятіе, принятое въ другихъ выпускахъ того-же изданія.

Изъ числа до сихъ поръ появившихся выпусковъ изданія „Das Tierreich“ пока только 2 энтомологическаго содержанія: 14-й только-что разобранный и 11-й, содержащій обработку *Forficulidae* и *Hemimeridae* (Orthoptera) гг. de Borman's'a и Krauss's'a и появившійся въ концѣ прошлаго (1900) года.

Rebel, H., Dr. Neue palaearctische Tineen. [Deutsche Entomologische Zeitschrift herausgeg. v. d. Gesellschaft Iris zu Dresden, Jahrgang 1900, 2. lepidopterolog. Heft, 1901 (Februar), pp. 161—188].

Подробныя діагнозы (на нѣмецкомъ яз.) трехъ новыхъ родовъ и 34 новыхъ палеарктическихъ видовъ семейства *Tineidae*; изъ нихъ слѣдующіе виды изъ фауны Россіи: *Procalantica* (gen. n.) *ussuriensis* (Сучанъ, въ ю. ч. Приморск. обл.), *Psecadia maracandica* („Самаркандъ“), *Ps. discrepita* (Оренбургъ, изъ сбора Р. Ганзена 1892), *Ps. namangana* (Наманганъ, Haberhauer 1884), *Adela imperialis* („Амуръ“; авторъ справедливо замѣчаетъ, что видъ этотъ происходитъ вѣроятно изъ Уссурийскаго края); кромѣ того въ статьѣ описываются *Psecadia nigripedella* (E r s c h. in litt.) изъ Кульджи и *Ps. mongolica* изъ „Монголіи“, послѣдняя со слѣдующимъ оригинальнымъ обозначеніемъ: „Mongolie, Mad. Putanin“ (sic), что указываетъ на происхождение этого вида изъ сборовъ одной изъ экспедицій Г. Н. Потанина; непонятно

только, какъ онъ утратилъ заграицей тѣ точныя данныя о времени и мѣстѣ находенія, которыми всегда бывають снабжены экземпляры сбора нашего знаменитаго путешественника. Въ заключеніе описанъ еще 1 новый видъ сем. *Pterophoridae* (изъ Испаніи).

S., Dr. Otto Staudinger †. [Deutsche Entomologische Zeitschrift herausgeg. v. d. Gesellschaft Iris zu Dresden, Jahrgang 1900, 2. lepidopterolog. Heft, 1901 (Februar), pp. 341—358].

Обстоятельный, сопровождаемый фотографическимъ портретомъ, некрологъ умершаго 13 октября (н. ст.) прошлаго 1900 г. знаменитаго дрезденскаго лепидоптеролога д-ра О. Staudinger'a и полный перечень научныхъ трудовъ покойнаго, изъ которыхъ многіе, какъ извѣстно, имѣють прямое отношеніе къ русской фаунѣ.

Шемигоновъ, И. И. Вліяніе нѣкоторыхъ физическихъ и химическихъ факторовъ на жизнеспособность яичекъ шелкопряда-монашенки. (*Opneria monacha* L.). [Труды Русскаго Энтомологическаго Общества, XXXV, № 1—2, 1901, стр. LX—LXVI] (по отд. оттиску, появивш. въ апрѣлѣ 1901 г.).

Имѣющіе обще-біологическое значеніе результаты ряда интересныхъ, вполне научно поставленныхъ опытовъ надъ вліяніемъ высокихъ и низкихъ температуръ, вымачиванія въ водѣ и дѣйствія растворовъ разныхъ веществъ на жизнеспособность яичекъ шелкопряда-монашенки. Изъ опытовъ этихъ оказывается, что безусловно губительно на яички монашенки дѣйствуютъ: температура въ $+45^{\circ}$ R. и выше, вымачиваніе въ водѣ въ теченіе не менѣе 30 сутокъ и погруженіе въ растворы: карболовой кислоты въ 15⁰/о, хлористаго и ѣдкаго барія въ 20⁰/о и ѣдкаго калия въ 1¹/₂⁰/о, что будетъ имѣть безъ сомнѣнія практическое примѣненіе.

Standfuss, Max, Dr. Deux nouveaux hybrides du genre *Smerinthus* O. (Lepid.). [Bulletin de la Société Entomologique de France, 1901, pp. 86—89 (février)].

Подробное описаніе двухъ новыхъ искусственныхъ помѣсей между: 1) *Smerinthus tiliac* L. ♂ и *Sm. ocellatus* L. ♀ (= *Sm. hybr. leoniae* Stdfs.) и 2) *Sm. atlanticus* Aust. ♂ и *Sm. populi* L. ♀ (= *Sm. hybr. fringsi* Stdfs.).

А. Семеновъ (С.-Петербургъ).

D i p t e r a.

Якобсонъ, А. О подкожномъ оводѣ сѣвернаго оленя (*Hypoderma tarandi* L.). [Труды Русскаго Энтомологическаго Общества, XXXV, № 1—2, 1901, стр. L—LI] (по отд. оттиску, появивш. въ апрѣлѣ 1901 г.).

Сообщеніе, сдѣланное въ засѣданіи Русскаго Энтомологич. Общества, о прохожденіи личинками названнаго овода послѣднихъ стадій подъ кожей сѣв. оленя и о срокахъ окукленія личинокъ. Изъ наблюденій автора явствуетъ между прочимъ что выпаденіе личинокъ для окукленія непосредственно предшествуетъ линкѣ оленя, а появленіе совершеннаго насѣкомаго совпадаетъ съ тѣмъ временемъ, когда олень, вслѣдствіе потери шерсти, наиболѣе беззащитенъ отъ нападенія оводовъ.

Lichtwardt, B. *Lasiopa Königi* n. sp. ♀ (Dipt.). [Zeitschrift für systematische Hymenopterologie und Dipterologie, I. Jahrg., 2, 1901, pp. 68—69].

Описаніе названнаго въ заглавіи новаго вида, происходящаго съ Кавказа (безъ болѣе точнаго обозначенія мѣстонахожденія!) и табличка для опредѣленія самокъ европейскихъ видовъ рода *Lasiopa*.—Только недостаткомъ специалистовъ въ Россіи можно оправдать передачу новинокъ русской фауны для описанія за-границу, къ чему такъ часто прибѣгаетъ дирекція Кавказскаго Музея.

А. Семеновъ (С.-Петербургъ).

H e m i p t e r a.

Яковлевъ, В. Е. Новые виды рода *Stenocephalus* Latr. (Hemiptera-Heteroptera, Coreidae). [Horae Societatis Entomologicae Rossicae, XXXV, № 1—2, 1901, pp. 202—209 (по отд. оттиску, появивш. въ апрѣлѣ 1900 г.)].

Аналитическая табличка извѣстныхъ автору представителей рода *Stenocephalus* Latr. (по-французки), описаніе (по-русски) слѣдующихъ новыхъ видовъ этого рода: *St. bianchii* (В. Персія: Кирманъ), *St. adspersus* (Абиссинія), *St. dimidiatus* (В. Персія: Хорасанъ) и *St. robustus* (Закавказье: Ордубадъ) и списокъ палеарктическихъ видовъ съ перечисленіемъ извѣстныхъ автору мѣстонахожденій въ Россіи; въ русской фаунѣ извѣстно до сихъ поръ 9 представителей (8 видовъ и 1 раса) этого рода.

А. Семеновъ (С.-Петербургъ).

Orthoptera.

Семеновъ, Андрей. Русскіе виды родовъ *Anechura* Scudd. и *Forficula* (L.) Scudd. (Orthoptera, Forficulidae) и ихъ географическое распредѣленіе. [Horae Societatis Entomologicae Rossicae, XXXV, № 1—2, 1901, pp. 185—201] (по отдѣльному оттиску, появивш. въ апрѣлѣ 1901 г.).

Очень законченная работа заключаетъ въ себѣ отличительные признаки двухъ названныхъ родовъ, аналитическія таблицы всѣхъ русскихъ видовъ, ихъ подробную синонимію съ хронологическими ссылками на библиографію, примѣчанія и дополненія къ описаніямъ прежнихъ авторовъ и указаніе географическихъ ареаловъ разсматриваемыхъ видовъ, съ отмѣткой подробныхъ мѣстонахожденій всѣхъ сличенныхъ самимъ авторомъ экземпляровъ. Авторъ признаётъ независимымъ видомъ *Anechura orientalis* (Krauss), отличенную Bormans'омъ и Krauss'омъ лишь въ качествѣ особой расы *An. bipunctata* (F.), даетъ полную характеристику этого вида и описываетъ новую форму [*forma brachylabia* (♂) n.] *An. fedtschenkoi* (Sauss). Какъ новый для русской фауны видъ приводится *Forficula smyrnensis* Serv. 1839, бывшая пока извѣстной только съ береговъ Средиземнаго моря. По поводу *Forficula tomis* (Kol.) авторъ указываетъ на ошибку Bormans'a (1900), неправильно отождествившаго преимущественно русскую *F. hellmanni* Kitt. [= *tomis* (Kol.)] съ *F. barroisi* Bol., видомъ въ Россіи безусловно отсутствующимъ.—Въ подстрочномъ примѣчаніи (3, стр. 188) описывается чуждый русской фаунѣ новый видъ съ зап. Гималая, *Anechura zubovskii* Sem.—Конецъ работы посвященъ подробному сравнительному обзору географическаго распредѣленія приводимыхъ авторомъ видовъ.

Т. Чичеринъ (Ольгино, Влад. губ.).

Apterygota.

Снориновъ, А. С. Къ систематикѣ рода *Tomocerus* (Collembola), съ описаніемъ новаго вида изъ Вост. Россіи (съ таблицей рисунковъ). [Труды Общества Испытателей Природы при Императорскомъ Харьковскомъ Университетѣ, т. XXXV, 1901, стр. 75—82, табл. II].

Переводъ статьи, напечатанной ранѣе въ „Ежегодникѣ Зоол. Музея Имп. Акад. Наукъ“ (за 1899 г., стр. 473—480, табл. XXI) и заключающей обстоятельное описаніе новаго *Tomocerus baschki-*

ricus изъ Каповой пещеры въ южн. Уралѣ (Оренб. губ.) и опредѣлительную таблицу всѣхъ до сихъ поръ извѣстныхъ (14) видовъ рода *Tomocerus* Nic.

Скориновъ, А. С. Къ фаунѣ Collembola Шпицбергена. [Труды Общества Испытателей Природы при Императорскомъ Харьковскомъ Университетѣ, т. XXXV, 1901, стр. 85—101, съ 1 табл. рисунковъ и картой].

Переводъ работы, напечатанной ранѣе въ „Ежегодникѣ Зоол. Музея Импер. Акад. Наукъ“ (за 1900 г., стр. 190—209, табл. V и карта); она представляетъ детальную обработку сборовъ по Collembola А. А. Б и р у л и, участника русской экспедиціи для градусныхъ измѣреній на Шпицбергенѣ, съ обстоятельнымъ историческимъ очеркомъ изученія фауны шпицбергенскихъ Collembola и обзоромъ распространенія на арктическихъ островахъ представителей этого подотряда насѣкомыхъ. Главные выводы этой работы были сообщены авторомъ въ свое время Русскому Энтомологическому Обществу и напечатаны въ видѣ особой замѣтки въ „Трудахъ“ названнаго Общества, т. XXXIV, 1900, стр. XL—XLI ¹⁾).

А. Семеновъ (С.-Петербургъ).

¹⁾ Въ этомъ предварительномъ сообщеніи слѣдуетъ исправить досадную опечатку на стр. XI: именно надо читать „измѣреній“ вм. „измѣненій“.