

Замѣтка о нахожденіи въ Россіи *Konowia megarolitana*
Brauns (Hymenoptera, Siricidae).

Андрея Семенова (С.-Петербургъ).

Въ 1884 г. S. Brauns'омъ описанъ былъ подъ именемъ *Konowia megarolitana* новый родъ и видъ подсемейства *Xiphydriidae*, найденный въ единственномъ экземплярѣ пасторомъ Коповъ 27. V. 1884 въ буковомъ лѣсу близъ Neu-Strelitz'a (Mecklenburg-Strelitz)¹⁾. Это открытіе было тѣмъ болѣе интереснымъ, что подсемейство *Xiphydriidae*, состоящее, кромѣ названнаго, всего только изъ трехъ родовъ [*Xiphydria* Latr., *Derecyrtia* Smith и *Brachyxiphus* (non Phil). W. F. Kirby, Tschitsch.²⁾]³⁾ и заключающее очень немного (всего около 30), при томъ по бѣльшей части рѣзко-очерченныхъ, видовъ, является, какъ кажется, очень древнимъ элементомъ въ подотрядѣ *Chalastogastra* (s. *Tenthredonidea*) Кпв.⁴⁾

¹⁾ Brauns: Wien. Ent. Zeitg. 1884, pp. 220—222.

²⁾ См. Tschitschérine: Horae Soc. Ent. Ross., XXVIII, 1894, p. 439.

³⁾ Ср. Копов: Ent. Nachr. 1897, p. 297.

⁴⁾ Замѣчательно также, что паразитами рода *Xiphydria* Latr. являются также весьма обособленные (и въ родовомъ, и въ видовомъ отношеніяхъ), видимо, весьма древняго происхожденія, виды рода *Aulacus* Jur., положеніе котораго въ системѣ Hymenoptera Tristega (s. Ichneumonidea) (Кпв.) нельзя считать выясненнымъ окончательно [по Schletterer'у и другимъ родъ этотъ

Съ тѣхъ поръ констатировано присутствіе *Konowia megarolitana* Brauns и въ русской фаунѣ: нѣсколько лѣтъ тому назадъ И. Я. Шевыревымъ былъ сообщенъ А. И. Яковлеву 1 экземпляръ этого вида, найденный въ паркѣ Лѣсного Института въ Петербургѣ 17. VI. 1887 (экземпляръ этотъ хранится въ колл. А. И. Яковлева); кромѣ того во время завѣдыванія моего коллекціями Coleoptera и Hymenoptera Зоологическаго Музея Импер. Академіи Наукъ (1890—96) мною былъ разысканъ и определенъ другой экземпляръ этого вида петербургскаго происхожденія, повидимому изъ сборовъ въ окрестностяхъ столицы покойнаго А. Ф. Моравица (экземпляръ этотъ хранится, вѣроятно, и понынѣ въ названномъ музеѣ). Третій экземпляръ *Konowia megarolitana* петербургскаго же происхожденія (безъ указанія источника!) приводитъ въ своемъ обзорѣ подсемейства *Xiphydriidae* Копов⁵⁾. Изъ всѣхъ этихъ данныхъ я склоненъ заключить, что центръ современнаго распространенія *Konowia megarolitana* лежитъ гдѣ-нибудь въ предѣлахъ Россіи, что въ сѣв. Германіи видъ этотъ находитъ западный предѣлъ своего распространенія и что онъ найдется еще во многихъ пунктахъ Россіи, а можетъ быть и Сибири; легко можетъ оказаться при этомъ, что *K. megarolitana* принадлежитъ къ вымирающимъ, а поэтому очень рѣдко встрѣчающимся формамъ⁶⁾.

Дальнѣйшія данныя о распространеніи въ Россіи этого малоизвѣстнаго насѣкомаго очень желательны. *Konowia megarolitana* во всемъ своемъ обликѣ очень сходна съ видами рода *Xiphydria*,

принадлежитъ къ сем. *Evanidae*, по Копову составляетъ, вмѣстѣ съ родомъ *Trigonalys* Westw., особую группу (семейство?), близкую къ сем. *Braconidae*. См. Копов: Ent. Nachr. 1897, 153].

⁵⁾ Копов: Ent. Nachr. 1897, p. 310.

⁶⁾ Напомнимъ при этомъ случаѣ исторію другого не менѣе рѣдкаго и пока загадочнаго представителя того-же семейства *Tenthredinidae*. Мы разумѣемъ установленный въ 1880 г. Edm. André (Spec. Hymén. Eur., I, 1880, pp. 571, 572) родъ *Praia*, единственный видъ котораго (*Praia taczanowskii* Edm. André) былъ первоначально описанъ по одному только экземпляру (♀), найденному въ Минской губ. Съ тѣхъ поръ это рѣдчайшее насѣкомое найдено въ двухъ экземплярахъ (♂ и ♀) г. Sparre-Schneider'омъ въ арктической части Норвегіи (Polmak въ Ostfinmarken'ѣ и Bjerkeng въ Maalselven). См. H. Kiaer, Uebers. d. phytoph. Hymen. d. arkt. Norwegens (Attryk af Tromsø Museums Aarshefte, 19), Tromsø, 1898, pp. 30—32, fig. 1—9. Едвали можно сомнѣваться, что мы имѣемъ тутъ дѣло съ вымирающей формой.

но значительно меньше ихъ ростомъ, достигая въ длину лишь 8 мм. или около того, и отличается отъ нихъ уже съ перваго взгляда однообразной черной окраской всѣхъ частей тѣла; крылья у нея свѣтлыя, лишь слегка затемненныя.
