

Первый палеанарктический представитель рода *Opisthocosmia*  
H. Dohrn (Orthoptera, Forficulidae).

(Съ рис.).

Андрея Семенова (С.-Петербургъ).

---

*Opisthocosmia komarowi*, sp. n.

♂. Elongata, graciliuscula, picea, capite, elytris, forcipe, tibiis plus minusve brunneis vel brunnescens, pronoti lateribus pallidis, translucidis. Antennis unicoloribus longis, alarum squamas superantibus, ut videtur 12-articulatis<sup>1)</sup>, apicem versus sensim attenuatis, scapo magno crassoque basi attenuato, duobus sequentibus articulis fere aequilongo, his omnibus pilosiusculis, articulo 2° tertio paulo longiore, 4° secundum perparum, tertium distincte superante, 5° antecedente parum sed distincte longiore, insequentibus 5° et inter se subaequalibus. Capite laevigato, parum nitido, oculis convexiusculis, prominulis. Pronoto capite vix angustiore, lateribus levissime, basi valde rotundato, angulis anticis obtusis subrotundatisque. Elytris prothorace 1,7 latioribus, ad humeros obtusos subdilatatis, unicoloribus, laevigatis, opacis. Alarum squamis longe eminentibus, longitudine elytrorum paulo minus quam duplo brevioribus, immaculatis. Abdomine sat angusto summam latitudinem ad apicem segmenti 5<sup>i</sup> attingente, dorso rugulosim puncta-

---

<sup>1)</sup> Antennae speciminum nostrorum haud plane intactae sunt.


to, medio ad apicem sensim laeviore, segmentis 4° et 5° utrinque lateraliter ad marginem posticum tuberculo acuto, in illo minuto, in hoc majusculo, armatis, segmento ultimo lateribus subparallelo, medio et utrinque ad marginem posticum late impresso, impressione mediâ utrinque callo nitido limitatâ, margine postico nonnihil flexuoso utrinque extrorsum obliquato; ventre punctato-rugoso, subcoriaceo, breviter pubescenti, laminâ subgenitali apice late rotundatâ. Forcipsis cruribus basi sat late distantibus, longis, longitudinem abdominis nullo superantibus, gracilibus, in dimidio basali vix, pone medium sensim regulariterque incurvis, in quadrante basali superne processu valido corniformi a basi distante, sursum et vix retrorsum directo instructis, mox ante medium interne dente majusculo spiniformi introrsum spectante armatis, margine interiore toto dimidio basali (ad dentem anteriorem usque) laxè asperato-denticulato, extus pilosiusculis, apice simpliciter incurvis acuminatisque. Femoribus longitudinem elytrorum fere aequantibus; tarsorum posticorum articulo 1° secundo duplo fere longiore, omnium art. 2° valde patelliformiter dilatato.

♀. Differt a ♂ formâ debiliore, abdomine ad apicem segmenti 5i minus dilatato, hoc utrinque tuberculo minutissimo instructo, segmento ultimo ad apicem angustato, solum medio ad marginem posticum perparum impresso, forcipis cruribus simplicibus tenuibusque, longitudinem abdominis manifeste superantibus, inter se cohaerentibus, apice breviter curvatis.

Long. total. ♂ 20,5, ♀ 18,5, forc. ♂ 7,9, ♀ 6,6 mm.

*Corea septentr.*: vallis Sadegü (Wl. Komarow! 25. VIII. 1897). — Duo specimina (1 ♂, 1 ♀) (coll. P. Semenov).

Species elegans, ab omnibus congeneribus facile distinguenda imprimis structurâ forcipis et abdominis ♂; in honorem praestantis botanici, qui eam detexit, nominata.



Ultima segmenta abdominis et forceps  
(aspectu desuper)



Abdominis apex et forceps  
(aspectu a latere)

*Opisthocosmia komarovi* Sem. ♂.

Бывшіе до сихъ поръ извѣстными виды рода *Opisthocosmia* Н. Dohrn<sup>2)</sup> распредѣлены слѣдующимъ образомъ: 14 видовъ принадлежать индо-малайской области, достигая въ сѣверномъ направленіи Бирмы и Филиппинскихъ о-вовъ (Люсонъ), 1 видъ (*O. nova* Vogt.) водится на Мадагаскарѣ и 1 (*O. americana* Vogt.) принадлежитъ фаунѣ центральной Америки (найденъ до сихъ поръ въ Мексикѣ и въ обл. верхн. теч. Амазонской рѣки). Такимъ образомъ нахождение представителя этого рода въ сѣв. Корей—фактъ весьма интересный. Распространеніе видовъ р. *Opisthocosmia* вполне, впрочемъ, гармонируетъ съ распредѣленіемъ представителей нѣкоторыхъ родовъ жесткокрылыхъ, напр. *Galerita* F., *Colpodes* Mac-Leay, *Cupes* F., *Sagra* F., *Planetes* Mac-Leay, *Callinomes* Motsch., *Helota* Mac-Leay, также имѣющихъ представителей въ Корей и придающихъ фаунѣ послѣдней, особенно сѣверной ея части, наиболѣе рѣзко выраженный характеръ *палеонарктической* области<sup>3)</sup>.

Послѣ открытія вида *Opisthocosmia* въ сѣв. Корей можно ожидать нахожденія представителей этого рода въ Китаѣ и Японіи.

---

<sup>2)</sup> См. Vogtman in Vogtman & Krauss, Das Tierreich, 11, Forficulidae u. Hemimeridae, 1900, pp. 93—99.

<sup>3)</sup> Cf. А. Семеновъ: Horae Soc. Ent. Ross., XXXII, 1899, pp. 571—580.