

Обзоръ литературы, касающейся русской фауны.

Въ этомъ отдѣлѣ разсматриваются только такія работы, которыя имѣютъ непосредственное отношеніе къ энтомологической фаунѣ Россіи. Гг. авторы приглашаются, для своевременнаго появленія рефератовъ ихъ работъ, особенно отдѣльно изданныхъ, присылать таковыя **Андрею Петровичу Семенову** по адресу: С.-Петербургъ, В. О., 8 лин., 39.

Il ne sera tenu compte, dans cette partie, que des ouvrages ayant un rapport quelconque à la faune entomologique de la Russie. En vue de la publication rapide des analyses MM. les auteurs sont priés de bien vouloir adresser un tirage de leurs écrits, et notamment les mémoires publiés séparément, à M. **André Semenow**, Wass. Ostr., 8^e ligne, 39, à St-Petersbourg.

I n s e c t a.

Zichy Jenő gróf harmadik ázsiai utazása. II. kötet. Zichy Jenő gróf harmadik ázsiai utazásának állattani eredményei szerkesztette Dr Horváth Géza.—Dritte asiatische Forschungsreise des Grafen Eugen Zichy. Band II. Zoologische Ergebnisse der dritten asiatischen Forschungsreise des Grafen Eugen Zichy, redigirt von Dr G. Horváth. Mit 28 Tafeln und 22 Textfiguren. Budapest u. Leipzig. 1901. in 4^o maj. (XLI+470 pag.; 28 tab. partim color.).

Этотъ роскошно изданный томъ заключаетъ въ себѣ обработку нѣсколькими (преимущественно венгерскими) специалистами зоологическаго матерьяла, собраннаго въ разныхъ пунктахъ востока Европ. Россіи, Сибири и Монголіи Е. Csiki, зоологомъ при III-й венгерской археологической экспедиціи графа Евгенія

Зичи въ глубь Азіи. Сообщаемъ краткій маршрутъ этой экспедиціи, необходимый для оцѣнки ея зоологическихъ результатовъ. Выѣхавъ изъ Будапешта 12. III. 1898, экспедиція двигалась съ остановками слѣдующимъ образомъ: Батумъ (23. III); Тифлисъ (25. III—15. IV); черезъ Баку въ Астрахань; Астрахань (до 1. V); Царицынъ (3—5. V); Саратовъ (8—24. V); Казань (28. V—16. VI); Пермь (19—22. VI); Екатеринбургъ (24—27. VI); [оз. Балтымъ къ С. отъ Екатеринбурга (24—26. VI)]; черезъ Тюмень по Турѣ и Тоболу въ Тобольскъ [экскурсіи: Яровская (28. VI) и Хмѣлевъ (Хмѣлевка?) на Тоболѣ, недалеко отъ впаденія Туры (29. VI)]; Тобольскъ (30. VI—4. VII); черезъ Тару (9. VI) въ Омскъ; Омскъ (11—14. VII); Томскъ (16—23. VII) [экскурсія: Трояновъ городокъ (21. VII)]; Красноярскъ (25. VII); по Енисею въ Минусинскъ [экскурсія: Сорокино (27. VII)]; Минусинскъ (29. VII—2. VIII); по Енисею въ Красноярскъ [экскурсіи: Абаканское (2. VIII) и р. Убей (3. VIII)]; Красноярскъ (3—9. VIII); ст. Иланская (10—11. VIII), ст. Замзоръ (12. VIII), ст. Тулунъ (13. VIII), ст. Зима на р. Окѣ (14. VIII), ст. Тельма (15. VIII); Иркутскъ (16—20. VIII); Лиственничная на Байкалѣ (21. VIII), Селенга (23. VIII) [экскурсіи: Таракановъ и Монастырскъ (24. VIII), Бурдуково и Верхнеудинскъ (25. VIII), Кибалино (26. VIII)], Ново-Селенгинскъ (26—27. VIII); Троицкосавскъ (28. VIII—3. IX); Урга (7—11. IX); черезъ Гоби на Калганъ; Калганъ (24—25. IX); Пекинъ (30. IX—22. X); оттуда экспедиція вернулась моремъ назадъ въ Европу.

Введеніе, заключающее общій очеркъ путешествія, изложено, такъ-же какъ и предисловіе, параллельно на языкахъ венгерскомъ и нѣмецкомъ; всѣ описанія и замѣтки въ специальной систематической части также написаны на двухъ языкахъ: венгерскомъ и, параллельно, на латинскомъ, нѣмецкомъ или французскомъ.

Списокъ собранныхъ животныхъ съ точнымъ указаніемъ мѣстонахожденій, бѣльшая часть которыхъ находится въ предѣлахъ Россіи, включаетъ 2532 вида, изъ коихъ 2348 приходится на долю членистоногихъ, а изъ нихъ 2067 видовъ насѣкомыхъ.

Списокъ Coleoptera, въ обработкѣ самого Е. Csiki, является самымъ богатымъ, заключаая 832 вида (+ 64 разновидности); изъ нихъ изъ предѣловъ Кавказа показано 74 вида, изъ предѣловъ Евр. Россіи—45 видовъ, изъ Сибири*)—381 в., изъ Монголіи—72 и изъ Китая—27 видовъ. Въ качествѣ новыхъ описываются слѣдующіе 13 видовъ и 6 разновидностей изъ Россіи: *Carabus henningi* Fisch. W. var. *roeschkei* n. (З. Сибирь: р. Убей при впад. въ Енисей м. Красноярскомъ и Минусинскомъ) и var. *sajanica* n. (Минусинскъ и Убей), *Nebria livida* L. var. *sibirica* n.

*) Екатеринбургъ принимается авторомъ лежащимъ уже въ Сибиря.—А. С.

(З. Сиб.: р. Тура ниже Тюмени), *Bembidium* (*Peryphus*) *postae*, sp. n. (тамъ-же), *Tachyporus hypnorum* F. var. *atrata* n. (Тифлисъ), *Platystethus volgensis*, sp. n. (Царицынъ!), *Brachypterus sibiricus*, sp. n. (Зап. Сиб.: Омскъ!), *Dapsa* (*Phylira*) *horvathi*, sp. n. (З. Сиб.: Убей на Енисей!), *Onthophagus transbaicalicus*, sp. n. (В. Сиб.: Троицкосавскъ), *Anthicus astrachanicus*, sp. n. (видъ близкій къ *A. antherinus* L.) (Астрахань), *Leptura 6-maculata* L. var. *nigra* n. (З. Сиб.: Красноярскъ), *Liopus ganglbaueri*, sp. n. (З. Сиб.: Убей на Енисей!), *Chrysomela distans*, sp. n. (В. Сиб.: Усть-Кяхта, Троицкосавскъ), *Chr. urbana*, sp. n. (З. Сиб.: Трояновъ городокъ бл. Томска!)*), *Galerucella sibirica*, sp. n. (В. Сибирь: ст. Зима на р. Окъ), *G. jakowleffi*, sp. n. (тамъ-же), *Haltica sajanica* (З. Сиб.: Минусинскъ!), *H. sibirica*, sp. n. (Зап. Сиб.: Томскъ!), *Aplithona semicyanea* All. var. *atra* n. (З. Сиб.: Минусинскъ). Кромѣ того описаны слѣдующія новыя формы жесткокрылыхъ изъ Монголіи и Китая: *Bembidium* (*Pekinium*, subg. n.) *chinense*, sp. n. (Пекинъ), *Plybius chinensis*, sp. n. (тамъ-же), *Tachinus mongolicus*, sp. n. (Монголія: Хара-голь), *Philonthus lepidus* Grav. var. *mongolica*, n. (тамъ-же), *Philonthus bernhaueri*, sp. n. (Пекинъ), *Stenus pekinensis*, sp. n. (тамъ-же), *Hister czikanni*, sp. n. (С. Китай: Чантай), *Aphodius* (*Melinopterus*) *burgaltaicus*, sp. n. (Монг.: Бургалтай), *A.* (*Phaeaphodius*) *zichyi*, sp. n. (Монг.: Бургаста), *A.* (*Melinopterus*) *melchelyi*, sp. n. (Монг.: Бургалтай), *A.* (*Melinopterus*) *roschlapi*, sp. n. (тамъ-же), *Sphenoptera zichyi*, sp. n. (Монг.: Гоби: Саиръ-усу и Тугурюкъ), *Anatolica sulcipennis* Rtttr., sp. n. (описание принадлежит Е. Reitter'у) (Монг.: Баянъ-бильхъ), *Trigonoscelis zichyi*, sp. n. (Монг.: Гоби: Наранъ), *Tr. reitteri*, sp. n. (Монг.: Гоби: Бомботу), *Gonocephalum reitteri*, sp. n. (Монг.: Баянъ-бильхъ), *Melanesthes mongolica*, sp. n. (тамъ-же), *M. heydeni*, sp. n. (тамъ-же), *Anthicus kuthyi*, sp. n. (Монг.: Урга), *A. dachuricus* (sic) (Монг.: Урга, Хараголь), *A. schischmareffi*, sp. n. (Монг.: Хара-голь, Урга), *Tychius mongolicus*, sp. n. (Монг.: Урга), *Neodorcadion zichyi*, sp. n. (Монг.: Гоби: Наранъ), *Chrysomela muralis*, sp. n. (С. Китай: Калганъ), *Chr. teichophila* (rectius: *teichophila*!), sp. n. (тамъ-же), *Sternoplatys weisei*, sp. n. (Монг.: Урга), *Adimonia mongolica*, sp. n. (тамъ-же). Считаемо необходимымъ замѣтить, что нѣкоторые изъ этихъ новыхъ видовъ жуковъ описаны неудовлетворительно (напр. виды *Chrysomela*, *Anthicus*). — На основаніи изученія ряда экземпляровъ *Cymindis* изъ Забайкалья и Монголіи авторъ приходитъ къ заключенію, что *Cym. pilosissima* Rtttr. 1894 = *marginalis* Motsch. 1864, такъ-же какъ *Cym. semivittata* Chaud. 1850 суть только разновидности *Cym. binotata* Fisch. W. 1820. — Самая интересная въ зоогеографиче-

*) Отмѣтимъ, что автору были еще неизвѣстны послѣднія работы Г. Якобсона. — А. С.

скомъ отношеніи находка по жесткокрылымъ это безспорно—*Carabus menetriesi* Humm., найденный Sziki въ предѣлахъ Западной Сибири на самомъ берегу нижн. теченія Тобола (подъ бревнами), недалеко отъ впаденія въ него р. Туры. Находка эта, продвигая восточную границу распространенія этого рѣдкаго вида, показываетъ, что пишущій эти строки напрасно сомнѣвался въ сибирскомъ происхожденіи экземпляра *C. menetriesi*, хранящагося въ Зоол. Музеѣ Акад. Наукъ съ этикеткой „Sibiria“ *). Затѣмъ особаго вниманія заслуживаютъ слѣдующія находки изъ жесткокрылыхъ: *Corsyra fusula* Fisch. W. (Саратовъ), *Cymindis faldermanni* Chaud. (Минусинскъ), *Necrophorus antennatus* Rtt. (Саратовъ), *Silpha (Thanatophilus) sinuata* F. var. *erythrura* Sem. (Саратовъ), *Calitys scabra* Thunb. (оз. Балтымъ бл. Екатеринбург), *Platamartus jakowlewi* Rtt. (Томскъ), *Mycetophagus irroratus* Rtt. (Енисей м. Минусинскомъ и Красноярскомъ), *Onthophagus ponticus* Har. (Волга между Царицынымъ и Саратовомъ), *Melolontha hippocastani baicalica* Rtt. (Тобольскъ), *Poe-cilonota variolosa* Paук. (Енисей м. Красноярскомъ и Минусинскомъ), *Sphenoptera fossulata* Gebl. (Саратовъ), *Meloë reitteri* Escher. (тамъ-же), *Oedemera croceicollis* Gyll. var. *sarmatica* F. Mor. (Казань), *Ceutorrhynchidius barnevillei* Bris. (Gren.?) (В. Сиб.: Селенга) (?), *Clytus (Xylotrechus) ibex* Gebl. (Казань), *Dorcadion elegans* Krtz. (Саратовъ), *D. equestre* Lachm. (тамъ-же).—Въ качествѣ завѣдомо ошибочнаго опредѣленія укажемъ на *Xenomela heydeni* Weise, показанную изъ Закавказья; не говоря о томъ, что этотъ видъ описанъ изъ альпійской зоны Туркестана, онъ принадлежитъ къ роду *Oreomela* Jacobss., эндемическому въ горахъ Средней Азіи, и, слѣдовательно, никакъ не можетъ встрѣчаться въ Закавказьи.

Списокъ Hymenoptera, обработанныхъ А. Mocsáry и V. Szépligeti, состоитъ изъ 499 видовъ и 17 разновидностей, изъ коихъ на долю Кавказа приходится 9, Европ. Россіи—283, Сибири—260 и Китая съ Монголіей—21 видовъ. Изъ фауны Россіи при этомъ описываются слѣдующія новыя формы (53 вида и 7 разновидностей): *Amblynotus ruficeps* Szep l., sp. n. (З. Сиб.: Омскъ), *Psilodora hyalinipennis* Szep l., sp. n. (З. Сиб.: Енисей м. Красноярскомъ и Минусинскомъ), *Isurgus rufipes* Szep l. var. 2 (З. Сиб.: Омскъ), *Cremastus melanarius* Szep l., sp. n. (З. Сиб.: Минусинскъ), *Cymodusa pulchricornis* Szep l., sp. n. (В. Сиб.: ст. Зима на р. Окѣ), *C. elegans* Szep l., sp. n. (Казань!), *Omorga uncinata* Szep l., sp. n. (Казань!), *Nepiesta nigra* Szep l., sp. n. (Казань!), *Apilasta nigrifemur* Szep l., sp. n. (Казань!), *Exetastes csikii*, Szep l., sp. n.

*) Вѣроятно распространеніе этого вида въ Сибирѣ ограничивается самой западной ея частью, такъ какъ далѣе къ востоку онъ не былъ найденъ никѣмъ изъ многочисленныхъ и усердныхъ собирателей тамъ насекомыхъ. Ср. Motschulsky, Ins. de la Sibér., 1844, p. 100.—А. С.

(З. Сиб.: Минусинскъ и Омскъ), *E. minor* Szep l., sp. n. (Казань! и Омскъ), *Exochus albomarginatus* Szep l., sp. n. (Казань!), *Aniaphron niger* Szep l., sp. n. (Саратовъ!), *Phthorima rossica* Szep l., sp. n. (Казань!), *Pimpla viduata* Grav. var. Szep l. (З. Сиб.: Томскъ), *P. sagax* Hart. var. Szep l. (тамъ-же), *Syzeuctus hyalinipennis* Szep l., sp. n. (В. Сиб.: р. Селенга), *Mesochorus pectinatus* Szep l., sp. n. (Казань!), *Pezomachus rossicus* Szep l., sp. n. (Казань!), *Hemiteles rufipleuris* Szep l., sp. n. (З. Сиб.: Омскъ), *H. sibiricus* Szep l., sp. n. (З. Сиб.: Тобольскъ), *Microcryptus xanthostigma* Szep l., sp. n. (Казань!), *Phygadeuon csikii* Szep l., sp. n. (Казань!), *Ph. lucidus* Szep l., sp. n. (Казань!), *Cryptus murorum* Tschek var. Szep l. (З. Сиб.: Минусинскъ), *Trychosis sibirica* Szep l., sp. n. (З. Сиб.: Иланская), *Ichneumon annulicornis* Szep l., sp. n. (З. Сиб.: Минусинскъ), *Diaborus crassiceps* Szep l., sp. n. (Казань!), *Polyblastus elegans* Szep l., sp. n. (З. Сиб.: Минусинскъ), *Mesoleptus (Hadrodactylus) barbatus* Szep l., sp. n. (Казань!), *Mesoleius (Scopesis) bipunctatus* Szep l., sp. n. (Казань!), *Rhogas csikii* Szep l., sp. n. (З. Сиб.: Минусинскъ), *Cardiochiles fumipennis* Szep l., sp. n. (тамъ-же), *Microplitis sordipes* Nees var. Szep l. (В. Сиб.: Селенга), *M. lugubris* Ruthe var. Szep l., (Казань!), *Apanteles similis* Szep l., sp. n. (Казань!), *A. xanthocarpus* Szep l., sp. n. (В. Сиб.: Селенга), *A. gladiator*, Szep l., sp. n. (тамъ-же), *Opius obscurus* Szep l., sp. n. (Казань!), *O. rossicus* Szep l., sp. n. (Казань!), *Biosteres palaeartcticus* Szep l., sp. n. (З. Сиб.: Томскъ), *Dacnusa erythrogastra* Szep l., sp. n. (Казань!), *D. (? Epimicta) caudata* Szep l., sp. n. (Казань!), *Perilampus nigriventris* Först. var. Szep l. (Казань!), *Isosoma guttula* Thoms. var. Szep l. (Казань!), *I. ovata* Szep l., sp. n. (Казань!), *Proctotrypes collaris* Szep l., sp. n. (Казань!), *Labeo pusillus* Szep l., sp. n. (Казань!), *Prosacantha spinosa* Szep l., sp. n. (Казань!), *Isocybus rossicus* Szep l., sp. n. (Казань!), *Pantoclis rufipes* Szep l., sp. n. (В. Сиб.: Селенга), *Cleptes elegans* Szep l., sp. n. (Казань!), *Pompilus csikianus* Kohl, sp. n. (это описаніе принадлежит Fr. Fr. Кohl'ю) (Сибирь: Минусинскъ, Троицкосавскъ), *Cerceris borealis* Мос с., sp. n. (З. Сиб.: Красноярскъ), *C. frigida* Мос с., sp. n. (З. Сиб.: Минусинскъ), *Stizus sibiricus* Мос с., sp. n. (З. Сиб.: Минусинскъ), *Crabro (Thyreopus) cribrarius* L. var. *inornata* Мос с. п. (З. Сиб.: Яровская на р. Турѣ), *Colletes clypeatus* Мос с., sp. n. (В. Сиб.: Селенга), *Anthrena csikiana* Мос с., sp. n. (З. Сиб.: Минусинскъ), *Megachile lucidula* Мос с., sp. n. (З. Сиб.: Минусинскъ), *Nomada lineola* Panz. var. *sibirica* Мос с., п. (З. Сиб.: Минусинскъ), *N. quadrispinosa* Мос с., sp. n. (Саратовъ!), *N. zichyana* Мос с., sp. n. (Саратовъ!). Кромѣ того описываются новыя: *Formica nasuta mongolica* Emery, subsp. n. и *Messor barbarus* L. var. *lobulifera* Emery, п. изъ Монголіи (оба описанія принадлежатъ проф. Emery) и малоизвѣстные виды: *Rhyssa approximator* Grav.

(изъ Перми) и *Odynerus (Lionotus) aurantiacus* Мосс. (изъ Монголіи). Замѣтимъ, что описанія многихъ видовъ перепончатокрылыхъ, особенно изъ подотряда *Ichneumonidea*, слишкомъ кратки и неудовлетворительны, а также и то, что нѣкоторое количество видовъ, приводимыхъ въ спискѣ, осталось безъ опредѣленій (напр. нѣкоторые виды *Microcryptes*, *Phygadeuon*, *Hemiteles*, *Spilocryptes*, *Ichneumon*, *Bracon*, *Torymus*, всѣ *Pteromalidae* и мн. др.).—Изъ наиболѣе интересныхъ находокъ отмѣтимъ еще: *Abia nigricornis* Leach (Казань), *Vipio schewyrewi* Кок. (З. Сиб.: Минусинскъ), *Parnopes porowi* Ев. (З. Сиб.: Минусинскъ!), *Formica gagates* Latr. var. *transcaucasica* Nasson. (Сиб.: Минусинскъ и Троицкосавскъ; также Монголія въ разныхъ пунктахъ), *Formica uralensis* Ruzsky (В. Сиб.: Троицкосавскъ!), *Camponotus pensylvanicus* De G. var. *saxatilis* Ruzsky (Саратовъ, Пермь, Томскъ, Красноярскъ, Минусинскъ), *Bembex diversipes* F. Mor. (З. Сиб.: Красноярскъ!).—Замѣтимъ, что въ русской энтомологической литературѣ не было ни разу общаго фаунистическаго списка *novae* *отдѣламъ* *Hymenoptera* и что видѣть таковой по русской фаунѣ приходится впервые.

Списокъ *Lepidoptera*, обработанныхъ J. Rávelemъ, наиболѣе бѣденъ, состоя всего изъ 139 видовъ, изъ коихъ 1 видъ показанъ съ Кавказа, 48 в. изъ Европ. Россіи, 101 в. изъ Сибири и 14 в. изъ Китая съ Монголіей. Новыхъ формъ въ этомъ числѣ нѣтъ ни одной.

Перечень *Diptera*, въ обработкѣ д-ра K. Kertész, заключаетъ (со включеніемъ *Aphaniptera*) 237 видовъ, въ томъ числѣ 1 видъ съ Кавказа, 150—изъ Евр. Россіи, 111—изъ Сибири и 4—изъ Монголіи. Новыхъ формъ описано изъ Россіи 5, именно: *Nemotelus zichyi*, sp. n. (З. Сиб.: Омскъ!), *Stenopogon csikii* Strobl, sp. n. (описаніе принадлежитъ проф. Strobl'ю), *Dolichopus angustipennis*, sp. n. (Казань!), *Acemyia csikii*, sp. n. (З. Сиб.: р. Тура!), *Hylemyia megatracha*, sp. n. (З. Сиб.: Омскъ!, В. Сиб.: ст. Зима на р. Окѣ). Кромѣ того дополнены описанія малоизвѣстныхъ: *Ceratopogon bicolor* Mg., *Dioctria lata* Lw., *D. rufipes* De G. var., *Laphria gilva* L., *Anthrax blandus* Lw., *Chrysotoxum sibiricum* Lw., *Hylemyia penicillaris* Rond. var. *b*, *Oncomyia distincta* Mg. var. и *Acidia speciosa* Lw.; затѣмъ впервые дано подробное описаніе, сопровождаемое хорошимъ рисункомъ головы, самца *Tabanus (Theriopectes) tarandinus* L.*)

Подъ именемъ „*Neuropteroidea*“ данъ обработанный Fr. Klápálek'омъ списокъ *Neuroptera*, *Trichoptera*, *Odonata*, *Ephemerae* и *Plecoptera*, заключающій всего 42 вида, въ томъ числѣ 14 ви-

*) Самцы этого вида, какъ извѣстно, представляютъ большую рѣдкость. Прекрасные экземпляры самцовъ *Tabanus tarandinus* имѣются въ Зоол. Музеѣ Акад. Наукъ въ С.-Петербургѣ съ 1895 г. (ср. Ежегодникъ Зоол. Муз. Акад. Н., I, 1896, Отчетъ по Музею, стр. 20); описанія ихъ у насъ, впрочемъ, не появлялось.—А. С.

довъ изъ Евр. Россіи, 24—изъ Сибири и 4 вида общихъ востоку Россіи и Сибири. Въ качествѣ новаго описанъ одинъ *Myrmeleon ambiguus*, sp. n. (Зап. Сибирь: Минусинскъ). Всѣ экземпляры *Panorpa communis* L. изъ Казани и изъ Зап. Сибири отнесены къ var. *diffinis* М с. Lachl. и дана ихъ общая характеристика; затѣмъ указаны отличія казанскаго экз. *Chrysopa perla* L. отъ типической формы, даны замѣтки о *Brachycentrus acloxus* М с. Lachl. (изъ Томска), *Macronema radiatum* М с. Lachl. (оттуда-же), *Sympetrum flaveolum* L. изъ Красноярска, *Sympyca praedisca* Br. (изъ Саратова и Троицкосавска), *Rhitrogena* sp.? изъ Иркутска, *Perla flavotincta* М с. Lachl. изъ Верхне-Удинска и *Perla* sp.? изъ Забайкалья; наконецъ описаны 5 личинокъ *Myrmeleonidae* (4 изъ рода *Myrmeleon*, 1 даже безъ опредѣленія рода).

Orthoptera обработаны проф. I. Bolivar'омъ. Ихъ списокъ включаетъ всего 46 видовъ, изъ коихъ 24—изъ предѣловъ Россіи и 22—изъ Китая съ Монголіей. Изъ Россіи не описывается ни одной новой формы; даются лишь замѣтки о слѣдующихъ видахъ: *Anechura bipunctata* F. изъ Красноярска, *Ectobia lapponica* L. изъ Казани, *Bryodema barabensis* Pall. (изъ Сибири и Китая), *Callirrhypis davidiana* Sauss. (изъ Усть-Кяхты и Монголіи) (также о *Pachytylus danicus* L. изъ Пекина). За то изъ Китая съ Монголіей описывается цѣлый рядъ новыхъ формъ: *Acrida csikii*, sp. n. (Пекинъ), *Stenobothrus horvathi*, sp. n. (Монг.: Урга), *Bryodema mongolica*, sp. n. *) (оттуда-же), *Nemobius nitidus*, sp. n. (Пекинъ), *N. csikii*, sp. n. (С. Китай: Даба); кромѣ того устанавливаются: новая группа (tribus) *Zichyinae* (rectius: *Zichyini*) для родовъ: *Bradyporus* Charp., *Zichya*, g. n. и *Deracanthella*, g. n. и два новыхъ только-что названныхъ рода, которые подробно характеризуются вмѣстѣ съ ихъ представляющими видами: *Zichya vacca* (Fisch. W.) и *Deracanthella aranea* (Fisch. W.) (оба изъ Монголіи). Изъ наиболѣе интересныхъ находокъ по Orthoptera въ предѣлахъ Россіи укажемъ на *Oedaleus mlokosiewiczi* Bol. (В. Сиб.: по р. Селенгѣ!) и *Callirrhypis davidiana* Sauss. (В. Сиб.: Усть-Кяхта; видъ былъ до сихъ поръ извѣстенъ лишь изъ окр. Пекина).

Hemiptera обработаны самымъ выдающимся изъ современныхъ венгерскихъ энтомологовъ, д-ромъ G. Horváth'омъ. Списокъ ихъ включаетъ 272 вида (186 Heteroptera и 86 Homoptera), распределяющихся слѣдующимъ образомъ: 17 в. происходятъ съ Кавказа, 130—изъ Евр. Россіи, 179—изъ Сибири и 25—изъ Китая и Монголіи. Изъ предѣловъ Россіи описаны слѣдующія новыя формы: *Myrmus glabellus*, sp. n. (З. Сиб.: Минусинскъ), *Neides propinquus*, sp. n. (оттуда-же) (дано также сравнительное описаніе

*) Названіе этого вида должно быть измѣнено, такъ какъ существуетъ *Bryodema gebleri* Fisch. W. var. *mongolica* Zubovskiy 1900. Мы предлагаемъ для *Bryodema mongolica* Bol. имя *Bryodema bolivari* (nov. nom.).—А. С.

Neides tipularius L.), *Lamprodema rufipes* Reut. var. *femorata*, n. (оттуда-же), *Aradus* (*Quilnus*) *brevirostris*, sp. n. (В. Сиб.: Тулунъ), *Allodapus pumilus*, sp. n. (З. Сиб.: Минусинскъ), *Ibiaris* (gen. n.) *discretus*, sp. n. (З. Сиб.: Омскъ!) (этотъ новый родъ сравнивается съ *Oncotylus* Fieb. и *Litoxenus* Reut.), *Deltocephalus sibiricus*, sp. n. (оттуда-же), *Dictyophora pannonica* Germ. var. *diminuta* n. (З. Сиб.: Минусинскъ), *Bactericera rossica*, sp. n. (Казань). Кромѣ того изъ Китая и Монголіи: *Alydus zichyi*, sp. n. (С. Кит.: Даба), *Geocoris mongolicus*, sp. n. (Монг.: Урга), *G. mandarinus*, sp. n. (Пекинъ) и *Aphanus csikii*, sp. n. (оттуда-же). Къ этимъ описаніямъ присоединены еще замѣтки о слѣдующихъ видахъ: *Irochrotus caspius* Jak. (отличит. признаки), *Eurydema dominulus* Scop. var. *daurica* Motsch. (= *Strachia festiva* L. var. *albiventris* Jak.), *Alydus calcaratus* L. изъ Урги и его var. *hirsuta* Kol. (*atrata* Motsch.), *Geocoris pubescens* Jak. (отличія этого вида, признаваемого самостоятельнымъ, и географ. распространение), *Coranus hammarstroemi* Reut. изъ Минусинска (f. macroptera), *Salda nobilis horvathi* Jak. (отличія этой расы), *Thamnotettix elegans* Melich. (подробное описаніе ♂), *Deltocephalus languidus* Fieb. изъ Казани (f. macroptera).—Къ интереснымъ находкамъ, кромѣ новыхъ формъ, надо отнести: *Irochrotus caspius* Jak. (Минусинскъ), *Phimodera collina* Jak. (тамъ-же), *Aelia sibirica* Reut. (Сибирь и Саратовъ), *Phyllontochila antennalis* Put. (В. Сибирь: Селенга), *Anapus longicornis* Jak. (Омскъ), *Thamnotettix elegans* Melich. (Минусинскъ), *Pterochlorus rosae* Chlodk. (Енисей м. Красноярскомъ и Минусинскомъ) и нѣк. др.

Прочіе отдѣлы безпозвоночныхъ животныхъ содержатъ также много новостей, отчасти совершенно неожиданныхъ, изъ русской фауны [укажемъ, напр., на новые виды *Julus* и *Leptophyllum* (Myriopoda) съ Кавказа, на цѣлый рядъ новыхъ *Eulais*, *Hydryphantes* и *Hydrachna**) (Arachnoidea, Hydrachnidae) изъ Казани, на нѣкоторыхъ новыхъ ракообразныхъ (*Euscandona*, *Limnetis*, *Bosmina*, *Macrothrix*, *Pleuroxus*, *Diaptomus*) изъ Казани же или изъ Зап. Сибири.

Принимая во вниманіе, что все это собрано однимъ зоологомъ экспедиціи во время по большей части непродолжительныхъ ея остановокъ, что это, слѣдовательно, матеріаль въполнѣ отрывочный и что, несмотря на это, онъ содержитъ столько новыхъ, отчасти совершенно неожиданныхъ, фактовъ, нельзя не признать еще разъ, что уровень нашихъ свѣдѣній по фаунѣ Россіи, даже Европейской, необыкновенно низокъ, и что мы дѣлаемъ очень мало для ея изученія, вслѣдствіе неправильнаго пониманія или толкованія основныхъ и ближайшихъ задачъ зоологіи въ Россіи.

*) Отмѣтимъ, что эти новые виды не попали въ новѣйшую монографію *Hydrachnid*ъ Piersig'a (Das Tierreich, 13. Lief., 1901, Juni), а потому легко могутъ быть упущены изъ виду.—А. С.

Разсмотрѣнное изданіе дѣлаетъ честь венгерскимъ ученымъ и правительству. Не говоря уже о томъ, что присоединеніемъ зоолога въ археологической экспедиціи было признано возможнымъ значительно расширить ея программу, въ Венгріи нашлось достаточно специалистовъ для удовлетворительной обработки почти всего привезеннаго экспедиціей матерьяла (слабѣ другихъ обработаны, повидимому, позвоночныя; но по нимъ и добытый матерьялъ незначителенъ). Факты показали, что венгерцы недаромъ снарядили экспедицію въ Россію, съ полнымъ правомъ считая ее во многихъ отношеніяхъ за *terra incognita*.

А. Семеновъ (С.-Петербургъ).

C o l e o p t e r a.

Bouchard, J. Note sur les *Feronii* (sic!). [Bulletin de la Société Entomologique de France, 1901, № 8 (avril), pp. 170—171].

По мнѣнію автора за родомъ *Feronia* Latr., въ противность мнѣнію Ч и ч е р и н а, должно быть удержано именно это названіе. Непонятно только, какъ могло образоваться отъ слова *Feronia* множественное число „*Feronii*“, поставленное въ заглавіи замѣтки, и что оно значитъ.

Buysson, Henri du. Remarques sur quelques Elatérides et description de deux espèces nouvelles [Col.]. [Bulletin de la Société Entomologique de France, 1901, № 5 (mars), pp. 124—126].

Критическія замѣтки о *Cardiophorus demaisonii* Buys. 1898 (= ? *thebaicus* Cand. 1860), *C. nigratissimus* Buys. (указаны отличія отъ *C. megathorax* Fald.), *C. erichsoni* (nov. nom.) (= *rufipes* Er. nec Goeze) и *C. rufipes* Goeze (= *vestigialis* Er.) и описанія слѣдующихъ новинокъ изъ русской фауны: *Athous martini*, sp. n. (Ленкорань) и *Athous probosus*, sp. n. (Закавказье).

Csiki, Ernestus. Catalogus Endomychidarum. (A Musaeo Nationali Hungarico editus). Budapestini. 1901. in 8^o maj. (53 pag.) [оттискъ изъ Természetrাজi Füzetek, XXIV, безъ указанія оригинальной пагинаціи].

Очень опрятно изданный и хорошо проредактированный полный систематическій каталогъ до сихъ поръ извѣстныхъ нынѣ живущихъ представителей названнаго семейства жесткокрылыхъ. Виды расположены въ систематическомъ (не алфавитномъ) порядкѣ и снабжены подробными и обстоятельными цитатами литера-

туры; особенной похвалы заслуживаетъ также и то, что *при каждой* цитатѣ указанъ годъ появленія соотвѣтствующей работы, что важно соблюдать во всякомъ полномъ систематическомъ каталогѣ. Къ сожалѣнію, рядомъ съ такой полнотой литературныхъ указаний *для видовъ* мы встрѣчаемъ цитаты только однихъ оригинальныхъ описаній *при родахъ*. Послѣдній способъ цитирования, принятый, къ сожалѣнію, въ большинствѣ каталоговъ, не имѣетъ оправданія ни съ логической, ни съ практической точки зрѣнія, что будетъ ясно изъ слѣдующаго примѣра: родъ *Endomychus* Рапз. въ современномъ его объемѣ совершенно не соотвѣтствуетъ тому, какъ понималъ его Рапзеръ въ 1795 г.; поэтому при немъ должно быть *по меньшей мѣрѣ* двѣ цитаты: 1) оригинальная цитата Рапзер'а; 2) цитата автора, впервые установившаго для даннаго рода границы, въ которыхъ онъ принятъ въ каталогѣ; соотвѣтственно этому и при названіи рода рядомъ съ фамиліей первоначальнаго его автора слѣдуетъ ставить фамилію перваго автора рода въ современномъ его объемѣ во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, когда первоначальныя рамки рода не соотвѣтствуютъ современнымъ; въ противномъ случаѣ цитированіе автора при родовыхъ названіяхъ утрачиваетъ всякій смыслъ, превращаясь въ пустую, ничѣмъ не оправдываемую формальность. Замѣтимъ тутъ кстати и одну неточность: г. Csiki считаетъ авторомъ рода *Clemmys* Seidlitz'a; между тѣмъ Seidlitz только поправилъ неправильную латинизацію этого слова, измѣнивъ въ немъ всего одну букву; авторомъ рода *Clemmys* долженъ былъ бы считаться по-прежнему Намре, если-бъ родовое названіе *Clemmys* не было ранѣе употреблено въ герпетологіи; вслѣдствіе этого придется, кажется, остановиться для этого рода на названіи *Clemmus*, случайно употребленномъ L. Redtenbacher'омъ.—Въ концѣ каталога Csiki приложенъ алфавитный указатель какъ родовыхъ, такъ и видовыхъ названій, что значительно облегчаетъ пользованіе каталогомъ.

Интересны слѣдующія данныя о ростѣ нашихъ свѣдѣній по семейству *Endomychidae*: въ очень полной по своему времени монографіи Gerstäcker'a, появившейся въ 1858 г., приведено 224 вида *Endomychid*'ъ; въ 1873 г. Gorham насчитывалъ 302 вида; въ каталогѣ Gemminger'a и Harold'a (1876 г.) ихъ показано 366 видовъ; новѣйшій каталогъ Csiki заключаетъ уже 585 видовъ (+ 63 разновидности), представляющихъ 78 родовъ.

Очень пріятно видѣть, что Венгерскій Національный Музей приступилъ къ изданію столь полезныхъ общихъ сводокъ по насекомымъ. Напомнимъ, что въ прошломъ (1900) году тѣмъ-же музеемъ изданъ полный „Catalogus Tabanidarum orbis terrarum universi“ д-ра С. Kertész'a (Természetrাজi Füzetek, XXIII), представляющій первый опытъ общаго каталога болѣе или менѣе обширной группы въ отрядѣ двукрылыхъ. Будемъ надѣяться, что на этомъ въ Будапештѣ дѣло не остановится.

Gerhardt, J. Eine neue Käferart. [Deutsche Entomologische Zeitschrift, Jahrg. 1901, I. Heft (Juli), p. 156].

Описывается *Salpingus (Rhabocerus) gabrieli*, sp. n., найденный въ горахъ Силезіи (Altvater и Wölfelsgrund). Въ виду близости мѣстонахожденій этого вида къ русской границѣ можно ожидать, что онъ найдется и въ предѣлахъ Россіи.

Gestro, R. Catalogo sistematico dei Paussidi. [Annali del Museo Civico di Storia Naturale di Genova, serie 2-a, vol. XX (XL), 1901 (Marzo), pp. 811—850].

Систематическій каталогъ всѣхъ до сихъ поръ извѣстныхъ современныхъ представителей этого во многихъ отношеніяхъ весьма замѣчательнаго семейства жесткокрылыхъ. За предисловіемъ слѣдуютъ замѣтки о нѣкоторыхъ малоизвѣстныхъ формахъ и описаніе 7 новыхъ видовъ. Виды въ каталогѣ расположены въ алфавитномъ (не систематическомъ) порядкѣ, что производитъ впечатлѣніе нѣкоторой недоработанности; они снабжены обстоятельными цитатами всей главнѣйшей литературы; къ сожалѣнію, далеко не во всѣхъ цитатахъ указанъ годъ появленія соотвѣствующей работы. При родовыхъ названіяхъ всегда указанъ авторъ рода въ современномъ его объемѣ. Каталогъ изданъ очень чисто и проредактированъ тщательно; жаль только, что нѣтъ въ концѣ алфавитнаго указателя родовъ; замѣтимъ, что и для видовыхъ названій, попавшихъ въ синонимію, нѣтъ алфавита. Было бы также весьма полезно указать виды муравьевъ, у которыхъ живутъ отдѣльные *Paussidae* (насколько это, конечно, извѣстно).— Линнею былъ извѣстенъ всего 1 видъ этого семейства; въ каталогѣ коллекціи Dejean'a 1837 г. приводится только 5 *Paussid'*; каталогъ Gemminger'a и Harold'a (1868 г.) насчитываетъ ихъ уже 99; Raffray, въ монографической работѣ 1885—86 гг., приводитъ 152 вида, Wasmann, въ 1894 г.,—169 в.; въ настоящемъ каталогѣ Gestro перечисляется уже 270 видовъ, составляющихъ 3 подсемейства и 13 родовъ.—Въ русской фаунѣ сем. *Paussidae* представлено, какъ извѣстно, всего только однимъ видомъ, *Paussus turcicus* Friv., который, какъ и прочіе *Paussidae*, является типичнымъ мирмекофиломъ и встрѣчается у насъ только въ южномъ Закавказьѣ, въ Закаспійской обл. и Туркестанѣ, что какъ разъ въ каталогѣ Gestro не указано. Область распространенія этого вида должна быть очерчена слѣдующимъ образомъ: Греція, Европ. Турція, Малая Азія съ Сиріей, Закавказье, вѣроятно часть Месопотаміи, сѣв. Персія, Закасп. область и русскій Туркестанъ до зап. Тянь-шаня включительно. Второй европейскій представитель этого семейства, *Paussus favieri* Fairm.,

живетъ на югѣ Франціи (Pyrenées Orientales), въ Испаніи, въ Марокко, Алжиріи и Тунисѣ. Оба эти вида встрѣчаются нормально въ муравейникахъ *Pheidole pallidula* Nyl. Третій палеарктический видъ, *Paussus saharae* Bedel, водится въ сѣверной полосѣ Африки отъ Алжиріи до Египта включительно. Всѣ остальные *Paussidae*, за исключеніемъ немногихъ китайскихъ, являются обитателями тропическихъ странъ, при чемъ въ Новомъ Свѣтѣ наше семейство представлено всего только двумя видами эндемического въ Южной Америкѣ рода *Homopterus* Westw. (*H. brasiliensis* Westw. въ Бразиліи и *H. aequatoriensis* Wasm. въ Эквадорѣ). Особенно богата *Paussid'*ами Африка до Капской колоніи включительно.

Horn, Walther, Dr. med. Revision der Cicindeliden mit besonderer Berücksichtigung der Variationsfähigkeit und geographischen Verbreitung, bearbeitet von. Herausgegeben von der Deutschen Entomologischen Gesellschaft als Beiheft der Deutschen Entomologischen Zeitschrift. Berlin. 8^o.

Подъ этимъ заглавіемъ авторъ издаетъ критическій каталогъ всѣхъ современныхъ представителей семейства *Cicindelidae* съ характеристикой родовъ и другихъ группъ высшаго и низшаго порядка и описаніемъ цѣлаго ряда новыхъ формъ (какъ видовъ, такъ расъ, разновидностей и aberrаций). До настоящаго времени издано 4 листа этой интересной и полезной работы (2 изъ нихъ появились только-что); они содержатъ обработку группъ *Stenostomatidae* и *Collyridae*, чуждыхъ палеарктической фаунѣ. Мы отложимъ подробный разборъ работы W. Horn'a до того времени, когда она коснется палеарктическихъ представителей семейства *Cicindelidae*.

Ивановъ, Н. Н. Жуки-щелкуны (Elateridae) С.-Петербургской губерніи. [Ежегодникъ Зоологическаго Музея Императорской Академіи Наукъ, VI, № 1, 1901, стр. 1—55] (по отд. оттиску, появивш. въ мартѣ 1901 г.).

Эта тщательно и съ большимъ трудолюбіемъ написанная работа представляетъ критически обработанный каталогъ представителей сем. *Elateridae*, до сихъ поръ найденныхъ въ предѣлахъ Петербургской губерніи. Ему предпосланъ историческій очеркъ постепеннаго, въ теченіе столѣтія, ознакомленія съ фауной *Elateridae* губерніи, списокъ изслѣдованныхъ мѣстъ и пунктовъ и т. п. Самый каталогъ заключаетъ 62 вида; при каждомъ видѣ имѣется выписка или цитата изъ каталоговъ Эстенъ-Сакена,

Оберта, монографіи Candèze'a и „Fauna Baltica“ Seidlitz'a, а иногда и другихъ работъ и перечень всѣхъ извѣстныхъ автору мѣстонахожденій, сопровождаемыхъ хронологическими датами. Въ заключеніе произведено сравненіе фауны *Elateridae* Петерб. губерніи съ фауной этихъ жуковъ Финляндіи (на основаніи новѣйшаго каталога проф. J. Sahlberg'a), Олонецкой губ. (по каталогу Гюнтера), Прибалтійскихъ губ. (по „Fauna Baltica“ Seidlitz'a), Швеціи, Московской губ. и данъ указатель литературы, которой пользовался авторъ.—Очень жаль, что вмѣсто подробнаго перечня для каждаго вида всѣхъ частныхъ его мѣстонахожденій въ предѣлахъ Петербургской губ. (для многихъ обыкновенныхъ видовъ, какъ напр. *Archontas murinus* L., *Athous subfuscus* Müll., *Ludius pectinicornis* L., *L. tessellatus* L., *L. cruciatus* L. и т. п., въ виду ихъ широкаго распространенія, такой перечень является положительнымъ балластомъ) не дано общихъ указаній біологическаго и экологическаго характера (условія обитанія, время появленія и періодъ существованія imago, связь съ растеніями, періодичность массовыхъ появленій и т. д.); при отсутствіи этихъ данныхъ работа имѣетъ слишкомъ кабинетный, слишкомъ узко-музейскій отпечатокъ. Мы предъявляемъ эти, можетъ быть нѣсколько строгія, требованія на томъ основаніи, что послѣ трудовъ барона Остенъ-Сакена и Оберта уже наступило время для болѣе детальнаго и разносторонняго изученія фауны жуковъ Петербургской губерніи. Затѣмъ остается пожалѣть, что детальной обработки дождались одни петербургскіе *Elateridae*, составляющіе едва-ли $\frac{1}{30}$ колеоптерологической фауны губерніи.

Jakobson, G. Bemerkungen zur „Uebersicht der Arten der Coleopteren-Gattung *Ischyronota* Wse.“ in Wien. Ent. Ztg. 1901, pag. 103. [Wiener Entomologische Zeitung, XX. Jahrg., VI. Heft, 1901 (August), pp. 125—127].

Нѣсколько не прибавляющихъ ничего существеннаго замѣчаній къ ниже реферируемой работѣ Reitter'a (ср. стр. 201) и перечисленіе мѣстонахожденій восточныхъ видовъ рода *Ischyronota* на основаніи матерьяловъ Зоологич. Музея Имп. Академіи Наукъ; среди этихъ мѣстонахожденій нѣкоторыя [какъ напр.: „Salzsee (? Transcaucasien)“ или: „Transcaspien: Eisenbahn“ поражаютъ своей неопредѣленностью, другія—искажены при печатаніи.

Obst, P. Synopsis der Coleopteren-Gattung *Anthia* (Weber) (mit 3 Figuren). [Archiv für Naturgeschichte, Jahrg. 1901, Beiheft, pp. 265—298].

Эта, производящая очень хорошее впечатлѣніе, работа заклю-

часть: описание 14 новыхъ формъ (6 видовъ, 5 расъ или подвиговъ и 3 разновидности) и 1 малоизвѣстнаго вида *Anthia*; сжатый аналитическій обзоръ до сихъ поръ извѣстныхъ видовъ этого рода, который авторъ разбиваетъ на слѣдующіе подроды: *Thermophila* Норе (typ.: *10-guttata* L.), *Chilanthia*, subg. n. (typ.: *cavernosa* Gerst.), *Anthia* in sp. (typ.: *thoracica* F.), *Pachymorpha* Норе (typ.: *6-guttata* F.), *Odontanthia*, subg. n. (typ.: *calida* Har.) и *Calanthia*, subg. n. (typ.: *pulcherrima* Bates); далѣе краткій очеркъ географическаго распредѣленія видовъ *Anthia* и алфавитный каталогъ всѣхъ представителей этого рода, съ цитатами къ сожалѣнію только у формъ описанныхъ въ новѣйшее время. Распредѣленіе видовъ р. *Anthia* представляется въ слѣдующемъ видѣ: они населяютъ всю Африку отъ Туниса до Капштадта и отъ Сенегала до Египта (обходя повидимому только Марокко), но преобладаютъ въ южной и восточной Африкѣ; въ зап. Африкѣ, напротивъ, этотъ родъ представленъ весьма бѣдно; въ Азіи р. *Anthia* представленъ лишь двумя видами, образующими подродъ *Pachymorpha* Норе: изъ нихъ одинъ, *A. 6-guttata* F. съ ея разновидностями или расами, водится въ западной части сѣв. Индіи, а другой, *A. mannerheimi* Chaud., распространенъ отъ юго-восточнаго угла Каспійскаго моря до Аму-дарьи (которая, по странному недосмотру автора, показана лежащей въ Персіи!). Послѣдній видъ принадлежитъ, слѣдовательно, къ наиболѣе замѣчательнымъ элементамъ фауны нашей Закаспійской области.—Работа произведена въ Берлинскомъ Музеѣ на основаніи имѣющихся тамъ богатыхъ матерьяловъ по этому роду, занимающему, какъ извѣстно, довольно изолированное положеніе въ семействѣ *Carabidae*.

Reitter, Edm. Coleopterologische Notizen. [Wiener Entomologische Zeitung, XX. Jahrg., V. Heft, 1901 (Juni), p. 98].

Двѣ замѣтки (593 и 594); въ первой обращается вниманіе, со словъ г. Ріса, на то, что описанный только-что Кенигомъ (см. это „Обозрѣніе“, стр. 62) *Dorcadion kalinowskyi* Коп.—*D. rosti* Ріс 1900; во второй говорится нѣсколько словъ въ защиту рода *Atritonus* Rtt., какъ его теперь понимаетъ авторъ; по нашему мнѣнію правъ, однако, Ganglbauer, противъ котораго направлена эта замѣтка.

Reitter, Edm. Uebersicht der bekannten *Agyrtes*-Arten. [Wiener Entomologische Zeitung, XX. Jahrg., V. Heft, 1901 (Juni), p. 102].

Краткій обзоръ въ видѣ опредѣлительной таблички четырехъ

палеарктическихъ видовъ этого рода семейства *Silphidae* безъ ссылокъ на литературу и лишь съ общими указаніями географическаго распространенія отдѣльныхъ видовъ. Для *Agyrtes bicolor* Cast. установленъ новый подродъ *Agyrtecanus* (sic!!) Rtttr.; описанъ и 1 новый видъ: *Agyrtes alutaceus*, sp. n., изъ округа Коніи въ Мал. Азіи („Ak-chehir“). За выключеніемъ *Agyrtes pilosus* Motsch., который по мнѣнію автора не можетъ принадлежать къ этому роду, въ русской фаунѣ остается только два представителя *Agyrtes*: общераспространенный *A. castaneus* Fröl. и туркестанскій *A. ferrugineus* Solsky (*rufus* Rtttr.). Такъ какъ родъ *Agyrtes* Fröl. имѣетъ еще одного представителя въ неарктической фаунѣ, не упоминаемаго Reitter'омъ, заглавіе статьи неточно.

Reitter, Edm. Neue Uebersicht der Arten der Coleopteren-Gattung *Ischyronota* Weise. [Wiener Entomologische Zeitung, XX. Jahrg., V. Heft, 1901 (Juni), pp. 103—108].

Критическій обзоръ и аналитическая табличка 9 формъ (5 видовъ и 4 разновидности) этого рода *Chrysomelid'*ъ, характернаго для полосы пустынь Евразіи (изъ нихъ 1 видъ свойственъ сѣверу Африки, 3 вида съ 4 разновидностями—степямъ и пустынямъ юго-востока Евр. Россіи, Закавказья, Закаспійской обл. и Туркестана съ Киргизскими степями и 1—центральной Монголіи). Среди этихъ формъ новыми являются: *Ischyronota spaethi*, sp. n. (изъ окр. Аулія-ата въ сѣв. ч. Туркестана), ея var. *deserticola*, n. (= *Cassida desertorum* Dohrn, Weise, Rtttr. olim nec Gebl.) (изъ степей крайняго юго-востока Евр. Россіи) и *I. desertorum* Gebl. var. *basimargo*, n. (изъ Аулія-ата и Бухары). Этюдъ исполненъ тщательнѣе многихъ другихъ работъ того-же автора.

Reitter, Edm. Notizen zu den Bemerkungen des Herrn Tschitscherine (sic) zu Reitter's Bestimmungs-Tabelle der Harpalini. [Wiener Entomologische Zeitung, XX. Jahrg., V. Heft, 1901 (Juni), pp. 109—113].

Ссылаясь на первоначальную программу издаваемыхъ имъ „Bestimmungs-Tabellen der europ. Coleopteren“, авторъ старается оправдать нѣкоторые недочеты своей работы, подвергнутой серьезной и авторитетной критикѣ Т. С. Чичеринымъ (ср. это „Обозрѣніе“, стр. 63—64); Е. Reitter указываетъ также на одновременность своей работы съ работами Чичерина, новыми данными которыхъ онъ поэтому не всегда могъ пользоваться. Замѣтимъ, что отвѣты автора далеко не исчерпываютъ критическихъ замѣчаній на его работу Чичерина. Въ заключеніе ука-

заны отличительные признаки для *Ophonus griseoides* Rttг.*) (изъ средней Россіи, Подольской губ. и съ Кавказа) и *O. pubipennis* (Küstг.) Rttг. (изъ Далмаціи), а затѣмъ дана аналитическая табличка слѣдующихъ туркестанскихъ представителей рода *Carterus* Dej. & Boisd. (subgen. *Odontocarus* Sol.): *C. chodshenticus* Ball. (авторъ приводитъ слѣд. мѣстонахожденія: Ходжентъ, Самаркандъ, Ташкентъ), его var. *usgentensis* Heyd. (Узгентъ, Чимганъ), *C. propagator*, sp. n. („Бухара.“), *C. esau* Heyd. (Наманганъ), *C. semenowi* Rttг. (Ташкентъ). Нельзя не быть благодарнымъ автору за эту табличку, составленную на основаніи осмотра оригинальныхъ экземпляровъ видовъ Heyden'a, которые были описаны крайне неудовлетворительно. Выдѣленіе въ особый видъ *C. propagator* дѣлаетъ честь наблюдательности автора; мы имѣемъ эту форму изъ Гиссарскаго бекства (Л. С. Барщевскій! VII. 1896). Что же касается *C. usgentensis* Heyd., то намъ кажется болѣе правильнымъ видѣть въ немъ вполне опредѣлившуюся, свойственную Ферганѣ расу *C. chodshenticus* Ball.

Reitter, Edm. Uebersicht der Coleopteren-Gattung *Pedilus* Fisch. der palaearctischen Fauna (sic). [Wiener Entomologische Zeitung, XX. Jahrg., V. Heft, 1901 (Juni), pp. 114—116.

Аналитическая таблица видовъ этого рода, первая ревизія которыхъ была сдѣлана пишущимъ эти строки въ 1893 г. Въ качествѣ новыхъ характеризуются подробнѣе, чѣмъ другіе, слѣдующіе виды: *Pedilus weberi* (изъ Крыма, къ сожалѣнію безъ болѣе точнаго указанія мѣстонахожденія), *P. laevicollis* (Губерлинскія горы) и *P. mongolicus* (сѣв. Монголія: Ханхай, почему-то называемый авторомъ „Shangai-Gebirge“). Укажемъ здѣсь на слѣдующіе промахи, происшедшіе исключительно по небрежности автора: 1) вида подъ именемъ „*Pedilus lividipennis* Sem.“ не существуетъ; подъ именемъ *P. pallidipennis* пишущимъ эти строки была описана въ свое время форма, которая позже оказалась простой разновидностью *Pedilus tristis* Sem. и синонимомъ var. *fulvipennis* Heyd. 1886, неправильно отнесенной Heyden'омъ къ *P. fuscus* Fisch. W.; эту форму и разумѣетъ Reitter подъ именемъ „*P. lividipennis*“; 2) описанный Reitter'омъ подъ именемъ *P. zibowskii* Sem. видъ есть на самомъ дѣлѣ *P. willbergi* Sem.; настоящий *P. zibowskii* остался ему неизвѣстенъ; 3) при описаніи *P. laevicollis*, n. sp., авторъ указываетъ признаки ♀, а въ концѣ описанія говоритъ, что имѣлъ передъ глазами только ♂; остается неяснымъ, какого пола экземпляръ послужилъ для описанія Reitter'у. Наконецъ остается пожалѣть, что новыя

*) По мнѣнію Т. С. Чичерина *Ophonus griseoides* Rttг. = *O. punctulatus* Duft. var. — A. C.

мѣстонахожденіи для нѣкоторыхъ видовъ (напр. *P. xanthopus* Sem., *P. tristis* Sem.) приводятся голословно, вслѣдствіе чего къ нимъ нельзя отнести съ полнымъ довѣріемъ.—Всѣ виды этого рода, за исключеніемъ одного (*P. mongolicus* Rtt.), принадлежатъ русской фаунѣ*). Пишущій эти строки имѣетъ въ виду дать, въ самомъ непродолжительномъ времени, ихъ новый, нѣсколько улучшенный обзоръ.

Reitter, Edm. Uebersicht der Coleopteren-Gattung *Catops* Payk. aus der paläarktischen Fauna. [Deutsche Entomologische Zeitschrift, Jahrg. 1901, I. Heft (Juli), pp. 39—48].

Синоптический обзоръ палеарктическихъ представителей названнаго рода семейства *Silphidae*; въ немъ приводится 41 видъ, изъ которыхъ не менѣе 31 свойственны русской фаунѣ; устанавливается 2 новыхъ подрода: *Cholevinus* Rtt. (для азіатскихъ видовъ типа *C. fuscipes* Mén., *pallidus* Mén.; сюда-же включены и *C. rufus* Krtz.) и *Lasiocatops* Rtt. (для видовъ типа *C. alpinus* Gyll.). Впервые описываются: *Catops conicicollis*, sp. n. (Оренбургъ и Копетъ-дагъ), *C. brevipalpis*, sp. n. (Иркутскъ), *C. nigricantoides* (sic!), sp. n. (долина Аракса въ Закавказьи), *C. tortiscelis* (sic!), sp. n. (Вост. Сибирь безъ указанія мѣста), *C. alpinoides* (sic!), sp. n. (Вост. Сибирь и Каракорумъ). Какъ видно, всѣ новые виды происходятъ изъ предѣловъ Россіи (авторъ, къ сожалѣнію, не достаточно точно указываетъ происхожденіе своихъ экземпляровъ). Къ недостаткамъ работы относятся ея чрезмерная конспективность, отсутствіе во многихъ случаяхъ цитатъ и точныхъ данныхъ о географическомъ распространеніи видовъ; затѣмъ можно посоветовать автору консультировать словари и грамматику при составленіи видовыхъ названій.

Reitter, Edm. *Lesteva binotata* nov. sp. [Deutsche Entomologische Zeitschrift, Jahrg. 1901, I. Heft, (Juli), p. 48].

Краткое описаніе новаго вида названнаго рода *Staphylinid'*ъ, происходящаго изъ Ташкента.

Reitter, Edm. Weitere Beiträge zur Coleopteren-Fauna des russischen Reiches. [Deutsche Entomologische Zeitschrift, Jahrg. 1901, I. Heft (Juli), pp. 65—84].

Описанія *Chlaenites* (правильнѣе: *Chlaenius*) *spoliatus* var. *sub-*

*) Неарктическіе виды, которыхъ прежде относили къ роду *Pedilus* Fisch. W., принадлежатъ на самомъ дѣлѣ къ р. *Corphyra* Say.—A. C.

purpureus п. (изъ Ауліэ-ата *) въ сѣв. Туркестанѣ**), *Ochthebius laevisculptus*, sp. n. (В. Бухара: Кулябъ), *O. atricapillus*, sp. n. (В. Бухара: Кулябъ), *Georyssus trifossulatus* Motsch. (В. Бухара: Каратагъ въ Гиссарѣ), *Heterocerus albineus* (sic!), sp. n. (В. Бухара: Кулябъ), *Aleochara capitata* Fauv. („Бухара“), *Drusilla (Astilbus) alutacea*, sp. n. (Гиссаръ: Каратагъ), *Xantholinus corallinus*, sp. n. (Гиссаръ: Каратагъ), *X. semirufus*, sp. n. (Самаркандъ) [въ выноскѣ описанъ еще *X. fuenteanus*, sp. n. изъ Испаніи], *Triarthron punctipennis*, sp. n. (Семирѣчье: оз. Чатыръ-куль), *Liodes baicalica*, sp. n. (зап. бер. оз. Байкала), *Orthoperus acariformis*, sp. n. (Туркестанъ: Маргеланъ, Ауліэ-ата), *Micrurula auripubens*, sp. n. (с. Монголія: Ханхай), *Tritoma quadriornata*, sp. n. (Талышъ), *Tr. quadripustulata* var. *connexa*, п. (Кавказъ: Сурамскій перевалъ), *Aerophilus semenowi*, sp. n. (видъ любезно названъ въ честь пишущаго эти строки) (Репетекъ въ Закасп. обл. и Маргеланъ), *Limnichus latiusculus*, sp. n. (Ауліэ-ата), *Aphodius (Mendidaphodius, subgen. n.) spinifrontis*, sp. n. (Индерское оз.), *A. (Volinus) grafi*, sp. n. (верховья Иркутъ въ вост. Сибири), *A. flavimargo*, sp. n. (Самаркандъ и Ташкентъ), *Polyphylla alba permagna*, subsp. n. (Ауліэ-ата), *Potosia hungarica* var. *auliensis*, п. (Ауліэ-ата), *Ludius (Selatosomus) impressoides* (sic!), sp. n. (Гиссаръ: Каратагъ), *Tagona rugipleuris*, sp. n. (Ауліэ-ата), *Prozodes bactrianiformis*, sp. n. (Гиссаръ: Каратагъ), *Pr. transfuga* var. *sulcatissima* п. (Ауліэ-ата), *Trigonoscelis auliensis*, sp. n. (Ауліэ-ата), *Penthicus sequensi*, sp. n. (верховья Иркутъ и Урга), *Ochthenomus coniceps*, sp. n. (Гиссаръ: Каратагъ), *Corigetis (Eusomidius) auliensis*, sp. n. (Ауліэ-ата), *Larinus multiguttatus*, sp. n. (Закасп. обл. безъ указанія мѣста; изъ сборовъ Ангера), *Ceutorrhynchus (Thamiocolus) schultzeanus*, sp. n. („Бухара“), *Baris auliensis*, sp. n. (Ауліэ-ата), *Limnobaris sahlbergi*, sp. n. (Исыкъ-куль, р. Чу; изъ сборовъ проф. Сальберга), *Auletes procerus*, sp. n. (Гиссаръ: Каратагъ), *Bedelia viridicaerulea*, sp. n. (В. Бухара: Кулябъ); кроме того данъ краткій синоптическій обзоръ всѣхъ до сихъ поръ извѣстныхъ видовъ подрода *Anoplistes* Serv. [7 извѣстныхъ автору видовъ + 1 неизвѣстный; всѣ принадлежатъ фаунѣ Россіи или Монголіи; среди нихъ кратко охарактеризованъ новый видъ: *Purpuricenus (Anoplistes) forticornis* изъ Ауліэ-ата] и сдѣлано нѣсколько замѣчаній о географ. распространеніи и варіаціяхъ *Aerophilus geminus* Krtz.; въ послѣднимъ отнесены *Ae. ruthenus* Solsky и *Ae. seminiger* Grouv. (видъ этотъ распространенъ, по Reit-

*) Замѣтимъ, что насѣкомыя, распространяемыя фирмой Staudinger & Bang-Нааъ какъ происходящія изъ Ауліэ-ата, собраны на самомъ дѣлѣ въ двухъ или болѣе различныхъ мѣстностяхъ, такъ какъ среди нихъ есть и типично-равнинныя, и высокогорныя формы.—А. С.

**) Непонятно, почему авторъ называетъ „формой“ („Form“) (слѣдовательно не видомъ) *Chaenius indiensis* Motsch., видовая самостоятельность котораго нами доказана еще въ 1888 г.—А. С.

ter'y, отъ Абиссиніи и Египта по всей южной Европѣ и средней Азіи до Монголіи включительно). Насколько небрежно подѣ-часъ относится почтенный авторъ къ географіи, не давая себѣ труда заглянуть на карту*), видно изъ слѣдующихъ примѣровъ: мѣсто-нахожденіе *Triarthron punctipennis* у него обозначено (стр. 69) слѣдующимъ удивительнымъ образомъ: „Turkestan; Meretschensk (sic!): Tschakir-kul (sic!). 1 ♂ in meiner Sammlung“ (очевидно, слѣдуетъ разумѣть оз. Чатыръ-куль въ Семирѣчьи); Репетекъ обозначенъ лежащимъ въ Бухарѣ (стр. 72), Ауліэ-ата—также (стр. 78).

Reitter, Edm. Ueber die *Silpha carinata* Hrbst. und nächste Verwandte. [Wiener Entomologische Zeitung, XX. Jahrg., VI. Heft, 1901 (August), pp. 121—123].

Краткій синоптический обзоръ ближайшихъ сородичей *Silpha carinata* Hrbst. и описаніе удивительной новой *Silpha bilineata* изъ Румыніи (Валахія!), являющейся самымъ крупнымъ европейскимъ представителемъ рода и характеризующейся всего только двумя ребрами на надкрыльяхъ. Странно, какъ такое крупное насекомое могло до сихъ ускользнуть отъ наблюдателей. Не есть ли это рѣдкая аберація *S. carinata*? Кромѣ того охарактеризованы слѣдующія разновидности *S. carinata* Hrbst.: var. *blattiformis*, п. изъ Туркестана (Ташкентъ, Маргеланъ и т. д.), var. *rufocincta*, п. изъ Забайкалья, сѣв. Монголіи и Камчатки и var. *carpathica*, п. изъ Карпатъ въ предѣлахъ сѣв. Венгрии.

Reitter, Edm. Ueber die Arten der Coleopteren-Gattung *Pselaphopt(e?)rus* Reitt. [Wiener Entomologische Zeitung, XX. Jahrg., VI. Heft, 1901 (August), pp. 123—124].

Къ единственному до сихъ поръ извѣстному виду рода *Pselaphopt(e?)rus* Rtttr. (*Ps. kubischteki* Rtttr. изъ долины Аракса и изъ Ферганы) авторъ присоединяетъ еще 2: отнесеннаго имъ ошибочно къ роду *Pselaphus* Hrbst. *Ps. banghaasi* Rtttr. 1893 (изъ Туркестана и вост. Бухары) и новаго *Ps. lomnickii*, sp. n., найденнаго въ началѣ марта 1899 г. въ восточной Галиціи (Колумеа), т. е. недалеко отъ русской границы (вѣроятно, видъ этотъ найдется и въ предѣлахъ Россіи). Отличительные признаки этихъ трехъ видовъ изложены въ видѣ опредѣлительной таблицы.

*) Cf. A. S e m e n o w: Horae Soc. Ent. Ross., XXX, 1896, p. 231.—A. C.

Reitter, Edm. Uebersicht der *Coeliodes*-Arten der Coleopteren-Gattung (sic!) *Allodactylus* Wse. aus der palaearctischen Fauna. [Wiener Entomologische Zeitung. XX. Jahrg., VI. Heft, 1901 (August), pp. 129—130].

Въ самомъ заглавіи—странное смѣшеніе понятій, такъ какъ *Allodactylus* Wse. есть подродъ или группа видовъ рода *Coeliodes* Schönh. Статейка состоитъ изъ опредѣлительной таблицы 7 палеарктическихъ видовъ этой группы, изъ которыхъ два [*C. macrasper* (sic!) изъ Кроаціи и *C. simplicicollis* изъ Хабаровска и Камчатки] характеризуются (кратко) какъ новыя. Авторъ, какъ бывало съ нимъ нерѣдко и раньше, пускаетъ въ ходъ несущестующія и немыслимыя въ латинскомъ языкѣ слова („*macrasper*“).

Schilsky, J. Die Käfer Europa's. Nach der Natur beschrieben von Dr. H. C. Küster und Dr. G. Kraatz. Fortgesetzt von—. Siebenunddreissigstes Heft. Nürnberg 1901 (на обложкѣ).

37-й выпускъ этого, начатаго еще въ 1844 году, далеко не законченнаго и послѣднее время вышедшаго изъ первоначальныхъ рамокъ, изданія. Онъ заключаетъ между прочимъ описанія слѣдующихъ видовъ русской фауны: *Dasytes altaicus*, sp. n. (Алтай, безъ указанія мѣста), *Trichoceble ramicornis*, sp. n. (Александровскій хребетъ въ Туркестанѣ), *Chaetomalachius aeneus*, sp. n. („Бухара“, безъ указанія мѣста!), *Ch. staudingeri*, sp. n. (то-же), *Dasytiscus* (*Dasytidius*) *semipallens* Rtttr. 1899 (изъ долины Аракса въ Закавказьи), *Danacaea tristis*, sp. n. (Александровскій хреб.), *Mesocoelopus substriatus*, sp. n. (зап. Кавказъ), *Sphindus dubius* Gyllh. 1808 (обще-европейскій видъ), *Aspidiphorus orbiculatus* Gyllh. 1808 (то-же), *Scraptia fuscula* Müll. 1821 (то-же), *Scraptia jakowleffi* Rtttr. 1889 (описана изъ Астрахани; Schilsky имѣлъ экземпляры только изъ долины Аракса и свидѣтельствуешь, что оттуда происходятъ оригиналы Reitter'a; нѣтъ ли тутъ какого-нибудь смѣшенія?), *Pelecotoma fennica* Paук. 1799 (сѣв.-европейскій, главнымъ же образомъ сѣверно-русскій видъ), *Rhipiphorus paradoxus* L. 1761 (обще-европейскій видъ), *Hendecatomus reticulatus* Herbst 1806 (средне- и южно-европейскій видъ; указанъ здѣсь для Урала и Сибири), *Octotemnus glabricollis* Gyllh. 1827 (обще-европ. видъ), *Ennearthron wagae* Wankow. 1869 [изъ Литвы, Карпатъ и (?) Франціи], *E. laricinum* Mellié 1848 (изъ Франціи, Германіи, Австріи, Венгріи; авторъ свидѣтельствуешь, что видъ этотъ встрѣчается и на Амурѣ, послѣ чего можно встрѣтить его во многихъ пунктахъ Европ. Россіи и Сибири), *E. cornutum* Gyllh. 1827 (обще-европ. видъ), *E. affine* Gyllh. 1827 (то-же), *Cisarthron laevicolle* Rtttr. 1885 (описанъ

изъ центр. Босній; позже найденъ также въ зап. Закавказьи), *Rhopalodontus fronticornis* Panz. 1809 (обще-европ. видъ), *Rh. perrini* Rtt. 1878 (съ Кавказа), *Rh. perforatus* Gyllh. 1813 (обще-европ. видъ), *Cis (Hadraule) setifer* Rtt. 1883 (изъ Ленкорани), *C. (Hadraule) elongatus* Gyllh. 1827 (= *Ennearthron striatum* J. Sahlb. 1900) (изъ Швеции, Австріи, Тироля, а также, повидимому, изъ южн. Финляндіи), *C. (Eridaulus) quadridens* Mellié 1848 (изъ южной и средней Европы, но также изъ Финляндіи), *C. (Eridaulus) nitidus* F. 1792 (= *C. jaquemarti* Mellié 1848 = *C. glabratus* Mellié 1848) (обще-европейскій видъ, доходящій, по автору, до Хабаровска въ Вост. Сибири и Бухары, повидимому восточной), *C. boleti* F. 1801 (обще-европ. видъ) и его var. *caucasica* Fald. (съ Кавказа), *C. micans* F. 1792 (обще-европ. видъ), *C. nigrorugosus*, sp. n. [изъ Хабаровска на Амурѣ; видъ этотъ былъ неправильно относимъ къ *Cis hieroglyphicus* Rtt., подъ каковымъ названіемъ онъ фигурируетъ и въ Cat. Col. Sibir., I. Nachtrag (1893) v. Heyden'a (p. 103), а также въ Deutsche Ent. Zeitschr. 1885, p. 302], *C. setiger* Mellié 1848 [= *C. rugulosus* Seidl. 1891; сюда же относитъ авторъ, на основаніи экземпляровъ коллекціи Reitter'a (изъ Минусинска!) *C. petropolitanus* Jacobs. 1895] и его var. *plagiata* Thoms. и v. *quadrifollis*, n. (обще-европейскій видъ), *C. seriatopilosus* Motsch. 1860 (изъ Японіи и съ „Амура“), *C. hieroglyphicus* Rtt. 1877 (то-же), *C. comptus* Gyllh. 1827 [обще-европ. видъ, который извѣстенъ автору также съ Кавказа (между прочимъ изъ Дербента)], *C. lederi* Rtt. 1878 (изъ разныхъ мѣстъ Кавказа), *C. sibiricus*, sp. n. (изъ Хабаровска на Амурѣ), *C. hispidus* Payk. 1798 (обще-европ. видъ), *C. bidentulus* Rosenh. 1847 (обще-европ. видъ, встрѣчающійся и въ Финляндіи), *C. aurosericeus* Rtt. 1887 (изъ Хабаровска въ Вост. Сибири), *C. tomentosus* Mellié 1848 [южно-европ. видъ, встрѣчающійся также въ Закавказьи (Боржомъ, Ленкорань)], *C. oblongus* Mellié 1848 (обще-европ. видъ), *C. castaneus* Mellié 1848 (то-же), *C. festivus* Gyllh. 1813 (средне-европ. видъ), *C. fissicornis* Mellié 1848 (= *C. sublaminiatus* Wankow. 1869) (восточно-европ. видъ, извѣстный также изъ Минск. губ.), *C. bidentatus* Ol. 1789—1808 (обще-европ. видъ), *C. alnoides* Rtt. 1884 (съ о. Корфу, извѣстный также изъ Ленкорани), *C. reflexicollis* Ab. 1874 (= *C. lucasi* Rtt. 1878) [изъ южной Европы, извѣстный автору изъ Самары, изъ Грузіи и Сибири (какой?)], *C. perrisi* Ab. 1874 (= *C. linearis* J. Sahlb. 1900) [изъ Франціи, Венгріи, Закавказья (Талышъ), но также изъ Финляндіи и Лапландіи; видъ этотъ, очевидно, найдется еще во многихъ пунктахъ Россіи], *C. alni* Gyllh. 1813 и его var. *recticollis* Ab. 1874 (обще-европ. видъ, извѣстный автору также съ зап. Кавказа и изъ Сибири), *Xylographus bostrychoides* Duf. 1843 [изъ сѣв. Африки и южн. Европы, извѣстный автору также изъ Закавказья (Ленкорань) и Сибири (какой?)]. Къ этимъ описаніямъ присоеди-

нены опредѣлительныя таблицы всѣхъ палеарктическихъ родовъ сем. *Ciidae*, и видовъ слѣдующихъ изъ нихъ: *Octotemnus* Mellié, *Ennearthron* Mellié, *Rhopalodontus* Mellié, *Cis* Latr., а также таблицы для опредѣленія палеарктическихъ и японскихъ видовъ пр. *Sphindus* Chev. и *Aspidiphorus* Latr. Въ заключеніе—нѣсколько поправокъ и дополненій къ описаннымъ въ предыдущихъ выпускахъ видамъ; изъ нихъ упомянемъ слѣдующее, имѣющее ближайшее отношеніе къ русской фаунѣ: характеристика *Eulobonyx turkestanicus* Kr. var. *varipes*; *Dasytes nigrocyanus* Muls. найденъ также въ Сибири (гдѣ?); для Алтая (на основаніи сборовъ г. Rost'a) показаны слѣдующіе виды: *Dasytes fuscus* Ill., *Xyletinus formosus* Mannh., *Dinoderus substriatus* Payk., *Mordella perlata* Sulz., *Mordellistena humeralis* L., *Anaspis frontalis* L. и *latiuscula* Muls.

Весьма характерно, что такія изданія какъ „Die Käfer Europa's“, „Naturgeschichte der Insecten Deutschlands“, „Bestimmungstabellen der europäischen Coleopteren“ наполнены за послѣднее время описаніями болѣею частью новыхъ формъ изъ Россіи, особенно Азіатской, изъ Средней и Восточной Азіи, что измѣняетъ ихъ первоначальныя рамки и не соотвѣтствуетъ заглавіямъ.

Schultze, A. Berichtigungen, Ergänzungen und sonstige Bemerkungen zur Nomenklatur der paläarktischen Ceuthorrhynchinen. [Deutsche Entomologische Zeitschrift, Jahrg. 1901, I. Heft (Juli), pp. 57—60].

Систематическія или географическія замѣтки о слѣдующихъ видахъ: *Coeliodes strigatirostris* Hochh., *C. dohrni* Faust, *Ceuthorrhynchus edentulus* Schultze, *C. globicollis* Schultze, *C. sulcatus* Bris., *C. canaliculatus* Bris., *C. venedicus* Wse., *C. praeclarus* Schultze, *C. cinnamomoeus* Schultze, *C. melitensis* Schultze, *C. obscurus* Bris.

Schultze, A. Beitrag zur Kenntniss der paläarktischen *Mononychus*-Arten und ihrer Varietäten. [Deutsche Entomologische Zeitschrift, Jahrg. 1901, I. Heft (Juli), pp. 61—64].

Замѣтки о нѣкоторыхъ видахъ и каталогъ всѣхъ палеарктическихъ формъ названнаго въ заглавіи рода долгоносиковъ.

Schultze, A. Varietäten-Reihe paläarktischer Ceuthorrhynchinen. [Deutsche Entomologische Zeitschrift, Jahrg. 1901, I. Heft (Juli), pp. 93—96].

Рядъ новыхъ разновидностей долгоносиковъ названной въ за-

главнѣи группы; изъ нихъ слѣдующія изъ русской фауны: *Coeliodes rubricus* Gyllh. var. *murinus* (съ Кавказа), *C. rubicundus* Hrbst. var. *rubricollis* (оттуда-же), *Rhinoncus guttalis* Grav. var. *rufofemoratus* (изъ южн. Европы вообще), *Micrelus ericae* Gyllh. var. *rufescens* (съ Кавказа), *Ceuthorrhynchus imperialis* Schultze var. *sieversi* и var. *pulchellus* Schultze (описана въ 1896 какъ самостоятельный видъ) (обѣ формы съ Кавказа). Точныя мѣсто-нахожденія всѣхъ этихъ формъ не обозначены.

Schultze, A. Neue paläarktische Ceuthorrhynchinen. [Deutsche Entomologische Zeitschrift, Jahrg. 1901, I. Heft (Juli), pp. 97—112].

Описание 15 новыхъ видовъ *Curculionid*’ъ названной въ заглавіи группы; среди нихъ слѣдующіе изъ предѣловъ Россіи: *Coeliodes strigirostris* (съ Кавказа; изъ сборовъ Е. Кенига; точное мѣсто-нахожденіе не указано!), *Ceuthorrhynchus splichali* (изъ Туркестана безъ обозначенія мѣста!), *C. deplanatus* (изъ Аулія-ата въ сѣв. Туркестанѣ); кромѣ того 2 вида (*Phytobius hartmanni* и *Al-lodactylus thomsoni*) происходятъ изъ сѣв. Китая.

Weise, J. Biologische und Sammel-Notizen aus dem Jahre 1900. [Deutsche Entomologische Zeitschrift, Jahrg. 1901, I. Heft (Juli), pp. 85—92].

Замѣтки объ образѣ жизни или о раннихъ стадіяхъ развитія слѣдующихъ жуковъ: *Phytonomus arundinis* Payk. и *rumicis* L., *Lixus paraplecticus* L., *Galeruca laticollis* Sahlb., *Cryptocephalus janthinus* Germ., *Cr. 4-pustulatus* Gyllh., *Cr. pini* L., *Cr. 4-punctatus* Harr., *Melasoma saliceti* Wse., *Lochmaea suturalis* Thoms., *Chaetocnema subcaerulea* Kutsch., *Haltica saliceti* Wse., *Orchestes quercus* L., *Scymnus ater* Thunb. (*nigrinus* Kugel.).

Xamheu, capitaine. Moeurs et métamorphoses des insectes. 9^e mémoire. 3^e partie. [Revue d’Entomologie publiée par la Société Française d’Entomologie, XX, № 1, 1901, pp. 45—68].

Окончаніе уже реферированной работы: біологическія замѣтки и б. ч. описаніе раннихъ стадій развитія слѣдующихъ жуковъ: *Elaphrus uliginosus* F. var. *pyrenaee* Fairm., *Lucanus cervus* L. (очень подробное описаніе; авторъ указываетъ на неточность всѣхъ прежнихъ описаній), *Philonthus laminatus* Creutz., *Calathus punctipennis* Germ., *Chrysomela cerealis* L., *Aphodius inquinatus*

Hrbst., *Pterostichus xatarti* Dej., *Procrustes coriaceus* L., *Tomiscus amitinus* Eichh., *Coprimorphus scrutator* Hrbst., *Pocadius ferrugineus* F., *Trechus obtusus* Er., *Chrysochus pretiosus* F., *Ceruchus tarandus* Panz., *Trogoderma megatomoides* Rtt., *Timarcha* sp. (изъ Орава), *Tribolium confusum* Duv., *Nanophyes telephii* Bed.

А. Семеновъ (С.-Петербургъ).

Н у м е н о п т е р а.

Kieffer, J.-J. Révision des *Onychiinae* D. T. [Cynipides]. [Bulletin de la Société Entomologique de France, 1901, № 7, (avril), pp. 157—161].

Краткая опредѣлительная табличка родовъ названной группы [2 новыхъ рода: *Lambertonia*, g. n., для одного новаго вида изъ Венгріи и двухъ сѣверно-европейскихъ, и *Tavaresia*, g. n. (= *Homalaspis* Reinh.), для нѣсколькихъ европейскихъ и одного неарктическаго видовъ], указаніе видового состава этихъ родовъ и весьма краткія діагнозы 11 новыхъ видовъ, изъ коихъ 3 принадлежатъ русской фаунѣ: *Aspicera sibirica*, sp. n. (изъ „Сибирі“), *A. chlapowskii*, sp. n. (изъ „Россіи“) и *Onychia aberrans*, sp. n. (изъ „Россіи“). Новые русскіе виды происходятъ изъ коллекціи покойнаго Радосшковскаго и лишены, повидимому, точныхъ данныхъ о мѣстонахожденіи. Статья производитъ впечатлѣніе предварительнаго сообщенія.

Kieffer, J.-J. Remarque sur le genre *Xyalaspis* Hart. [Cynipide]. [Bulletin de la Société Entomologique de France, 1901, № 7 (avril), p. 161].

Замѣтка въ 4 строки о видовомъ составѣ названнаго рода.

Konow, Fr. W., p. Revision der Nematiden-Gattung *Pontania* Costa (Hym.). (Schluss). [Zeitschrift für systematische Hymenopterologie und Dipterologie, I. Jahrg., 3, 1901 (Mai), pp. 127—136].

Окончаніе уже прореферированной работы. Изъ впервые описанныхъ видовъ русской фаунѣ принадлежитъ *Pontania parvicornis*, sp. n. (Лифляндія: Юрьевъ). Въ концѣ работы—каталогъ до сихъ поръ извѣстныхъ видовъ рода *Pontania* Costa.

Konow, Fr. W., p. Systematische Zusammenstellung der bisher bekannt gewordenen Chalastogastra (Hymenopterorum Subordo tertius), bearbeitet von.—(Fortsetzung). [Zeitschrift für systematische Hymenopterologie und Dipterologie, I. Jahrg., 3, 1901 (Mai), pp. 33—48 (отд. пагинація)].

Продолженіе опредѣлителя до сихъ поръ извѣстныхъ личинокъ *Tenthredonidea*.

Kriechbaumer, Dr. Bemerkungen über Ophioniden (Hym.). (Fortsetzung u. Schluss). [Zeitschrift für systematische Hymenopterologie und Dipterologie, I. Jahrg., 3, 1901 (Mai), pp. 152—155].

Окончаніе уже прореферированной статьи.

А. Семеновъ (С.-Петербургъ).

L e p i d o p t e r a.

Круликовскій, А. Матерьялы для познанія фауны чешуекрылыхъ Россіи (съ табл.). [Матерьялы къ познанію фауны и флоры Россійской Имперіи. Отдѣлъ зоологическій, вып. V, 1901, стр. 31—61; табл. I].

Работа состоитъ изъ 6 отдѣльныхъ статей: I. „Замѣтка о чешуекрылыхъ Воронежской губерніи“, въ которой перечисляется 164 вида, собранные авторомъ въ окрестностяхъ г. Воронежа или въ Бирючскомъ уѣздѣ Воронежск. губ. II. „Къ свѣдѣніямъ о чешуекрылыхъ г. Ярославля“,—голый перечень 223 видовъ, собранныхъ А. И. Яковлевымъ лѣтомъ 1896 г. въ Яросл. уѣздѣ (Бердицыно). III. „Замѣтка о микрочешуекрылыхъ окрестностей г. Уфы“,—списокъ 88 видовъ собственнаго сбора автора; въ числѣ нихъ приводится безъ видового названія „*Parasia* n. sp.“, описаніе которой авторъ обѣщаетъ опубликовать вскорѣ. IV. „Каталогъ макрочешуекрылыхъ, извѣстныхъ до сихъ поръ изъ предѣловъ Вятской губерніи“, заключающій 605 видовъ съ краткими данными о времени и мѣстахъ нахожденія отдѣльныхъ видовъ. V. „Къ свѣдѣнію о чешуекрылыхъ Полтавской губерніи“,—голый списокъ 80 видовъ, собранныхъ въ Полтавской губ. VI. „Двѣ новыя формы чешуекрылыхъ“,—описаніе *Melitaea didyma* var. *kasanskyi*, n. изъ окр. Владиміра на Клязьмѣ и Sa-

tyrus antonoe Es p. ab. *antoniae*, n. изъ окр. Оренбурга; эти двѣ формы, вмѣстѣ съ описанной въ 1897 г. *Melitaeu didyma* var. *jaisa* Krul. ♂♀, изображены на приложенной къ работѣ хромофотографированной таблицѣ.

А. Семеновъ (С.-Петербургъ).

D i p t e r a.

Aldrich, J. M. Synonymische Notiz. [Wiener Entomologische Zeitung, XX. Jahrg., IV. Heft, 1901 (April), p. 68].

Новый родъ *Muscid*'ъ, предложенный только-что подъ именемъ *Avihospita* Hendel'емъ (ср. это „Обозрѣние“, стр. 68), совпадаетъ съ родомъ *Protocalliphora* Hough 1899 (Entom. News, X, p. 6); послѣднее названіе имѣетъ приоритетъ.

Hendel, Friedrich. Ueber die Dipterengenera *Ctenulus* Rond. und *Ectinocera* Zett. [Wiener Entomologische Zeitung, XX. Jahrg., V. Heft, 1901 (Juni), pp. 89—98, tab. II].

Весьма тщательно составленная характеристика двухъ названныхъ въ заглавіи родовъ и подробное описаніе, сопровождаемое очень хорошими рисунками, ихъ типическихъ видовъ: *Ctenulus distinctus* Meig. (non Schin.) и *Ectinocera borealis* Zett.

Pandellé, L. Etudes sur les Muscides de France. 3^e partie (suite). [Revue d'Entomologie publiée par la Société Française d'Entomologie, XX, № 3 et 4, 1901, pp. 309—324 (особая пагинація)].

Аналитическій обзоръ видовъ pp. *Leptora* Zett., *Scatophaga* Meig. и *Cordylura* Fall.— Работа продолжается.

А. Семеновъ (С.-Петербургъ).

H e m i p t e r a.

Reuter, O. M. Monographia generis *Tarisa* A m. et Serv. [Öfversicht af Finska Vet. Soc. Förhandl., XLIII, 1901, pp. 25—48 (1900); 2 tab.].

Новые виды изъ Россіи: *T. elevata* (*subspinos*a) Jak. nec

Germ.) и *fraudatrix* (Horv.). — *T. notoceras* Kol. = *virescens* H.-Sch.; *T. virescens* Fieb. (nec H.-Sch.) = *pallescens* Jak.

Reuter, O. M. Capsidae rossicae. [Öfversicht af Finska Vet. Soc. Förhandl., XLIII, 1901, pp. 161—194].

Описываются *Pentilius prasinus* Fieb., *Plagiorrhama concolor* Reut. ♂ и слѣдующія новыя формы: *Miris ferrugatus* Fabr. var. *longicornis* (Туркестанъ), *Phytocoris pilosus*, *cretaceus* и *sahlbergi* (Туркестанъ), *Deraeocoris ater* Jak. var. *limbicollis* (Амуръ), *Laemocoris ahngerii* (Туркестанъ), *Aspidacanthus* (g. n.) *myrmecoides* (Туркестанъ), *Labops nigripes* (Даурія), *Halticidea* (g. n.) *punctulata* (Уралъ), *Myrmecophyes tibialis* (Туркестанъ), *Dicyphus melanocerus* (Туркестанъ), *Globiceps dubius* (Туркестанъ), *Atomophora vitticollis*, *lineata* и *bipunctata* (Туркестанъ), *Opisthotaenia* (g. n.) *fulvipes* (Арменія), *Oncotylus horvathi* (Арменія) и *pilosicornis* (Вост. Сибирь), *Psallus cunealis* и *albicans* (Туркестанъ), *Excentricus pictipes* (Даурія и Монголія), *Plagiognathus albipennis* Fall. var. *extrema* (Туркестанъ), *Neocoris aenescens* (Монголія), *Turonis sahlbergi*, *tibialis*, *suturalis* и *conspersa* (Туркестанъ).

Э. Бергготъ (Таммерфорсъ).

A p t e r y g o t a.

Folsom, J. W. The distribution of holarctic Collembola. [Psyche, Vol. 9, № 298, 1901 (February), pp. 159—162].

Изъ 152 видовъ Collembola, извѣстныхъ для Сѣв. Америки, до 38 видовъ, т. е. 25%, общи съ Европою. Главная масса послѣднихъ является широко распространенными видами не только въ Европѣ, но и на арктическихъ островахъ, принадлежа главнымъ образомъ низшимъ семействамъ: *Poduridae* и *Aphoruridae*. Для лишенныхъ крыльевъ, любящихъ влагу насѣкомыхъ широкое распространение не представляетъ факта, самого по себѣ понятнаго. Желая объяснить эту примѣсь голарктическихъ видовъ къ американской фаунѣ, авторъ приводитъ тѣ способы, по бѣльшей части уже извѣстные въ литературѣ, коими могли названные виды такъ распространиться. *Isotoma fimetaria* и *Entomobrya multifasciata* несомнѣнно занесены съ европейскими растеніями и плодами. Находки Collembolъ въ птичьихъ гнѣздахъ и въ шерсти млекопитающихъ даютъ поводъ допускать переносъ Collembolъ высшими животными. Но главный возможный факторъ распространения ихъ—текуція воды разнаго рода, такъ какъ кромѣ нѣсколькихъ видовъ, специально приспособившихся къ водной жизни, очень многіе могутъ болѣе или менѣе долго держаться на по-

верхности воды, пока не достигнутъ земли. Морскимъ теченіямъ авторъ не придаетъ особеннаго значенія въ дѣлѣ ихъ расселенія. Выносливость же по отношенію къ низкимъ температурамъ и неприхотливость въ пищѣ представителей низшихъ семействъ даютъ имъ возможность обжиться всюду на новой родинѣ.

А. Скориковъ (С.-Петербургъ).
