

— Занимаясь нѣсколько лѣтъ изученіемъ представителей рода *Sphenoptera* Sol. (Coleoptera, Виррестидеае) русской фауны, пишуцій эти строки не имѣетъ достаточно матерьяла для установленія сѣверной границы распространенія этого рода въ предѣлахъ Европ. Россіи; изъ имѣющихся, крайне отрывочныхъ, данныхъ видно, что представители рода *Sphenoptera* встрѣчаются: въ Кіевской губ. (Нослхутъ), въ Харьковѣ (Ф. Моравицъ), Саратовѣ (Венгерск. экзек. графа Зичи) и Оренбургѣ (В. Баласогло!), но изъ этихъ данныхъ нельзя еще заключить, чтобы указанными мѣстонахожденіями опредѣлялась, болѣе или менѣе точно, предѣльная линія распространенія *Sphenoptera* къ сѣверу. Поэтому матерьялы по названному роду, собранные какъ въ приведенныхъ мѣстностяхъ, такъ и въ сосѣднихъ губерніяхъ, крайне желательны и могутъ быть направлены въ Русское Энтомологическое Общество, на имя Андр. Петр. Семенова, для передачи автору этихъ строкъ или непосредственно послѣднему по адресу: Вас. Евгр. Яковлеву, Евпаторія, Таврич. губ.

— *Pentodon distans* Kust. (Coleoptera, Scarabaeidae), много лѣтъ тому назадъ описанный изъ „южной Россіи“, до сихъ поръ остается неизвѣстнымъ энтомологамъ, между проч. и Е. Reitter'у, который, по этой причинѣ, не включилъ его въ свои „Bestimm.-Tabell. d. Dynastiden“ (1898). Собирая матерьялы по русскимъ представителямъ рода *Pentodon* Норе, пишуцій эти строки обращается съ покорнѣйшей просьбой къ лицамъ, дѣлавшимъ энтомологическіе сборы въ южной Россіи, не отказать въ сообщеніи ему неопредѣленныхъ видовъ р. *Pentodon*.

В. Е. Яковлевъ (Евпаторія).

— Имѣя въ виду издать со-временемъ монографическій обзоръ видовъ рода *Lethrus* Scop. (Coleoptera, Scarabaeidae), обильно представленнаго въ нашихъ среднеазиатскихъ владѣніяхъ и смежномъ Бухарскомъ ханствѣ, А. П. Семеновъ (Пбг., Вас. Остр., 8 лин., 39) будетъ очень благодаренъ всякому за доставленіе матерьяловъ по этому роду. Особенно желательны представители р. *Lethrus* изъ сѣверной части Семирѣчья (окрестности оз. Балхаша), съ южной окраины Киргизскихъ степей, изъ горныхъ частей Бухары, особенно у афганской границы, изъ всей западной ея части (степной), съ береговъ Арала, а также съ персидской и турецкой границъ въ Закавказьѣ. Жуки р. *Lethrus* появляются, какъ извѣстно, весной (нѣкоторые виды очень рано: въ мартѣ и даже концѣ февраля на нашихъ южныхъ окраинахъ) и держатся недолго, особенно въ степныхъ мѣстностяхъ, обыкновенно уже исчезая къ маю (въ горахъ они попадаются до іюля). При собираніи слѣдуетъ стараться добыть всегда оба пола вмѣстѣ (у самцовъ большинства видовъ челюсти вооружены зубцами или особыми длинными придатками снизу). Сохранять собранный матерьялъ лучше всего на ватѣ, но можно и въ спирту или формалинѣ. Весьма цѣнны будутъ всякія біологическія наблюденія надъ видами рода *Lethrus* въ Азиатской Россіи (ни одинъ изъ азиатскихъ *Lethrus*'овъ въ этомъ отношеніи не изслѣдованъ). Наблюденія эти, равно какъ и коллекціонный матерьялъ по р. *Lethrus* А. П. Семеновъ покорнѣйше проситъ доставлять по указанному выше адресу.

— Лучшій способъ собиранія жесткокрылыхъ поздней осенью (въ сентябрѣ и октябрѣ)—просѣваніе сквозь не слишкомъ частое металлическое сито сухихъ листьевъ, взятыхъ въ лѣсу или саду (даже среди города), вмѣстѣ съ мелкимъ хворостомъ, мхомъ, древесной трухой и всякимъ лѣснымъ мусоромъ; получившійся черезъ просѣваніе мелкій мусоръ можно по нѣскольку дней сохранять въ холщевомъ, плотно завязанномъ мѣшкѣ, на досугѣ разбирая его на листахъ писчей бумаги и тщательно выбирая всѣхъ попавшихся мелкихъ насѣкомыхъ (больше всего ловится при этомъ мелкихъ жучковъ). Позволяемъ себѣ обратить особое вниманіе на интересъ, представляемый результатами такой ловли не только въ менѣе изслѣдованныхъ въ энтомологическомъ отношеніи мѣстахъ Россіи, но даже въ Московской или Петербургской губерніяхъ. Весьма важно производить этимъ способомъ ловлю насѣкомыхъ и ранней весной (мартъ, апрѣль и первая половина мая).

А. Семеновъ (С.-Петербургъ).

Редакторъ **Н. Кокуевъ.**
