

Замѣтка о представителяхъ группы *Ditomidae* (Coleoptera, Carabidae) въ фаунѣ Крыма.

Андрея Семенова (С.-Петербургъ).

По поводу одной изъ моихъ замѣтокъ, напечатанной недавно въ этомъ „Обозрѣніи“¹⁾, Т. С. Чичеринъ указалъ мнѣ, что мною упущенъ изъ виду недавно (именно лѣтомъ 1900 г.) найденный В. Е. Яковлевымъ въ Евпаторіи *Eriocypas caucasicus* (Dej. 1831)²⁾. Нахожденіе этого рѣдкаго вида въ Крыму особенно интересно, такъ какъ онъ до самаго послѣдняго времени былъ извѣстенъ лишь изъ Закавказья [именно изъ окрестностей Тифлиса, по свидѣтельству Piochard de la Brûlerie: см. его Monographie des Ditomides (L'Abeille, XI), 1873, p. 77] и лишь недавно (въ 1893 г.) найденъ Д. К. Глазуновымъ въ с.-в. Персіи, невдалекѣ отъ нашей границы (Первоштъ въ Хорассанѣ)³⁾. Географическое распространеніе этого вида настоятельно нуждается въ дальнѣйшемъ выясненіи; пока ясно только то, что это не горная, а вѣроятно степная и при томъ весьма подвижная, способная на дальнія перелеты форма, которая поэтому могла свободно проникнуть въ Крымъ и съ востока.

¹⁾ Русск. Энт. Обзор., I, 1901, № 4—5, стр. 141—142. Въ этой замѣткѣ я разумѣлъ, впрочемъ, фауну одной южной части Крыма.

²⁾ Опредѣленіе Т. С. Чичерина. В. Е. Яковлеву попалось 2 экземпляра; оба прилетѣли ночью на свѣтъ лампы.

³⁾ Cf. Tschitschérine: Horae Soc. Ent. Ross., XXXV, 1901, p. 225, nota 16.

Въ той-же замѣткѣ я высказалъ сомнѣніе о нахожденіи въ Крыму *Carterus dama* (Rossi 1790)⁴⁾. Сомнѣніе это оказалось напраснымъ, такъ какъ среди цѣлаго ряда другихъ интересныхъ находокъ В. Е. Яковлеву посчастливилось въ 1901 г. (26. VI) найти близъ Евпаторіи 1 ♂ этого вида (экземпляръ находится въ колл. П. П. Семенова). Насколько мнѣ до сихъ поръ извѣстно, южная часть Крыма является единственнымъ мѣстомъ обитанія этого западно-средиземноморскаго вида⁵⁾ въ Россіи⁶⁾, что не менѣе характерно для фауны Крыма, чѣмъ присутствіе тамъ *Carterus angustipennis* Chaud. и *C. fulvipes* Chaud.

Такимъ образомъ въ Крыму констатировано присутствіе уже слѣдующихъ 7 видовъ группы *Ditomidae*:

- 1) *Ditomus eremita* Dej. 1825;
- 2) *Ditomus obscurus* Dej. 1825⁷⁾;
- 3) *Carterus angustipennis* (Chaud. 1852);
- 4) *Carterus fulvipes* (Dej. 1825);
- 5) *Carterus dama* (Rossi 1790);
- 6) *Carterus* (*Sabiennus*) *calydonius* (Rossi 1790)⁸⁾;
- 7) *Eriocypas caucasicus* (Dej. 1831).

Изъ нихъ 3 вида (*Carterus angustipennis* Chaud. и особенно *C. fulvipes* Dej. и *C. dama* Rossi) могли проникнуть въ Крымъ только съ запада, остальные, будучи болѣе или менѣе распространены въ степной полосѣ, могли понасть въ Крымъ съ востока или сѣвера.

⁴⁾ Русск. Энт. Обзор., I, 1901, № 4-5, стр. 141, примѣч. 26.

⁵⁾ Ср. Reitter, Bestimm.-Tabell. eur. Col., XII (Verh. Naturf. Ver. Brünn, XXXVIII), 1900, p. 51: уже въ Венгріи этотъ видъ отсутствуетъ (ср. Kuthy, Fauna Regni Hungariae, Coleopt., 1896).

⁶⁾ Piochard de la Brûlerie (op. c., p. 59) говоритъ, что *Carterus dama* „se trouve aussi dans les provinces caucasiennes et sur les bords de la mer Caspienne“; на чемъ основано это указаніе, мнѣ неизвѣстно, такъ какъ въ русской фаунистической литературѣ я не нашелъ ни одного свидѣтельства о присутствіи этого вида на Кавказѣ или въ Закавказьѣ. Не показанъ онъ для Кавказа и въ работахъ Leder'a, Schneider'a и Reitter'a. Очевидно, тутъ какое-нибудь недоразумѣніе.

⁷⁾ Этотъ видъ найденъ между прочимъ и въ Евпаторіи В. Е. Яковлевымъ.

⁸⁾ Хотя этотъ видъ для Крыма показанъ, насколько мнѣ извѣстно, однимъ Линдеманомъ (Труды Русск. Энт. Общ., VI, 1871, стр. 298), въ его нахожденіи тамъ я не имѣю особыхъ основаній сомнѣваться, хотя и не видалъ пока ни одного крымскаго экземпляра.