

О новыхъ для русской фауны жесткокрылыхъ.

Андрея Семенова (С.-Петербургъ).

II*).

7. **Psammodius basalis** (Muls. 1871), извѣстный до сихъ поръ только изъ южной Франціи, принадлежитъ также русской фаунѣ: 2 экземпляра этого вида (хранящіеся теперь въ колл. П. П. Семенова) найдены В. Е. Яковлевымъ 15. IX. 1901 въ прибрежныхъ дюнахъ около Евпаторіи (Крымъ)¹⁾. Это интересное открытіе заставляеть предположить, что *Ps. basalis* найдется еще во многихъ пунктахъ восточнаго Средиземноморья.

8. Неизвѣстный до сихъ поръ въ фаунѣ Россіи **Prionychus melanarius** (Germ. 1813) Seidl. 1896 найденъ Н. Л. Сахаровымъ близъ Саратова 26. VII. 1900, въ дубовомъ лѣсѣ (экземпляръ, опредѣленіе котораго проверено мною, хранится въ колл. А. И. Яковлева). Говоря объ распространеніи этого вида въ Европѣ, Seidlitz²⁾ допускаеть слѣдующую странную непоследовательность: на стр. 60 названнаго сочиненія онъ говорить, что видъ этотъ водится только: „in Schweden und Nord-

*) См. это „Обозрѣніе“, I, 1901. стр. 36—38.

¹⁾ Крайніе приверженцы теоріи синантропизма, появившіеся за послѣднее время среди ботаниковъ, могли бы попытаться объяснить этотъ фактъ завозомъ *Ps. basalis* съ юга Франціи, напр. во время Крымской кампаніи.

²⁾ Seidlitz in Erichson, Naturg. Ins. Deutschl. V, 2. 1896.

Deutschland". между тѣмъ какъ далѣе (I. с. pp. 66—69) приводитъ цѣлый рядъ другихъ мѣстонахожденій, напр. въ Австріи, Франціи и даже Греціи.

9. **Zonitis nana** Ragusa 1882 (*laticollis* Escher. 1891), извѣстная до сихъ поръ только изъ Сициліи, Далмаціи, Венгріи, Греціи (Аттика!) и Малой Азіи съ Сиріей³⁾, принадлежитъ также фаунѣ Россіи: я имѣю экземпляръ этого вида изъ Боржома, сбора покойнаго Г. Θ. Христофа, любезно предоставленный мнѣ В. Е. Яковлевымъ.—Если *Zonitis apicalis* Motsch. 1872, показанная авторомъ съ Персидской (западной?) границы⁴⁾, относится дѣйствительно, какъ полагаетъ Escherich⁵⁾, къ этому виду, то для него должно быть принято названіе, данное Мочульскимъ.

10. **Ceuthorrhynchus dimidiatus** Friv. 1865, извѣстный до сихъ поръ только изъ Венгріи, найденъ въ слѣдующихъ мѣстностяхъ южной и отчасти средней Россіи: въ Данковскомъ уѣздѣ Рязанской губ. (опушки лѣса въ имѣніи Гремяча) (А. И. Яковлевъ и А. П. Семеновъ! 12. VIII. 1899: А. П. Семеновъ! 20. VIII. 1899) (экземпляры въ колл. П. П. Семенова и А. И. Яковлева), Валуйскій уѣздъ Воронежской губ. (В. А. Величковскій!), Верхнеднѣпровскій уѣздъ Херсонской губ. (Я. Θ. Шрейнеръ!) (экземпляры въ колл. А. И. Яковлева). Центръ географическаго распространенія этого вида лежитъ, очевидно, въ Россіи. Определены русскіе экземпляры Е. Reitter'омъ (мы не имѣли возможности сравнить ихъ ни съ венгерскими экземплярами, ни съ описаніемъ Frivaldszky'а).

³⁾ Cf. Escherich: Deutsch. Ent. Zeitschr. 1891, p. 239; Escherich, Bestimm.-Tabell. eur. Col., XXXVI (Verhandl. Naturf. Ver. Brünn, XXXV), 1897, p. 105.

⁴⁾ Motschulsky: Bull. Soc. Nat. Mosc. 1872, II, p. 53.

⁵⁾ Escherich: Deutsch. Ent. Zeitschr. 1891, p. 239 c. notâ 1.