

Peribalus (Muls. & Rey) палеарктической фауны (Hemiptera-Heteroptera, Pentatomidae).

В. Е. Яковлева (Евпаторія).

Въ каталогѣ д-ра А. Рутон'а (Cat. des Hémipt. de la faune paléarct., 4^e éd., 1899) показано девять видовъ этого рода, изъ которыхъ на долю Россіи приходится только пять; относительно трехъ (*P. strictus* F., *P. sphaclatus* F. и *P. albipes* F.) не имѣется достовѣрныхъ свѣдѣній о нахожденіи ихъ въ Россіи; хотя нѣкоторые энтомологи, а по ихъ указаніямъ и я, упоминали о *P. sphaclatus* F., какъ встрѣчающемся въ Россіи, но, по всей вѣроятности, ошибочно, такъ какъ до сихъ поръ я не имѣлъ въ рукахъ ни одного экземпляра русскаго происхожденія; что касается до четвертаго вида,—*P. capitatus* Jak., то показанное въ каталогѣ Рутон'а мѣстонахожденіе его—Туркестанъ—не вѣрно, такъ какъ онъ былъ найденъ экспедиціею Пржевальскаго только въ оазисахъ Нія и Керія (Китайскій Туркестанъ).

Въ послѣднее время, я получилъ, черезъ посредство А. Ш. Семенова, одинъ новый видъ, собранный экспедиціею Роборовскаго и Козлова (1894 г.) уже у окраины Монголіи. именно въ оазисѣ Сачжеу: пользуясь этимъ случаемъ, я даю синоптическую таблицу всѣхъ извѣстныхъ донинѣ палеарктическихъ видовъ р. *Peribalus*.

SYNOPSIS DES PERIBALUS PALÉARCTIQUES.

- 1 (14). Epistome enclos par les joues.
2 (11). Dos de l'abdomen noir.
3 (6). Antennes à 3^e article plus court que le 2^e.
4 (5). Antennes rougeâtres, unicolores, sans anneaux noirs; pronotum à côtés droits. Long. 8 mm.—Sarepta, gouv. d'Orenbourg, Caucase.
P. inclusus Dohrn (1860).
- 5 (4). Antennes blanchâtres, les deux derniers articles noirs, pâles à la base; pronotum légèrement sinué aux côtés; tête grande, ovale, un peu plus longue que large. Long. 8 mm.—Transcaspienne: Askhabad.
P. peltatus Jak. (1894).
- 6 (3). Antennes à 3^e article égal ou presque égal au 2^e; articles 4 ou 4 et 5 avec un anneau noir au milieu; pronotum 3 fois plus large que long.
7 (8). Pronotum à côtés légèrement arrondis; jambes postérieures faiblement arquées; antennes à articles 4 et 5 noirs, 3 brunâtre au sommet. Long. 7 mm.—Sibérie: Krasnoïarsk.
P. ovatus Jak. (1889).
- 8 (7). Pronotum à côtés légèrement sinués; jambes postérieures droites; 3^e article des antennes concolore.
9 (10). Ecusson largement jaunâtre à l'extrémité qui est impunctuée ou à points concolores; antennes à article 2 à peine plus long que le 3^e; articles 4 et 5 avec un anneau noir. Long. 10 mm.—Europe, Asie.
P. vernalis Wff. (1804).
- 10 (9). Ecusson ponctué de noir jusqu'à l'extrémité, qui est à peine et très étroitement pâle; antennes à article 2 à peine plus court que le 3^e; ce n'est que le 5^e article qui est noir au milieu. Long. 8¹/₂ mm.—Europe méridionale.
P. strictus Fabr. (1803).
- 11 (2). Dos de l'abdomen rougeâtre ou brunâtre au milieu; côtés du pronotum droits; corps flavescent, très pâle.
12 (13). Tête large, grande; antennes à articles 3—5 rougeâtres, 4^e article noir au sommet, le 5^e brunâtre au milieu; pro-

notum étroit, deux fois plus large que long, avec le bord antérieur un peu plus étroit que la tête les yeux compris; écusson aussi large à la base que la tête (les yeux compris). Long. 9 mm.—Turkestan oriental: oas. Nia et Keria.

P. capitatus Jak. (1889).

- 13 (12). Tête à peine plus large ($2\frac{1}{2}$ mm.) que long (2 mm.); antennes tout-à-fait blanchâtres, à articles 4 et 5 largement noirs, le 3^e noir au sommet; pronotum deux fois et demi plus large que long, à bord antérieur un peu plus large que la tête (les yeux compris) et une carène médiane longitudinale; écusson près d'un tiers plus large à la base que la tête. D'un flave pâle, densément et très finement ponctué de noir en dessus; dessous et pattes concolores. Long. 9 mm.—Frontière SO de la Mongolie: oas. Sadjéou (expéd. Roborowsky & Kozlow! 1894).

P. pallescens, n. sp.

- 14 (1). Epistome libre, non enclos par les joues.
- 15 (16). Tête d'un $\frac{1}{5}$ plus large que longue; pronotum plus fortement incliné en avant, à côtés droits et les angles huméraux non saillants; antennes à 2^e et 3^e articles rougeâtres, les deux derniers articles et l'extrémité du 3^e noirs. Long. $8\frac{1}{2}$ mm.—Sibérie orientale: Amour: Raddevka.

P. breviceps Horv. (1897).

- 16 (15). Tête à peine plus large que longue; pronotum moins incliné en avant, avec les angles huméraux plus saillants; les quatre derniers articles noir ayant la base blanchâtre.
- 17 (18). Côtés du pronotum droits; son bord antérieur un peu plus large que la tête les yeux compris; dessus du corps brun. Long. 10 mm.—Europe occidentale.

P. sphacelatus Fabr. (1803).

- 18 (17). Côtés du pronotum un peu sinués; bord antérieur aussi large que la tête les yeux compris; dessus du corps blanchâtre, à points noirs. Long. 8 mm.—Europe méridionale.

P. albipes Fabr. (1803).