

выбравъ мѣсто, гдѣ западный горизонтъ не заслоненъ отъ его глазъ никакими препятствіями,—летающіе жуки ясно видны и легко ловятся въ сачекъ (послѣдній слѣдуетъ дѣлать изъ самой легкой бѣлой, шелковой матеріи).

Описанный способъ лова (такъ-же ловятся нѣкоторые рѣдкіе *Diptera*, *Bracconidae* и пр.), примѣненіе котораго большинствомъ энтомологовъ не практикуется, далъ, какъ намъ извѣстно, кромѣ Ярославской губерніи (гдѣ авторъ замѣтки практикуетъ его уже болѣе 20 лѣтъ съ неизмѣннымъ успѣхомъ), прекрасные результаты въ южной части Рязанской губерніи (А. П. Семеновъ), въ Саратовскомъ уѣздѣ (Н. Л. Сахаровъ) и въ Закаспійской области (Кушинскій постъ—К. О. Ангерь), и мы можемъ рекомендовать его собирателямъ, какъ особенно полезный и прибыльный въ количественномъ и качественномъ отношеніи, предлагая вмѣстѣ съ тѣмъ свои услуги по опредѣленію пойманнаго.

А. и Н. Яковлевы (Ярославль).

— Андр. Петр. Семеновъ (С.-Петербургъ, Вас. Остр., 8 лин., 39) позволяет себѣ обратиться ко всѣмъ собирающимъ насѣкомыхъ на югѣ Россіи съ усердной просьбой о доставленіи ему въ возможно бѣльшемъ количествѣ экземпляровъ мѣстами нерѣдкой въ нашихъ южныхъ губерніяхъ уховертки *Forficula tomis* Kol. Уховертка эта отличается отъ обыкновенной *Forficula auricularia* L. какъ бѣльшимъ ростомъ и болѣе сильнымъ сложеніемъ, такъ особенно 12-или, самое бѣльшее 13-члениковыми усиками (у *F. auricularia* усики имѣютъ не менѣе 14 члениковъ), соприкасающимися у самцовъ въ основной части на значительномъ протяженіи (почти до половины длины) вѣтвями клещей и другими важными признаками. По до сихъ поръ имѣющимся въ литературѣ даннымъ *Forficula tomis* въ западномъ направленіи не идетъ далѣе Полтавской губ., а въ сѣверномъ достигаетъ только Орловской, встрѣчаясь, именно, въ восточныхъ уѣздахъ этой губерніи. Возможно полный матерьялъ по этому виду весьма желателенъ какъ для выясненія географическаго распространенія этой уховертки, такъ и для изученія ея варіацій. Будетъ принятъ съ величайшей благодарностью матерьялъ по *Forficula tomis* также и изъ другихъ частей Имперіи (южныя окраины Сибири, Туркестанъ, Манчжурія), а также и всѣ другія, собранныя попутно, уховертки. О способахъ ихъ собиранія и укладки, весьма несложныхъ, см. Русское Энтом. Обозрѣніе 1901, стр. 74.