

Мелкія лепидоптерологическія замѣтки.

Л. Круликовскаго (Уржумъ).

IV¹⁾.

21. *Pieris brassicae* L. ab. Въ лепидоптерологической литературѣ изрѣдка попадаются замѣтки о желто-окрашенныхъ экземплярахъ этой обыкновенной бабочки (напр., у барона J. H. W. Nolsken'a, *Lep. Fauna etc.*, I, p. 47), которые, повидимому, встрѣчаются всюду, но крайне рѣдко. Такой ♂ присланъ мнѣ текущею зимою Н. В. Годлевскимъ изъ Самары для опредѣленія; все его отличіе отъ типичныхъ особей заключается въ томъ, что верхняя поверхность крыльевъ не бѣлая, но нѣжнаго желтаго цвѣта, приблизительно какъ у *Papilio podalirius*. Такія аберративныя особи могутъ быть обозначаемы особымъ названіемъ—*ab. flava*.

22. *Vanessa xanthomelas* Esp. var. *japonica* Stichel (in. litt?). Подъ этимъ названіемъ я получилъ отъ W. Neuburger'a въ Берлинѣ 4 ♂♂ и 2 ♀♀ *V. xanthomelas* изъ Японіи безъ точнаго обозначенія мѣстности. При сравненіи съ экземплярами изъ западной Европы и восточной Россіи оказалось, что японскія особи въ общемъ значительно крупнѣе европейскихъ (наиболѣе крупная ♀ имѣетъ въ размахѣ 78 мм., тогда какъ самая крупная

¹⁾ См. Русское Энтомологическое Обозрѣніе, II, 1902, стр. 73—76.

♀ моей коллекціи, изъ Казанской губерніи, 64 мм., но одинъ изъ японскихъ ♂♂ величиною только въ 56 мм.; у F. Rühl'я, въ Die pal. Grossschm., I, p. 349, величина этого вида указана въ 55—62 мм., а C. Fixsen, въ Mém. sur les Lépid., III, p. 296, указываетъ длину крыла у корейскихъ экземпляровъ для ♂ въ 27 и для ♀ въ 37 мм.). Окраска фона у японскихъ особей въ общемъ ярче, чѣмъ у европейскихъ, но изъ послѣднихъ отдѣльныя свѣжія ничуть не уступаютъ въ яркости первымъ, а изъ японскихъ ♀♀ у одной заднія крылья прямо можно назвать затемненными, сравнительно съ нормальной окраской. Голубыя пятна въ темномъ окаймленіи крыльевъ, особенно заднихъ, нѣсколько болѣе развиты, а окраска испода крыльевъ въ общемъ значительно темнѣе, чѣмъ у европейскихъ экземпляровъ, но между послѣдними изрѣдка попадаются и такіе, у которыхъ упомянутыя особенности развиты нисколько не меньше, чѣмъ мы это находимъ у японскихъ.

Другихъ отличій я подмѣтить не могъ. Всѣхъ вышеуказанныхъ признаковъ, развитыхъ даже у незначительнаго числа посланныхъ мнѣ экземпляровъ въ очень различной степени, слишкомъ недостаточно для выдѣленія японскихъ *V. xanthomelas* въ отдѣльную самостоятельную расу.

23. *Pararge maera* L. ab. ♂♂ этого вида въ сѣверо-восточной Россіи попадаютъ бѣльшею частью въ видѣ формы, у которой переднія крылья совершенно лишены красно-желтыхъ пятенъ подъ глазкомъ у вершины (какъ и повсюду въ сѣверной Европѣ), но изрѣдка встрѣчаются и такіе, у которыхъ эти пятна развиты такъ же сильно, какъ и у ♀♀. Такіе экземпляры могутъ быть рассматриваемы и какъ переходныя формы къ южной var. *adrasta* Hb., и, вѣроятно съ бѣльшимъ правомъ, какъ атавистическія, представляющія возвратъ къ болѣе древнему типу окраски, сохранившемуся у ♀♀.

24. *Agrotis primulae* Esp. var. *conflua* Tr. Эта разновидность изрѣдка встрѣчается и въ сѣверо-восточной Россіи, такъ какъ мнѣ недавно доставленъ прекрасный экземпляръ ♀, пойманный 19 іюля 1901 г. близъ с. Новаго Торьяла, Уржумскаго уѣзда. Отъ имѣющихся у меня финляндскихъ особей онъ отличается нѣсколько болѣе сѣрою окраскою корней верхнихъ крыльевъ.

25. *Agrotis obelisca* Hb. var. *amasina* Stgr. (in litt.). Экземпляры изъ Малой Азіи, распространяемые подъ этимъ названіемъ

различными нѣмецкими фирмами, отличаются отъ var. *villiersi* G n. развѣ только нѣсколько меньшею величиною и немного болѣе развитымъ фіолетовымъ оттѣнкомъ верхнихъ крыльевъ. Едва-ли можно выдѣлять этихъ особей въ самостоятельную разновидность.

26. *Tapinostola hellmanni* Ev. Описывая этотъ видъ въ Bull. de la Soc. Imp. des Nat. de Moscou, 1855, III, p. 182, E. Eversmann, въ числѣ прочихъ, упоминаетъ объ уклоненіи съ темной перевязкой на заднихъ крыльяхъ (*alis posticis fasciâ obsoletâ nigricante*). Такія особи, у которыхъ эта перевязка развита и рѣзко отграничена (обыкновенно заднія крылья постепенно темнѣютъ къ вѣшнему краю), рѣдки и, будучи до извѣстной степени аналогичными съ ab. *transversa* Stgr. отъ *T. fulva* Hb., могутъ также быть обозначены особымъ названіемъ, каковымъ я предложилъ бы—ab. *fasciata*.

27. *Orthosia pistacina* F. var. *grisea* Stgr. (in litt.). Встрѣчающіеся подъ этимъ названіемъ въ продажѣ экземпляры изъ Малой Азіи и Палестины должны считаться идентичными съ ab. *caerulescens* Calberla (Corresp.-Blatt d. Ent. Ver. Iris, 1888, № 5, p. 254), отъ которой не могутъ быть отдѣлены ни однимъ сколько-нибудь существеннымъ и постояннымъ признакомъ.

28. *Larentia fluctuata* L. ab. *semifasciata* Huene, Berlin. Ent. Zeitschrift, XLVI, 1901, p. 318, есть лишь синонимъ съ ab. *costovata* Hw. (см. O. Staudinger & H. Rebel, Catal., etc., I, № 3344 a).

29. *Epiplema exornata* Ev. Въ каталогѣ O. Staudinger'a и H. Rebel'я, стр. 359, не упомянуто, что этотъ видъ встрѣчается въ восточной Россіи, являясь единственнымъ представителемъ *Epiplemid* въ Европѣ. E. Eversmann въ „Fauna lepidopterologica Volgo-Uralensis“, p. 442, говоритъ: „volat rarissime in provincia Casanensi, junio“. Я видѣлъ экземпляръ, пойманный въ Саратовской губерніи.

30. *Ino statices* L. Голубыя особи, описанныя Г. Е. Грумъ-Гржимайло въ Horae Soc. Ent. Ross., XXVII, 1893, p. 385 (*antennis, capite, corpore et alis anticis caeruleis*), подъ названіемъ var. *uralensis*, повидимому, идентичны съ описанною ранѣе E. Eversmann'омъ въ „Fauna lepidopterologica Volgo-Uralensis“, p. 91, формою—var. *minor* (*alae anticae viridi-aureae basi thoraceque coeruleis*), которая представляетъ переходъ къ типу. Въ „Опытѣ кат. чеш. Казанской губ.“, II, стр. 7, я ошибочно счи-

талъ названіе var. *minor* за синонимъ var. *volgensis* Möschl. отъ *Ino budensis* Spr. Синонимы ли оба вышеприведенныя названія съ var. *manni* Ld. я, за неимѣніемъ послѣдней формы, судить не могу; если да, то названіе *minor*, какъ появившееся еще въ 1844 г., имѣетъ права пріоритета.
