

Кавказскій представитель рода *Necydalis* (L.) Muls. (Coleoptera
Cerambycidae) и обзоръ его русскихъ сородичей.

Андрея Семенова (С.-Петербургъ).

До послѣдняго времени родъ *Necydalis* (L.) Muls. казался отсутствующимъ въ кавказской фаунѣ¹⁾. Въ 1899 г. я впервые описалъ по одному экземпляру, доставленному Д. К. Глазуновымъ изъ окрестностей Новороссійска, кавказскаго представителя *Necydalis*, котораго отнесъ предварительно въ качествѣ разновидности или расы къ *Necydalis major* L.²⁾ Послѣднее оказалось однако неправильнымъ: детальное сравненіе экземпляра изъ Новороссійска съ имѣющейся теперь въ моемъ распоряженіи серіей экземпляровъ *N. major* изъ разныхъ пунктовъ Европ. Россіи и Сибири обнаружило существенные признаки, которые выясняютъ окончательно видовую самостоятельность кавказскаго *Necydalis*. Къ сожалѣнію, мнѣ извѣстна по прежнему одна только самка этого вида; на основаніи этого единственнаго пока экземпляра и составлено слѣдующее описаніе.

¹⁾ Приводимый съ Кавказа въ каталогъ Gemminger'a и Harold'a (р. 2881) *Necydalis depressa* Motsch. 1845 есть на самомъ дѣлѣ простой синонимъ *Caenoptera umbellatarum* Schreb.

²⁾ А. Семеновъ: Bull. Soc. Nat. Mosc. 1898, № 1, pp. 131—132 с. по тѣ 153.

Necydalis xantha, sp. n.

Necydalis major L. var. *geogr. xantha* A. S e m e n o w: Bull. Soc. Nat. Mosc. 1898, № 1, p. 132, nota 153.

♀. *Necydali majori* L. similis et affinis, sed major (semperne?), robustior, antennis testaceis articulo 5° ad apicem sensim obscurato, sequentibus valde fumigatis, 6° — 8° fere atris apice vix rufescenti, ultimis fumato-rufescentibus, articulo 4° graciliore et longiore vix 1,3 brevior quam 3^{us}, ultimo (11°) curto, ante apicem dilatato, quam 10^{us} manifeste brevior; prothorace toto rufo, solum pronoto sulco longitudinali mediano antice, sulco lato transversali antico toto, impressionibus longitudinalibus ad latera nec non margine antico anguste piceis s. picescentibus, prosterno et lateribus pronoti, hujus etiam basi sat dense pilis longioribus sericeis laete rufis indutis, disco parce subtilissimeque vix conspicue punctato, pilis erectis brevioribus parcissime obsito; prothoracis tuberibus lateralibus ante ejus medium sitis; scutello rufo; elytris brevioribus et imprimis latioribus, singulis apice multo magis obtusis; eorum pubescentiâ pallide rufâ sine ullo fere nitore aureo; meso- et metasterno rufis unicoloribus, pilis sericeis concoloribus sat dense vestitis; abdomine rufo-testaceo segmentis ventralibus 2° — 4° ex parte tantum, 5° solum apice obscuratis, segm. dorsalibus crebre punctatis; pedibus dilute testaceis unicoloribus, femoribus posticis clavâ nullo modo obscuratâ; tarsorum posticorum articulo basali fortiore, magis incurvo; ceterum cum *N. majore* congruens.

Long. ♀ 32 mm.

♂ nondum notus.

Hab., quantum constat, in *Caucaso occidentali*: pr. Novorossijsk (D. G l a s u n o w!).—Solum specimen (1 ♀) in coll. P. S e m e n o w.

A *N. ulmi* Chev. differt imprimis antennis gracilioribus articulo 4° multo longiore, elytris apice magis obtusatis, tibiis posticis longis haud incurvis, colore etc.; a *N. siricoide*, nuper a R e i t t e r descriptâ specie hyrcanâ, valde discrepat, praeter colorem, praesertim puncturâ vix ullâ pronoti, structurâ antennarum, elytrorum.

Родъ *Necydalis* (L.) Muls. представленъ въ современной фаунѣ, насколько теперь извѣстно, 13 видами. Изъ нихъ 4 (*N. mellitus* Say, *laevicollis* Lec., *cavipennis* Lec. и *barbarae* Rivers.) свойственны неарктической области, 3 (*N. ebenina* H. W. Bates, *pennata* Lewis, *solida* H. W. Bates)—островамъ Японіи и 1 (*N. sericella* Ganglb.)—восточной окраинѣ Тибета (сѣв. ч. китайской провинціи Сычуань)³). Одинъ видъ (*N. siricoides* Rttg.) недавно найденъ на южномъ побережьи Каспійскаго моря (у Астрабада) и легко можетъ оказаться заходящимъ также въ южный уголъ восточнаго Закавказья. Остальные 4 вида входятъ въ составъ русской фауны. Въ слѣдующей аналитической табличкѣ указаны ихъ главнѣйшіе признаки и географическое распределение.

SYNOPSIS SPECIERUM ROSSICARUM GENERIS *NECYDALIS* (L.) MULS.

- 1 (2). Minor, pedibus ex parte exceptis tota nigra. Tarsi postici articulo 2° tertio multo longiore.—Long. ♀ 14 mm. (♂ ignotus). [Ex Kraatz⁴].

Hab. in Sibiria orientali verisimiliter prope Vladivostok (H. Christoph, teste Kraatz).

Synonyma nulla.

N. morio Krtz. 1879.

- 2 (1). Species majores (long. 19—32 mm.), trunco et antennis nunquam omnino nigris.
- 3 (4). Nigra, antennarum articulis 2° —5° subtus ferrugineis, palpis pedibusque flavis, tarsis anticis nigricantibus, tibiis pos-

³) Видъ этотъ, рѣзко охарактеризованный присутствіемъ сильно выступающаго бугорка въ задней части почти матовой переднеспинки передъ ея заднимъ поперечнымъ вдавленіемъ, а также матовыми надкрыльями, густо покрытыми нѣжнымъ, сильно шелковистымъ пушкомъ, при незначительномъ ростѣ насекомаго, неправильно показанъ Pic'омъ (Catal. bibl. et synon. des Longic., 1900, p. 38), а за нимъ и Reitter'омъ (Wien. Ent. Zeitg. 1902, p. 82) происходящимъ изъ Монголіи, что свидѣлствуетъ лишь о неопозволительной небрежности названныхъ авторовъ въ вопросахъ географическаго распространенія видовъ. *Necydalis sericella* описанъ Ganglbauer'омъ въ Horae Soc. Ent. Ross., XXIV, 1889, p. 46. Мы не сомнѣваемся, что въ горныхъ частяхъ Китая, на окраинахъ Тибета, а можетъ быть и гдѣ-нибудь въ Гималаяхъ найдутся еще виды рода *Necydalis*.

⁴) Kraatz: Deutsch. Ent. Zeitschr. 1879, p. 106. Descriptio imperfecta.

ticis apice leviter infuscatis, elytris dorso obscure castaneis. Pronotum distincte punctatum.—Long. ♂ 27 mm. (♀ ingota). [Ex Reitter⁵⁾].

Hab. in Persia occidentali ad mare Caspium: Astrabad [collector anonym. F. Hauseri (=? C. Saaro) teste Reitter].

Synonymon: *N. sirexoides* Rtttr. 1902.

[*N. siricoides* Rtttr. 1902 (emend.)].

- 4 (3). Elytra tota vel solo margine postico excepto rufa; abdomen nunquam omnino nigrum. Pronotum minus punctatum.
- 5 (8). Prothorax, scutellum, sternum nigra; femora saltem postica nigro signata; abdomen ex parte, nonnunquam majore pro parte, nigrum. Antennae articulo 4^o brevi, quam 3^{us} subsesqui brevior. Elytra apice haud obtuse rotundata. Sternum et latera prothoracis flavo- s. flavido-sericeo-pubescentia.
- 6 (7). Tibiae posticae incurvae. Prothorax ad latera densius laete flavo-sericeo-pubescent. Abdomen ♂ pygidio basi valde convexo, dein abrupte declivi, propygidio valde inflato, 5^o segmento ventrali per totam longitudinem late fortiterque impresso. Antennae utroque in sexu fortiores.—Long. 22—30 mm.

Hab. totâ Europâ mediâ; in Rossia orientem versus progreditur solummodo ad Curoniam usque⁶⁾; occurrit in *Quercu*, *Fago*, *Ulmo*.

Synonyma: *N. abbreviata* (non F.) Panz. 1797.—*N. major* (non L.) Guér. 1843.—*N. panzeri* Harold 1876.

N. ulmi Chev. 1838.

- 7 (6). Tibiae posticae subrectae. Prothorax ad latera parcius subsordide-flavido-pubescent. Abdomen ♂ pygidio basi minus convexo, dein sensim declivi, propygidio parum inflato, 5^o segmento ventrali apice tantum impresso. Antennae utroque in sexu graciliores.—Long. 19—32 mm.

Hab. in Europa septentrionali, partim media, in Rossia septentrionali et media usque ad Sibiriam orientalem (Blessig). Occurrit in *Salice*, *Populo*.

⁵⁾ Reitter: l. c.

⁶⁾ Cf. A. Semenov: Bull. Soc. Nat. Mosc. 1899, № 1, p. 132.

Synonyma: *N. abbreviata* F. 1775. -- *N. ichneumonea* De G. 1775. — *N. populi* Bütt. 1818 (♂). — *N. salicis* Muls. 1839. — *N. duponti* Muls. 1839.

N. major L. 1758.

- 8 (5). Prothorax et scutellum, hoc omnino, ille exceptis meris sulcis impressionibusque pronoti, sicut sternum totum rufa; pedes testacei unicolores; abdomen majore ex parte rufum (♀). Antennae articulo 4° graciliore et longiore, 3° hoc vix 1,3 superante, articulo ultimo (11°) curto, praecedente manifeste brevior, ante apicem fortiter dilatato (♀). Elytra lata et brevia, singula apice obtuse rotundata. Sternum, latera et basis pronoti sat dense pilis laete rufis sericeis induta. Pronotum disco perparce vix conspicue punctato. Tibiae posticae subrectae. — Long. ♀ 32 mm. (♂ ignotus).

Hab., quantum constat; solum in Caucaso occidentali: pr. Novorossijsk (cf. supra).

Synonymon: *N. major* L. var. geogr. *xantha* Sem. 1899.

N. xantha Sem. 1902.