

Description d'une nouvelle *Sphenoptera* (Coleoptera, Buprestidae)
de la Sibérie.

Par

B. E. Jakowleff (Eupatoria).

***Sphenoptera* (*Chilostetha*) *carinulata*, sp. n.**

♂. Allongé, subcylindrique, assez convexe, atténué aux deux extrémités, d'un bronzé obscur luisant; dessous finement pubescent avec de petites plaques lisses sur les côtés.

Tête petite, assez convexe, sillonnée au milieu, sans fine ligne longitudinale distincte sur le vertex, assez densément ponctuée, surtout antérieurement; front légèrement impressionné au milieu, avec deux reliefs lisses et obliques; épistome en triangle; labre fortement échancré au milieu, comme bilobé; côtés internes des cavités antennaires à peine élevés, ponctués; yeux très petits; antennes longues, assez épaisses, bronzées, à 3^e article un peu plus long que le 2^e et à peine plus court que le 4^e.

Pronotum d'un tiers plus large que long, atténué aux deux extrémités mais un peu plus fortement en avant, légèrement échancré en arrière, graduellement arrondi et ayant sa plus grande largeur au milieu, sinueusement rebordé sur les côtés jusqu'aux $\frac{3}{4}$ et à peine arqué vers le bout, avec les angles postérieurs aigus au sommet, sans strie marginale antérieure, densément ponctué au milieu

(la ponctuation plus clair-semée sur la marge latérale), avec 4 profondes fossettes placées transversalement au tiers basal, une fovéole antéscutellaire et 2 petits reliefs lisses au milieu. Ecusson petit, aussi large que long, avec une forte dent apicale.

Flytres un peu plus larges, à la base, que le pronotum et $2\frac{1}{3}$ fois aussi longs, subparallèles dans leur partie basale, atténués au bout et terminés en pointe arrondie, entièrement rebordés sur les côtés, légèrement sinués au pli crural; stries très fines, en partie imperceptibles, formées de petits traits non enfoncés; interstries plans, très finement pointillés, transversalement ridés à la base des élytres; interstrie 8 fortement caréné sur toute sa longueur, le 4^e à peine élevé au milieu, le 1^{er} légèrement enfoncé vers le bout; suture carénée postérieurement, plane à la base; strie scutellaire bien marquée; bosse humérale assez saillante, bosse dorsale nulle.

Menton transverse, légèrement bisinué. Prosternum plan, peu densément mais également ponctué, rebordé d'une fine strie marginale complète; métasternum sillonné, très densément et très finement ponctué, ainsi que l'abdomen, qui est pubescent, avec des espaces glabres latéralement; hanches postérieures échancrées aux épimères; pattes grêles.

♂. Jambes antérieures légèrement arquées, les intermédiaires et les postérieures plus ou moins échancrées au bord interne, avec une dent obtuse au bout; dernier segment de l'abdomen légèrement sinué au sommet.

Long. 7, larg. 2,5 mm.

Hab. Transbaïcalie: Kiachta.

Par le nombre et par la disposition des fovéoles sur le pronotum cette nouvelle espèce se rapproche de *Sph. egena* Mannh., dont elle diffère très nettement autant par la forme même du pronotum et par le mode divers de sa ponctuation, que par la sculpture des élytres, et notamment par le 8^e interstrie de ces derniers, placé entre des stries peu distinctes et qui longe tout le bord latéral en forme de côte saillante; la tête, chez le *Sph. carinulata* m., est assez petite, bien plus étroite que chez l'*egena*; les antennes sont notablement plus épaisses.