

Новый видъ муравья изъ Закаспійской области.

М. Рузскаго (Казань).

Въ мирмекологическомъ матеріалѣ, любезно доставленномъ мнѣ гг. А. П. Семеновымъ и В. А. Арнольдovýmъ изъ Закаспійской обл., между прочими интересными находками, оказался одинъ новый видъ муравья изъ р. *Myrmecocystus*, которому я даю имя въ честь извѣстнаго мирмеколога, моего друга, Авг. Фореля.

Этотъ видъ съ одной стороны близко стоитъ къ *Myrm. viaticus* Fabr., съ другой — къ *Myrm. altisquamis* André, занимая какъ бы середину между ними. По окраскѣ онъ сходенъ съ *Myrm. viaticus* var. *niger* André; по формѣ и строенію чешуйки — съ *Myrm. altisquamis*.

Myrmecocystus foreli, n. sp.

♀. Цвѣтъ тѣла совершенно черный, матовый. Лапки, жгутикъ усиковъ и верхнія челюсти черно-коричневые.

Глаза большіе, овальные, выпуклые, по крайней мѣрѣ вдвое больше, чѣмъ у *M. altisquamis* и *viaticus*, лежатъ по бокамъ головы близъ закругленныхъ ея заднихъ угловъ. Длина глаза почти равна разстоянію отъ его передняго края до мѣста причлененія челюсти. Лобная площадка хорошо видна, слабо блестящая.

Заднеспинка выпуклая, сильно приподнятая и болѣе высокая чѣмъ у *M. viaticus* и *altisquamis*. Стебелекъ снабженъ не узломъ, какъ у *M. viaticus*, а чешуйкой, довольно высокой, толстой при основаніи, кверху суживающейся и тупо закругленной. Спереди она выпуклая, выдаваясь въ формѣ тупого угла, сзади вогнутая; верхній край ея довольно толстый, закругленный и съ небольшою выемкой посерединѣ. У *M. altisquamis* чешуйка менѣе толстая при основаніи и сверху болѣе широко закруглена, не образуя спереди тупоугольной выпуклости. У мелкихъ экземпляровъ *M. foreli* чешуйка болѣе толстая при основаніи, менѣе высокая и сверху тупоугольная. Въ вышину чешуйка нѣсколько ниже заднеспинки. У *M. altisquamis* заднеспинка болѣе плоская и чешуйка почти равна ей въ вышину. Брюшко высокое, короткое, съ боковъ не сдавленное.

Верхнія челюсти съ частыми и грубыми продольными морщинами, усаженныя волосками. Тѣло безъ отстоящихъ волосковъ, за исключеніемъ только всей нижней поверхности его и конца брюшка, покрытыхъ рѣдкими желтоватыми отстоящими волосками. Прилежащія волосы, нѣжные, очень короткіе и чрезвычайно рѣдкіе на туловищѣ, такого же цвѣта; на ножкахъ они довольно частые, особенно на лапкахъ. Голени и лапки, кромѣ того, еще усажены двумя рядами острыхъ желтоватыхъ щетинокъ. Ноги столь же длинныя, какъ у *M. viaticus* subsp. *setipes* F o r.

Все тѣло тонко и часто морщинистое (зернисто или точечно, частью поперечно), брюшко столь же тонко и нѣжно поперечно-морщинисто. На головѣ мелкія углубленныя точки. Въ общемъ поверхностная скульптура тѣла такая-же, какъ у *M. altisquamis*. Ножки съ слабымъ блескомъ. Длина тѣла 8—12 mm.

Мѣстонахожденія: Закаспійская обл.: ст. Казанджикъ (Арнольдъ, VI. 1902); Кизиль-Арватъ (Семеновъ, 29. IV. 1889); Асхабадъ (Семеновъ, 5. V. 1889; Арнольдъ, VII. 1902); Гяуарсъ (Семеновъ, 2. V. 1889); Учъ-аджи (Семеновъ, 18. V. 1889).