

Гемиптеры-Гетероптеры новых де ла фауны палеарктике.

Par

B. E. Jakovleff (Eupatoria).

V *).

Phimodera borealis, n. sp.

Ovalaire, allongé, brunâtre en dessus, noir en dessous, très densément et finement ponctué. Tête un peu plus large (1,9—2 mm., y compris les yeux) que longue (1,5—1,7 mm.); bords latéraux fortement échancrés devant les yeux, rétrécis et subitement élargis en avant en lobes semicirculaires; épistome plus long que les joues; yeux petits; tête et antennes noires, le 2^e article d'un tiers plus long que le 3^e, roussâtre à la base. Bord antérieur du pronotum plus large que la tête (yeux compris); bords latéraux avec une petite échancrure arrondie derrière l'angle antérieur qui est assez aigu; pronotum presque noir dans sa partie apicale. Ecusson à dessin peu distinct (sauf les deux carènes basales blanches), aussi long (3,7 mm.) que large; sa base d'un tiers plus large (3,2 mm.) que le bord antérieur du pronotum (2,2 mm.); carène médiane très fine, linéaire, parfois nulle; surface avec de petits tubercules épars, blanchâtres. Pattes noires, genoux roussâtres; trochanters inermes.

Long. 6,7—6,8, larg. 3,8 mm.

Sibérie: Iakoutsk (A. Kirilov!). — 2 ♂.

Туловище продолговато-овальное, болѣе суженное кзади, сверху однообразнаго сѣровато-бураго цвѣта, кромѣ головы и передней части переднеспинки, которыя, такъ-же, какъ и вся нижняя сторона туловища, — чернаго цвѣта; пунктиръ повсюду очень частый, мелкій, но отчетливый.

Голова толстая, нѣсколько короче ширины, взятой вмѣстѣ съ глазами, передъ глазами сильно вырѣзанная и быстро суживающаяся кпереди, гдѣ внезапно расширяется въ видѣ полукруглыхъ лопастей, которыя короче выступающаго впередъ носоваго валика

*) Cf. *Revue Russe d'Entomologie*. III, 1903, pp. 1—4.

(tylus). Глаза небольшие; простые глазки отставлены от них на $1\frac{1}{2}$ диаметра глаза. Голова сполна черного цвѣта, или со срединной полоской и двумя боковыми болѣе или менѣе рыжеватыми; скуловые пластинки внизу черного цвѣта, такъ-же какъ и усики, второй членикъ которыхъ на $\frac{1}{3}$ длиннѣе третьяго и въ основаніи рыжеватый.

Передній край переднеспинки прямо обрѣзанъ, шире головы съ глазами; боковые края ея впереди образуютъ неглубокую, но довольно длинную, округленную выемку; шейный уголъ небольшой, приостренный; плечевая вырѣзка съ довольно узкимъ, туповатымъ зубцомъ надъ ней; задній край, передъ щиткомъ, слегка округленный. Поперекъ переднеспинки проходитъ довольно глубокая бороздка; извилины черныя, съ рыжеватымъ бугоркомъ передъ ними; срединная продольная полоска замѣтна только въ передней половинѣ и такъ-же какъ и шейные углы, — рыжеватая.

Щитокъ овальный, постепенно и довольно сильно суживающійся кзади, при чемъ конецъ его замѣтно продолжается далѣе брюшка; черноватое основаніе его посрединѣ слабо возвышено и ограничено съ боковъ короткими, бѣловатыми, продольными ребрами, отгнѣненными по сторонамъ матово-черными полосками; срединнаго продольнаго ребра нѣтъ, или оно выражено въ видѣ чрезвычайно тонкой линіи; вся поверхность щитка ровная, покрытая рѣдкими бѣловатыми бугорками, иногда мало замѣтными; рисунокъ общій всѣмъ *Phimodera* очень слабо выраженъ, кромѣ треугольнаго матово-чернаго пятна по сторонамъ, впереди середины.

Вся нижняя сторона туловища матово-черная, только нѣсколько пятнышекъ на груди и бугорки по краямъ брюшка — буровато-рыжіе. Ноги невооруженныя, черного цвѣта, лишь узкіе концы бедеръ рыжеватые.

По формѣ головного щитка и боковой вырѣзки переднеспинки нашъ видъ очень похожъ на *Ph. laevilinea* Stål, но у послѣдняго туловище гораздо шире (длина 7 mm., ширина 4,2 mm.), срединное продольное ребро щитка явственнее, продолжающееся на переднеспинку, вся верхняя сторона свѣтлѣе окрашена, а обычный рисунокъ щитка отчетливо выраженъ; голени съ наружной стороны рыжеватые.

***Phimodera aridella*, n. sp.**

En ovale allongé, parallèle aux côtés; unicolore, d'un jaune d'argile très pâle; surface inégale, sans tubercules blanchâtres distincts. Tête (yeux compris) aussi large que longue (1,7 mm.), à bords latéraux échancrés avant les yeux, arrondis au sommet; épistome plus long que les joues, fortement courbé sur toute sa longueur; une bosse sur le vertex; antennes minces, plus pâles à la base, brunâtres vers l'extrémité, à 2^e article d'un quart plus long que le 3^e et presque aussi long que le 4^e. Bord antérieur du pronotum plus large que la tête (yeux compris), angles antérieurs arrondis, non avancés; partie antérieure du bord latéral légèrement échancrée. Ecusson ovalaire, d'un tiers plus long (3 mm.) que le pronotum (1,9 mm.), assez convexe, sans le

dessin ordinaire, mais avec quatre cavités noirâtres à la base; carène médiane longitudinale à peine distincte. Dessous assez fortement ponctué de brun-noirâtre, surtout sur les côtés; tubercules latéraux pâles. Pattes inermes, jaunâtres, cuisses maculées de brun-noirâtre, tibias noirs au bord interne.

Long. ♂ 5,5, ♀ 6, larg. ♂ 3,2, ♀ 3,3 mm.

Turkestan: Djurt-koul (N. Sokolov!).

Туловище продолговато-овальное, съ боковыми краями параллельными, почти однообразнаго сѣровато-глинистаго цвѣта, одѣтое мельчайшими волосками, болѣе замѣтными на головѣ.

Голова толстая; глаза небольшіе; боковыя стороны головы передъ глазами глубоко вырѣзаны; скуловые отростки кпереди постепенно расширяются и на концѣ округлены, короче носового валика, который правильно загибается внизъ, образуя въ своемъ основаніи (между глазъ) выпуклое утолщеніе; скуловыя пластинки снизу прямо обрѣзаны, назади широко округлены. Усики очень тонкіе, болѣе свѣтлыя въ основаніи, бурѣющіе къ вершинѣ; второй членикъ ихъ на четверть длиннѣе третьяго и почти равенъ четвертому.

Переднеспинка широкая; передній край ея гораздо шире головы съ глазами, съ шейными углами широко округленными, не выступающими впередъ; боковыя края впереди слабо вырѣзаны (нѣсколько замѣтнѣе у ♀); плечевая вырѣзка глубокая, съ притупленнымъ зубцомъ въ видѣ лопасти; задній край передъ щиткомъ округленный; поперекъ переднеспинки проходитъ углубленная бороздка, съ буроватымъ пятномъ сзади извилины; въ передней половинѣ замѣтно выпуклое продольное ребро посрединѣ.

Щитокъ овальной формы, одинаковой длины съ брюшкомъ, или едва выступающій у ♀, съ поверхностью ровной, продольнымъ тонкимъ ребрышкомъ посрединѣ и четырьмя впадинами чернаго цвѣта въ основаніи; пунктирь сильнѣе чѣмъ на переднеспинкѣ, мѣстами чернаго цвѣта, но не образуетъ сколько-нибудь замѣтнаго рисунка, такъ-же какъ не замѣтно и бѣловатыхъ гладкихъ бугорковъ, свойственныхъ другимъ видамъ этого рода.

Брюшко снизу буровато-желтаго цвѣта, темнѣющее къ боковымъ окраинамъ, что зависитъ отъ болѣе густоты темно-бураго, сильнаго пунктира; кромѣ свѣтлыхъ бугорковъ, сидящихъ по краямъ брюшка, у ♂ замѣчается еще другой рядъ болѣе слабыхъ бугорковъ, сопровождающихъ дыхальца. Ноги невооруженныя, такого-же цвѣта, какъ и туловище, но на бедрахъ преобладаетъ темно-бурый, иногда же (♂) черный оттѣнокъ; внутренняя сторона голеней черноватая, тарсы рыжеватые.

Эта узкотѣлая, однообразно окрашенная подъ цвѣтъ степи форма примыкаетъ непосредственно къ *Ph. amblygonia* Fieb., отъ которой отличается, съ перваго же взгляда, иной формой скуловыхъ отростковъ и очень слабой боковой выемкой переднеспинки. Возможно, что нашъ видъ окажется тождественнымъ съ *Ph. orthochila* O s c h. in litt.

Sciocoris placidus, n. sp.

Ovalaire, peu convexe, d'un jaune brunâtre, assez densément ponctué de brun et de noir. Tête légèrement impressionnée au milieu, aussi longue que large (moins les yeux); yeux pédonculés, débordant de tout leur diamètre les côtés de la tête; antennes jaunâtres à la base et noirâtres à l'extrémité, à 3^e article un peu moins court ($\frac{1}{5}$) que le 2^e; pronotum aussi long, au milieu, que la tête, entièrement et également ponctué de noir sur toute la surface, sans espaces plus pâles sur les côtés; écusson court, aussi large (ou à peine plus large) que long, à côtés presque droits et aussi long que la corie; élytres un peu plus longs que l'abdomen; corie légèrement arrondie au sommet, également ponctué de brun noirâtre; membrane transparente, avec quelques traits noirâtres sur les nervures. Dessous plus nettement ponctué de noir; spiracules noirs placés sur des tubercules blanchâtres; connexivum avec quelques taches noirâtres; pattes ponctuéées de noir, avec un anneau apical sur les cuisses.

Long. 6,5, larg. 3,8 mm.

Transbaïcalie: Boura (G. Potanine!).

Форма головы, особенно же стебельчатые глаза, выступающие сполна далѣе окраинъ головного щитка, сближаютъ нашъ видъ съ *Sc. macrocephalus* Fieb., но онъ хорошо разнится отъ послѣдняго, кромѣ общаго облика и цвѣта, еще нѣсколькими существенными признаками, какъ это видно изъ сравнительной таблички:

1 (2). Côtés du pronotum pâles, non ponctuéés de noir; 3^e article des antennes d'un tiers plus court que le 2^e; écusson plus long (2,5 mm.) que large (2,2 mm.), plus étroit au sommet, avec une fine carène médiane; dessous à ponctuation très fine, concolore. — Long. 6—7 mm.

Sc. macrocephalus Fieb.

2 (1). Côtés du pronotum ponctuéés de noir comme le disque; 3^e article des antennes long, seulement d'un $\frac{1}{5}$ plus court que le 2^e; écusson aussi long (2 mm.) que large (2,1 mm.), largement arrondi au sommet, sans trace de carène; dessous à ponctuation plus forte, noire. — Long. 6,5 mm.

Sc. placidus, n. sp.